

پەننىي بىلىمگە دائىر كىتابچىلار

كۆشەندە ھاشارەتلەر

ياڭ يۈچىيەن



مىللىتەلەر نەشرىياتى

ياڭ يۈچىەن

كۈشەندە ھاشىئەلەر

تەرجىمە قىلغۇچى: مۇھەممەت مامۇت

مىللەتلەر نەشرىياتى

كىرىش سۆز

تەبىئەت دۇنياسىدا ھاشارەتلەرنىڭ تۈرى ئىنتايىن كۆپ، ئۇلار بىر بىرى بىلەن شىددەتلىك كۈرەش قىلىدۇ ۋە بىر بىرىنى چەكلەيدۇ. بەزى ھاشارەتلەر باشقا زىيانداش ھاشارەتلەر بىلەنلا ئوزۇقلىنىدۇ، بۇ خىل ھاشارەتلەر زىيانداش ھاشارەتلەرنىڭ كۈشەندىسى ياكى پايدىلىق ھاشارەت دەپ ئاتىلىدۇ.

كۈشەندە ھاشارەتلەر زىيانداش ھاشارەتلەرنىڭ سان جەھەتتىكى ئۆزگىرىشىگە تەسىر كۆرسىتىدىغان مۇھىم ئامىل بولۇپ، ئۇ زىيانداش ھاشارەتلەرنىڭ كۆپلەپ پەيدا بولۇشىنى چەكلەشتە ناھايىتى مۇھىم رول ئوينايدۇ. ئەمما بەزى چاغلاردا، كىشىلەر بۇ خىل رولغا دىققەت قىلمايدۇ ۋە ئەھمىيەت بەرمەي-دۇ، ھەتتا كۈشەندىلەرنى زىيانداش ھاشارەتلەر قاتارىدا يوقىتىۋېتىدىغان ھادىسىلەرمۇ يۈز بېرىدۇ. تېخىمۇ ئومۇملاشقان شۇكى، زىيانداش ھاشارەتلەرنىڭ ئالدىنى ئالدىغان ۋە ئۇنى يوقىتىدىغان چاغدا، ھىمىيىۋى دىخانچىلىق دورىلىرى نامۇۋاپىق، قالمايىقان ئىشلىتىلىدۇ-دە، كۈشەندىلەر كۆپلەپ ئىرىۋېتىلىدۇ. نەتىجىدە زىيانداش ھاشارەتلەر قايتىدىن ئەۋج ئالىدۇ، دىخان-

جىلىق دورىلىرىغا نىسبەتەن قارشىلىق پەيدا بولىدۇ. دېخا جىلىق، ئورمان جىلىق ئىشلەپچىقىرىشى زىيانغا ئۇچرايدۇ.

بىقنقى بىرقانچە يىلدىن بۇيان، ئىلىمىزدىكى كەڭ دىخا جىلىق لار، ئورمان جىلىق، باغۋەنجىلىك ئىشچىلىرى، پەن - تېخنىكا خادىملىرى ھەز دەرىجىلىك پارتكوملارنىڭ رەھبەرلىگىدە، "ئالدىنقى ئېلىتىنى ئاساس قىلىش، ھەر تەرەپلىمە ئۇسۇل ئارقىلىق ئالدىنقى ئېلىتىش، يوقىتىش" تىن ئىبارەت ئۆسۈملۈك ئاسراش فاكىتېنىنى پائال ئىزچىللاشتۇرۇپ، بىئولوگىيىلىك ئۇسۇل بىلەن ئالدىنقى ئېلىتىش، يوقىتىش خىزمىتىنى زور كۈچ بىلەن قانات يايدۇرۇپ، كېسەللىك ۋە زىيانداش ھاشارەتلەرنى يوقىتىش، ئاشلىق، باخنا، ئورمان ۋە مۆسەلەردىن مول ھوسۇل ئېلىشتا ئۆزىنىڭ رولىنى ئارغانسىرى ئوبدان جارى قىلدۇرماقتا. 1975 - يىلدىكى سانلىق مەلۇماتقا قارىغاندا، مەملىكەت بويىچە بىئولوگىيىلىك ئۇسۇل بىلەن ئالدىنقى ئېلىتىش ۋە يوقىتىش ئىشى ئېلىپ بېرىلغان بەرنىڭ كۆلىمى 27 مىلىيون 250 مىڭ موغا يەتكەن، بۇنىڭ ئىچىدە ھاشارەت ئارقىلىق ھاشارەت يوقىتىلغان يەرنىڭ كۆلىمى 12 مىلىيون 600 مىڭ موغا يەتكەن. خىنەن ئۆلكىسىدە 1974 - يىلى خانقىز ئارقىلىق كېۋەز كۆك پىنى يوقىتىلغان كېۋەزلىكىنىڭ كۆلىمى 1 مىلىيون 800 مىڭ مودىن ئېشىپ كەتكەن. خانقىز ئارقىلىق كۆك پىنى يوقىتىش بىلەن بىر ۋاقىتتا، فىزىل كۆزلىك ھەرىسى قويۇپ بېرىش ئارقىلىق كۆممە قوناق كېپىنىڭ، غوزا قۇرۇنى، نالىك بوبۇر -

ماق پۈرلەشتۈرىدىغان كېيىنكى، جۈملىدىن مىكرو ئورگانىزىملىق دىخانچىلىق دورىسى ئارقىلىق باشقا كېسەل-زىياندىن ھاشارەتلەر يوقىتىلغان يەرنىڭ كۆلىمى 600 مىڭ موغا يېتىپ، كۆزگە كۆرۈنەرلىك ئۈنۈم ھاسىل قىلىندى.

ھازىر قانات يايدۇرۇلۇۋاتقان ئاممىۋى ھاراكىتىلىق بىئولو-گىيىلىك ئۇسۇل بىلەن ئالدىنى ئېلىش، يوقىتىش ئىشدا، زىيانداش ھاشارەتلەرنىڭ كۈشەندىلىرىنى فانداق قىلىپ تونۇش ۋە ئۇلارنىڭ ياشاش ئادەتلىرىنى ئىگەللەش پايدىلىق ھاشارەتلەر ئارقىلىق زىيانداش ھاشارەتلەرنى يوقىتىشتىكى مۇھىم ۋەزىپە. بۇ كىتاپتا تۇتۇپ ئوزۇقلىنىدىغان، پارازىت ياشايدىغان 80 خىلدىن ئارتۇق كۈشەندىنىڭ پارازىتلىنىش دائىرىسى، ئوزۇقلىنىشى، تاشقى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكلىرى. ياشاش ئادىتى توغرىسىدىكى ئاساسىي بىلىملەر ۋە بۇ ھاشارەتلەرنى ئاسراش، ئۇلاردىن پايدىلىنىش يوللىرى شۇنىڭدەك كۈشەندە ھاشارەتلەر-نىڭ نۇسخىلىرىنى يىغىش، ساقلاش تېخنىكىسى نۇقتىلىق ھالدا تونۇشتۇرۇلدى. زىيانداش ھاشارەتنى چەكلەشتە كۆزگە كۆرۈنەرلىك رول ئوينايدىغان، تۇتۇپ ئوزۇقلىنىدىغان سالجا خىلىدىكىلەر ۋە ئۆمۈچۈكلەرمۇ بىرلىكتە تونۇشتۇرۇلدى.

كۈشەندە ھاشارەتلەرنىڭ مەنبەسى ئىنتايىن مول. ئۇلارنىڭ بىر بىرى بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى شۇنىڭدەك ئۇلارنىڭ زىيانداش ھاشارەتلەر بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى ئىنتايىن مۇرەككەپ. ئېلىمىزدە ئۆتمۈشتە بۇ ھەقتە ئېلىپ بېرىلغان تەتقىقات خىزمەت-

لىرى يېتەرسىز بولغاچقا، بىز نۇرغۇنلىغان كۈشەندە ھاشارەتچىلەرنى سىلۋالالىمىغان ھەم ئۇنىڭدىن پايدىلانمىغان ئىندۇق ھازىر پايدىلىنىۋاتقان بەزى خىللىرىنى بولسا يەنىمۇ تەشۋىق قىلىشقا، ئومۇملاشتۇرۇشقا، كېڭەيتىشكە توغرا كېلىدۇ. بۇ ھەقتىكى بەزى خىزمەتلىرىمىزنى تېخىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا يۇقۇرى كۆتىرىشكە، نەتىجىگە ئېرىشتۈرۈشمىزگە توغرا كېلىدۇ. سەۋىيەم چەكلىك، توپلىمىغان ماتېرىيالسىمۇ يېتەرسىز بولغاچقا، بۇ كىتابنى تۈزۈشتە كەمچىللىك ۋە خاتالىقلارنىڭ بولۇشى مۇمكىن، كىتاپخانلارنىڭ تەنقىت قىلىپ تۈزىتىش بېرىشىنى سورايمەن.

ياڭ يۈچيەن

1978-يىلى 2-ئاي، خېنەن يېزا ئىگىلىك ئىنىستىتۇتىدىن

مۇندەرىجە

بىرىنچى باپ تۇتۇپ ئوزۇقلىنىدىغان كۈشەندە

- ھاشارەتلەر..... (1)
1. خانقىز..... (3)
1. يەتتە داغلىق خانقىز..... (5)
2. قارا جىيەكلەك فزىل خانقىز..... (11)
3. سالجا يەيدىغان قارا داغلىق خانقىز..... (16)
4. تاغىل خانقىز..... (18)
5. غەبرى تۈسلۈك خانقىز..... (20)
6. كۆپ ئۇچرايدىغان باشقا خانقىزلار..... (23)
2. ئالتۇن كۆز..... (26)
1. چوڭ ئالتۇن كۆز..... (29)
2. جۇڭخۇا ئالتۇن كۆزى..... (34)
3. چىپار ئالتۇن كۆز..... (36)
4. بېشىل ئالتۇن كۆز..... (37)
3. سېرىق ھەرە..... (38)
1. ئۇزۇن بۇتلۇق سېرىق ھەرە..... (38)
2. تاغىل سېرىق ھەرە..... (41)

26. تىرىپىس..... (87)
27. كۆك پىت يەيدىغان چىۋىن..... (89)
1. كۆك پىت يەيدىغان ئۇزۇنچاق چىۋىن..... (91)
2. كۆك پىت يەيدىغان باشقا چىۋىنلەر..... (92)
28. ھاشارەت يەيدىغان كۆكۈيۈن..... (94)
29. تۇتۇپ ئوزۇقلىنىدىغان سالجا..... (97)
30. ئۆمۈچۈك..... (103)
1. كىچىك، قارا ئوتلاق ئۆمۈچۈكى..... (105)
2. باشقا ئۆمۈچۈكلەر..... (107)

ئىككىنچى باپ پارازىت ياشايدىغان كۈشەندە

- ھاشارەتلەر..... (109)
1. پارازىت ھەرىلەر..... (112)
1. قىزىل كۆزلۈك ھەرە..... (114)
2. كىچىك سېرىق ھەرە..... (122)
3. تەكشى قوساقلىق كىچىك ھەرە..... (124)
4. پوستلاقخورنىڭ كىچىك سېرىق ھەرىسى..... (126)
5. شارسىمان قاسراقلىق قۇرۇتنىڭ پارازىت ھەرىسى..... (128)
6. ئايلىنما سىزىقلىق نەۋانىنىڭ كىچىك پارازىت ھەرىسى..... (130)
7. تۈگۈنەك پاشىنىڭ چاققاق كىچىك ھەرىسى..... (131)
8. كۆك سىتنىڭ كىچىك غوزەك ھەرىسى..... (134)
9. ياۋا تەكەننىڭ كىچىك غوزەك ھەرىسى..... (135)

10. ياغاچ بوستلاقخورى بەرۋانسىنىڭ كىچىك غوزەك ھەرىسى.....(137)
11. قالقان قوساقلق غوزەك ھەرىسى.....(138)
12. شاڭخەي كۆك ھەرىسى.....(139)
13. توفال ھەرىلەر.....(141)
2. پارازىت چىۋىنلەر.....(145)
1. فالقانسىمان پارازىت چىۋىن.....(147)
2. تۈكلۈك قۇرۇت پارازىت چىۋىنى.....(150)
3. پارازىت ياشايدىغان باشقا چىۋىنلەر.....(152)
3. تاغىل تىۋىتلىق قالقانلىق قوڭغۇز.....(157)
- ئۈچىنچى باپ كۈشەندە ھاشارەتلەرنىڭ نۇسخىلىرىنى**
- يىغىش ۋە ساقلاش.....(160)
1. تۇخۇم ئىچىدە پارازىت ياشايدىغان ھاشارەتلەرنىڭ نۇسخىلىرىنى يىغىش ۋە ساقلاش.....(160)
2. لىچىنىكىدا پارازىت ياشايدىغان ھاشارەتلەرنىڭ نۇسخىلىرىنى يىغىش ۋە ساقلاش.....(163)
3. قوچاق ئىچىدە پارازىت ياشايدىغان ھاشارەتلەرنىڭ نۇسخىلىرىنى يىغىش ۋە ساقلاش.....(164)
4. يېتىلگەن كۈشەندە ھاشارەتلەرنىڭ نۇسخىلىرىنى يىغىش ۋە ساقلاش.....(165)
5. كۆك پىت، قاسراقلىق قۇرۇتنىڭ كۈشەندىلىرىنى يىغىش ۋە ساقلاش.....(166)

قوشۇمچە: كۈشەندە ھاشارە تالەرنىڭ خەنزۇچە نامى
ۋە ئىلمىي نامى بىلەن ئۇيغۇرچە ئاتىلىشىنىڭ
سېلىشتۇرۇمىسى.....(168)

بىرىنچى باپ

تۇتۇپ ئوزۇقلىنىدىغان كۈشەندە ھاشارەتلەر

تۇتۇپ ئوزۇقلىنىدىغان كۈشەندە ھاشارەتلەر گۆشخور كۈشەندىلەر دەپمۇ ئاتىلىدۇ. بۇنداق كۈشەندە ھاشارەتلەر زىيانداش ھاشارەتلەرنىڭ تۇخۇمى، لىچىنكىسى (كىچىك قۇرۇ-تى)، قوچىغى ۋە يېتىلگەن قۇرۇتى بىلەن ئوزۇقلىنىدۇ. تۇتۇپ ئوزۇقلىنىدىغان كۈشەندە ھاشارەتلەر ئۆزىنىڭ ئوزۇقلىنىش ئۇسۇلىغا ئاساسەن ئىككى خىلغا بۆلىنىدۇ. بىر خىلى ئۆزلىرىنىڭ چايىنغۇچى ئېغىز ئاپاراتى ئارقىلىق ھاشارەتنىڭ بىر قىسمىنى ياكى ھەممىسىنى بىۋاسىتە يۇتۇپ كېتىدۇ. ئىككىنچى بىر خىلى بولسا ئۆزىنىڭ سانچىپ شورايدىغان ئېغىز ئاپاراتىنى زىيانداش ھاشارەتنىڭ تېنىگە سانچىپ كىرگۈزىدۇ، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا بىر خىل زەھەرلىك ماددا چىقىرىپ، زىيانداش ھاشارەتنى تېزلا ھۇشسىزلىنىدۇرۇپ، ھەركەت قىلالمايدىغان، قايتۇرما ھۇجۇم قىلالمايدىغان قىلىپ قويۇپ، ئۇنىڭ تېنىدىكى سۇيۇق-لۇقنى بىخىرامان شوراپ، ئۇنى ئۆلتۈرىدۇ.

تۇتۇپ ئوزۇقلىنىدىغان كۈشەندە ھاشارەتلەرنىڭ تۈرى ناھا-

يىتى كۆپ، پۈتۈن ھاشارەتلەر دۇنياسىنىڭ %28 نى تەشكىل قىلىدۇ. ئوزۇغىنىڭ مىقدارىمۇ خېلى كۆپ. يېتىلىش جەريانىدا، بىرقانچە ھەتتا بىرقانچە ئون ھاشارەتنى يىسە، ئاندىن ئۆزىنىڭ يېتىلىشىنى تاماملىيالايدۇ، شۇڭا، تەبىئەت دۇنياسىدا ئۇنىڭ زىيانداش ھاشارەتلەرنى تىزگىنلەش رولى خېلىلا كۆزگە كۆرۈنەرلىك بولىدۇ. بىراق، يېقىنقى بىرقانچە يىلدىن بېرى، خىمىيىلىك دىخانچىلىق دورىلىرىنىڭ نامۇۋاپىنى، قالايمىقان ئىشلىتىلىشى ئارقىسىدا، تۆتۈپ ئوزۇقلىنىدىغان كۈشەندە ھاشارەتلەر كۆپلەپ قىرىلىپ كەتتى، نەتىجىدە دىخانچىلىققا، ئورمانچىلىققا زىيان يەتكۈزىدىغان بەزى ھاشارەتلەر قايتا ئەۋج ئېلىپ كەتتى. مەسىلەن، كۆك پىت، قىزىل ئۆمۈچۈك دۇنيا مىقياسىدا كۆپ پەيدا بولماقتا.

خېنەن ئۆلكىسىنىڭ پاختىچىلىق رايونلىرىدىكى دىخانلار ۋە پەن-تېخنىكا خادىملىرى يېقىنقى بىرقانچە يىلدىن بېرى خانقىز، ئالنۇن كۆزدىن پايدىلىنىپ كېۋەز پىتىنى بوقىتىش، سېرىق ھەرە ئارقىلىق غوزا قۇرۇتى، ئەگمەج بەللىك قۇرۇت قاتارلىق زىيانداش ھاشارەتلەرنى يوقىتىش ئىشىنى زور كۈچ بىلەن قانات ياندۇرۇپ، خوشاللىقلارنى نەتىجە ھاسىل قىلدى. تۆتۈپ ئوزۇقلىنىدىغان بەزى كۈشەندە ھاشارەتلەرنى سۈنئىي يول بىلەن كۆپەيتىپ يابدىلىنىش تېخنىكىسىنى تېخى ئىگەللەپ كەتمىگەن بولساقمۇ، ئۇلار تەبىئەت دۇنياسىدا ئۈزلۈكسىز ھەرىكەتلىنىپ يۈرۈپ، نۇرغۇن زىيانداش ھاشارەتلەرنى

يوقاتتى. مەسلەن، ياپىۋەك، يىڭىناغۇچ، ھاشارەت يەيدىغان كۆكۈيۈن، ھاشارەت يەيدىغان چىرىپاشكا قاتارلىقلارنىڭ ئاشۇنداق ۋەزىپىنى ئۆتىگەنلىكى ھەممە كىشىگە ئايان، بۇ ھاشارەتلەرنىڭ بەزىلىرى بولسا ئاللىقاچان كىشىلەرنىڭ دىققەت-ئېتىبارىنى قوزغىدى. دىمەك، بىز دىخانچىلىققا، ئورمانچىلىققا زىيان يەتكۈزىدىغان ھاشارەتلەرنى ھەر تەرەپلىمە ئۇسۇللار بىلەن يوقىتىشنىڭ چارە-تەدبىرلىرىنى تۈزىدىغان چاغدا، تۇتۇپ ئوزۇقلىنىدىغان كۈشەندە ھاشارەتلەرنى پىلانلىق ھالدا قوغداپ، ئۇلاردىن تولۇق پايدىلىنىپ، ئۇلارنىڭ تەبىئەت دۇنياسىدا دائىم، ھارماي-تالماي زىيانداش ھاشارەتلەرنى يوقىتىش رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، زىيانداش ھاشارەتلەر بىلەن كۈشەندىلەرنى تەبىئەت دۇنياسىدا نىسبى ھالدا تەكپۈك بولۇپ تۇرىدىغان قىلىشىمىز لازىم.

1. خانقىز

خانقىز كىشىلەرگە ئەڭ تونۇش بولغان بىر خىل كۈشەندە ھاشارەت، خەق ئۇنى بۇغداي دوخمۇرى، گۈلچى ھىز دەپمۇ ئاتىشىدۇ.

يېتىلگەن خانقىزنىڭ تېنى يېرىم شارسىمان بولۇپ، كۆمتۈرۈپ قويۇلغان نوگا يىغىلا ئوخشايدۇ. شۇڭا ئۇ، ئادەتتە، نوگاي قۇرۇت دەپمۇ ئاتىلىدۇ، دۈمبىسى سىلىق، ئىچكى تۈكلۈك

بولدۇ. قاتتىق فانىتىدا، دولىسىدا تولاراق قىزىل، سېرىق،
فارا داغ ۋە سىزىقچىلار بولدى. بۇ ئۇنىڭ تۇرنى تونۇستىكى
مۇھىم ئاساس ھىساپلىنىدۇ. لېكىن يوپۇرماق قوڭغۇزلىرىنىڭ
بەزىلىرى، مەسىلەن، ئۈزۈمدە بولىدىغان 10 داغلىق يوپۇرماق
قوڭغۇزى خانقىزغا بەك ئوخشايدۇ، ئەمما ئۇلارنىڭ پۇتىنىڭ
بېغىشى دۈمبە تەرىپىدىن قارىغاندا 4 بوغۇمدىن تۈزۈلگەندەك
كۆرۈنىدۇ، خانقىزنىڭ بولسا 3 بوغۇمدىن تۈزۈلگەن بولىدۇ، بۇ
ئۇلارنىڭ مۇھىم پەرقى. لىچىنىكىسىنىڭ تېنى ئۇزۇنچاق ياكى
ئۇرچۇق شەكلىدە بولۇپ، بەدىنىدە قىزىل، قارا، ئاق، ساغۇچ
سىزىق ياكى داغ بولىدۇ. ئۆسۈملۈك بىلەن ئوزۇقلىنىدىغان
لىچىنىكىنىڭ بەدىنىدە شاخلاپ چىققان ئۇزۇن تىكەنچە بولىدۇ،
كۆك پىت يەيدىغان لىچىنىكىنىڭ بەدىنىدە پەقەت شاخلىمىغان
تىكەنچىلا بولىدۇ، قاسراقلىق قۇرۇت يەيدىغان لىچىنىكىنىڭ بەزى-
لىرىنىڭ بەدىنىدە قاپارتما شەكلىدىكى ئۆسمە بولغاندىن باشقا،
يەنە ئاق رەڭلىك سىلىق تىكەنلەر بولىدۇ. ھەر خىل لىچىنىكلار-
نىڭ ئالدى پۇتى خېلى تەرەققى قىلغان بولۇپ، ھەركىتى تېز
بولدۇ. ئۆسۈملۈك يەيدىغان لىچىنىكىلارنىڭ ھەركىتى بولسا
ئاسناراق بولىدۇ.

خانقىزنىڭ ئاز ساندىكى تۇرنى ھىساپقا ئالمىغاندا، كۆپ
ساندىكىلىرى گۆش بىلەن ئوزۇقلىنىدۇ، يېتىلگەنلىرىمۇ، لىچى-
كىلىرىمۇ ئاساسەن يۇمشاق تەنلىك ھاشارەت (مەسىلەن، كۆك
پىت، قاسراقلىق قۇرۇب، توزاك پىت) بىلەن ۋە بەزى ھاشا-

رەتلەرنىڭ تۇخۇمى بىلەن ئوزۇقلىنىدۇ، ئۇنىڭ ئوزۇقلىنىش مىقدارىمۇ ناھايىتى كۆپ بولىدۇ.


خانقز ھەر يىلى 1~4 قېتىم ئەۋلات قالدۇرىدۇ. ئادەتتە يېتىلىپ تاش ئاستىدا، ئۆڭكۈر ئىچىدە، غازاڭ ئارىسىدا ياكى باشقا يېپىق جايلاردا قشلايدۇ. ئىككىنچى يىلى باھاردا ھاۋا ئىللىغاندا ھەركەنلىنىشكە، ئوزۇقلىنىشقا باشلايدۇ. 1 دىن 100 گىچە تۇخۇم تۇغىدۇ، تۇخۇمنى بىر بىرىگە ئىك يۆلەپ تۇغىدۇ. تۇخۇمى ئۇيۇل پارچە، سېرىق بولىدۇ. ئادەتتە تۇخۇمدىن 8 كۈن ئۆپچۆرىسىدە لىچىنكا چىقىپ ئوزۇقلىنىشقا باشلايدۇ. قېرىغان لىچىنكا يوپۇرماقنىڭ ئاستىقى يۈزى، قورۇلۇپ قالغان يوپۇرماقنىڭ ئىچى، دەرەخ قوۋزىغىنىڭ ئارىسى، داڭگالنىڭ ئاستى قاتارلىق يېپىق جايلارنى تاللاپ، قۇيرۇقى تەرەپتىن بىر خىل شىلمىشقى ماددا ئاجرىتىپ چىقىرىپ، شۇنىڭغا يېپىشىپ قوچاققا ئايلىنىدۇ.

بۇ يەردە زىرائەتلەردە، مۇسسىز ۋە مۇبلىك دەرەخلەردە كۆپ بولىدىغان، گۆشخور خانقزنى نۇقتىلىق تونۇشۇرمىز.

1. يەتتە داغلىق خانقز

بۇ خېنەننىڭ ھەرقايسى جايلىرىغا تارالغان، ئۇنىڭ يېتىلگەنمۇ، لىچىنكىسىمۇ ئوخشاشلا بۇغداي پىتى، كېۋەز پىتى، كۆكتات پىتى، تۇخۇمەك پىتى، نەشپۈت پىتى، شاپتۇل پىتى قاتارلىقلارنى تۇتۇپ يەيدۇ.

تاشقى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى يېتىلگىنىنىڭ ئۇزۇنلۇغى 7~5 مىللىمېتىر، كەكلىكى 4~6 مىللىمېتىر بولىدۇ. تېنى تۇخۇم شەكلىدە بولۇپ، يېرىم شار شەكلىدىكى گۈمبەزگە ئوخشاش كۆرۈنىدۇ. بېشى قارا بولۇپ، چوققىسىدا ئىككى دانە ساغۇچ داغ بولىدۇ. كۆكرەك قىسمى قارامتۇل، فاتتىق قانستى ساغۇچ قىزىل بولۇپ، 7 دانە قارا دېغى بولىدۇ. شۇڭا 7 داغلىق خانقىز دەپ ئاتىلىدۇ، بۇ داغلارنىڭ بىرى ئىككى قانستىنىڭ تۇتاشقان يېرىدىن ئۆسۈپ چىققان بولىدۇ. تۇخۇمى ئۇزۇن سوقىچاق، رەڭگى سېرىق بولىدۇ. ئادەتتە 30~40 تۇخۇمنى



تىك قىلىپ بىر يەرگە توپلاپ تۇغىدۇ. لىچىنكىسى بوز قوڭۇر بولۇپ، بىرىنچى بوغۇمىدا 4 قىزىل دېغى، 4-ۋە 7-بوغۇملىرىدا ئىككىدىن قىزىل دېغى بولىدۇ، ھەرقايسى بوغۇمىدا غۇزمەك ئۆسكەن قارامتۇل تىكەنچى تۈكى بولىدۇ. قوچىغى سېرىق بولۇپ، كى-

يىن نەدرىجى قارىيىدۇ (1-رەسىم). 1-رەسىم يەتتە داغلىق خانقىز

ياشاش ئادىتى خېنەندە ھەر 1. بېسىلگىسى 2. نۇخۇمى بىلى 6~7 ئەۋلاد قالدۇرىدۇ، 3. لىچىنكىسى 4. قوچىغى

يېتىلىپ، بۇغداي، فىچا ئارىسىدا باكى داڭگال ئارىسىدا، غازاك ئارىسىدا قىشلاپ، ئىككىنچى بەلى 2-ئايىنىڭ ئوتتۇرىدا

لەرىدىن باشلاپ ھەركەتلىنىشكە باشلايدۇ، 3- ئاينىڭ 1- 2- ئون كۈنلىرى بۇ ھاشارەت تازا ئەۋج ئالدىغان مەزگىل بولىدۇ. 3- ئاينىڭ ئاخىرلىرى بۇ ھاشارەت تۇخۇملايدىغان مەزگىل بولىدۇ. بۇ ھاشارەت تۇخۇمنى، كۆپىنچە، داڭگال ئاستىغا، قورابىغا ۋە كۆك پىت بار زىرائەتنىڭ ئۈستىگە تۇغدۇ، 4- ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرى ئۇنىڭ لىچىنىكلىرى ھەركەتلىنىدىغان مەزگىل بولىدۇ، ئۇنىڭ بىرىنچى ئەۋلادىدىن يېتىلگەنلىرى 4- ئاينىڭ ئاخىرلىرىدا كۆپلەپ قوچاقتىن چىقىدۇ. ئاخىرقى بىر ئەۋلادى يېتىلگەندىن كېيىن، 10- ئايلاردا بۇغداي، قىچا، بەسەي، چامغۇر ئارىسىدا ۋە ئورمانلىقتا، مۈملىك باغلاردا فىشلايدۇ.

يېتىلگەنلىرى ئۇچۇش، ئۆمىلەش جەھەتتە خېلى كۈچلۈك ئىقتىدارغا ئىگە. ئۇ ئۆلگەن بولۇپ بېتىۋالىدۇ، تاشقى مۇھىتتا بىر نەرسىدىن ئۆركىسە، سېرىق سۇ پۇركۇپ مۇداپىئەلىنىدۇ، يېتىلگەنلىرىنىڭ ھەر بىرى ھەر كۈنى 50~150 كۆك پىتنى يەيدۇ، لىچىنىكىسى يېتىلىش جەريانىدا 600~800 كۆك پىت يەيدۇ. قىشلىغان چىشى مىك دانە، كۆپ بولغاندا، 2 مىكدىن 3 مىگىچە نۇخۇم تۇغىدۇ. تۇخۇملاش ۋاقتى 15~20 كۈن بولىدۇ، قىشلاپ يېتىلگەنلىرىنىڭ تۇخۇملاش ۋاقتى 3 ئايغا يېتىدۇ. تۇخۇملاش مەزگىلى ئۇزۇن بولغاچقا، ئېتىزلاردا قالدۇرىدىغان ئەۋلاتلىرى كۆپىيىۋېرىدۇ. دە، ئاسان پەرقلەندۈرگىلى بولمايدۇ. تۇخۇمنى كۆپىنچە يوپۇرماقنىڭ ئارقا يۈزىگە كۆك پىت كۆپ جايغا تۇغدۇ. $25^{\circ}\text{C} \sim 23^{\circ}\text{C}$ لۇق شارائىتتا، 3 كۈندىلا

تۇخۇمدىن لىجىنكا چىقىدۇ. 5-ئايدىكى ھاۋا شارائىتىدا، لىجىنكا مەزگىلى 9 كۈن، فوچاق مەزگىلى 7 كۈن بولىدۇ. يېتىلگىنىنىڭ ئۆمرى ئادەتتە 40 كۈن ئۆپچۆرىسىدە بولىدۇ، قىشلىغان ئەۋلادىدىن يېتىلگەنلىرى 8 ئاي ياشايدۇ. لىجىنكىسى كۈچلۈك ئۆمىلەش ئىقتىدارىغا ئىگە. ئۆمرىدە 3 قېتىم تۈلەپ، جەمى 4 يىل ياشايدۇ، 80~638 دانە كۆك پىت يەيدۇ، بىر بىرىنى قىرىدۇ. لىجىنكىسى قېرىغاندىن كېيىن، يوپۇرماقنىڭ ئارقا بۇزىدە ياكى فورۇلۇب فالغان يوپۇرماقنىڭ ئىچىدە، قۇرۇق شاح-غازاك ۋە داڭگال ئارىسىدا، دەرەخ قوۋزغىنىنىڭ يۇچۇق-لىرى قانارلىق دالدا ئورۇنلاردا قۇچاققا ئايلىنىدۇ. 4-ئايدىن 10-ئايغىچە بولغان ئارىلىقتا، خانقىزنىڭ ھەر بىر ئەۋلادىنى بېتىشتۈرۈپ بولۇشى ئۈچۈن 20~30 كۈن ۋاقىت كېتىدۇ.

ئاسراش ۋە پايدىلىنىش يېقىنقى سىلاردىن بۇيان خېنەن ئۆلكىسىنىڭ ئەيبىك فاتارلىق پاختىچىلىق رايونلىرى خانقىز ئارقىلىق كېۋەز پىتىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى يوقىتىشتا كۆرۈنەرلىك نەتىجىگە ئېرىشتى. لېكىن ھازىر پەقەت تەبىئىي يادىلىنىش ۋە تەبىئىي ئوزۇق بىلەن بېقىشلا ئاساس قىلىنماقتا. سۈنئىي ئوزۇق بىلەن بېقىپ تازا كۆپەيتىش ئىشى تېخى يولغا قويۇلغانى بولمىدى، ھەرقايسى جايلار بۇ ئۆتكەلنى بۆسۈپ ئۆتۈش ئۈچۈن نەتىقىيات ئىلىپ بارماقتا. ھازىر ھەرقايسى جايلارنىڭ خانقىزدىن پايدىلىنىپ كېۋەز پىتىنى تىزگىنلەشتىكى ئۇسۇلى ئاساسەن تۆۋەندىكى 4 تەرەپنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

1) يېتىلگەنلىرىنى ئاسراپ قىشتىن ئۆتكۈزۈش: كۆك كۆلەملىك يەرلەرگە، مېۋىلىك باغلارغا، ئورمان ئارىسىغا پىلانلىق ھالدا قىچا، بۇغداي، بىدە قاتارلىق خانقىز قىشلايدىغان زىرائەتلەرنى تېرىپ، خانقىزنىڭ كۆپىيىپ قىشلىشىغا ماكان ھازىرلاپ بېرىش لازىم. بۇنىڭدىن باشقا، 10-ئاينىڭ ئاخىرىدا - قىروسىز چۈشۈشنىڭ ئالدى - كەينىدە، لوبو، بەسەي ياكى خانقىز قىشلايدىغان باشقا زىرائەتلەر ئارىسىدىن خانقىزنى كۆپلەپ تۇتۇپ كېلىپ، ئۇنى ھاشارەت باقىدىغان قۇتغا، كوزىغا (ئاستىغا نەم قۇم يېيىتىپ) ياكى قەغەز ساندۇققا سېلىپ، كۆك پىت چۈشكەن بەسەي، لوبو قاتارلىقلار بىلەن بېقىش، ئوزۇغىنى ھەر 2~3 كۈندە بىر قېتىم ئالماشتۇرۇپ تۇرۇش لازىم، 11-ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرى ۋە ئاخىرلىرىدا كۈنگەي تەرەپكە 3 چى چوڭقۇرلۇقتا كىچىك گەمە كولاپ، گەمىنىڭ ئۈستىنى توپا بىلەن يېپىپ، خانقىزنى قۇتا ياكى كوزا بىلەنلا گەمىدە ئامان - ئېسەن قىشلىتىش لازىم.

2) باش ئەتىيازدا كۆپەيتىش: 2-ئاينىڭ ئاخىرلىرىدا - ھاۋا تېمپېراتۇرىسى ئۆرلەپ 10°C تىن ئاشقاندا، يېتىلگەن ھاشارەت ھەركەتلىنىشكە باشلايدۇ، شۇنىڭدىن كېيىن، ھىلىقى ساقلاپ قويۇلغان ياكى قىشلىغان زىرائەتتىن تۇتۇپ كېلىنگەن خانقىزنى ھەسەل قوشۇلغان قۇشقاچ گۆشى، ھەسەل قوشۇلغان جىگەر، كۆممە قوناق كېپىنىڭ لىچىنىكىسى قاتارلىق باشقا ئوزۇقلار بىلەن بېقىش ياكى قىشلىغان زىرائەتتىن كۆك پىت

تۇتۇپ كېلىپ بېقىش لازىم، 3-ئايىنىڭ ئوتتۇرىلىرىغا كەلگەندە، ئۆيىدە بېقىلىۋاتقان خانقزنى پىلانلىق ھالدا كۆك پىت چۈش-كەن زىرائەتكە قويۇپ بېرىپ، نەبىئى شارائىت ئاستىدا كۆپەي-تىش لازىم، 5-ئايىنىڭ باشلىرىغا ۋە ئوتتۇرىلىرىغا كەلگەندە، بۇ زىرائەتلەردىكى خانقزنى تۇتۇپ كېلىپ، كۆك پىت يوقىتىشقا قويۇپ بېرىش لازىم.

(3) سۈنئى يول بىلەن كۆچۈرۈش: 4-، 5-ئايلىرىدا — كۆك پىت پەيدا بولىدىغان بەسىلدە خانقزنى قىشلايدىغان زىرائەت-لەردىن كۆپلەپ تۇتۇپ كېلىپ ۋە قاچىغا سېلىپ، يوپۇرماق ياكى كۆك ئوت بىلەن بېقىش، ئاندىن كېيىن، ئارفا قانتىنى قىرقىۋېتىپ قويۇپ بېرىش لازىم. نەكشۈرۈشلەرگە ئاساسلانغاندا، ھەر بىر مو كېۋەز ئېتىزىغا 1 مىڭدىن 2 مىڭغىچە خانقز فوبۇپ بېرىلسە، 2 كۈندىن كېيىن كۆك پىت %97.8 ئازىيىدىكەن. بىر خانقز 200~300 كۆك پىننى تىزگىنلىبەلەيدىكەن.

(4) سۈنئى يول بىلەن ئاۋۇتۇش: ھازىر سۈنئى يول بىلەن كۆپلەپ ئاۋۇتۇش ئۇسۇلى تەجى تىپلىغىنى يوق، ھەرھابىسى جايلار ئۇنىڭغا سۈنئى ئورۇق نېمىنىنا نۇرغۇن سىناقلىرىنى ئېلىپ باردى، مەسىلەن، قۇشقاچ گۆشى، چىمگەر، چىچەك تۈزىكى، ھەسەل شىرنىسى، ھانسا رەب تۇخۇمى. لىجىنىسكا، قوچاق قاتار-لىقلاردىن پايدىلىنىپ، بەلگىلىك ئۈنۈم ھاسىل قىلدى. چۈكگۈ پەلەر ئاكادېمىيىسى مېيچىك ھادىۋانات تەتقىقاتى بۇرنى يىمكى چىمگەرنى ئۇستاق چاناب. ھەسەل دوتۇپ (ئېغىزلىغى بويىچە

1:5 نىسبەتتە)، توقۇلما ئېزىش ماشىنىسى بىلەن (مىنۇتغا 8 مىڭ قېتىم ئايلاندۇرۇپ) 1~2 مىنۇت ئېزىپ، ئۇنى كىچىك قەغەز قۇتىغا قۇيۇپ، 20°C لۇق تۆۋەن تېمپېراتۇرىدا ساقلىغان، ئىشلىتىدىغان چاغدا بۆلۈپ-بۆلۈپ ئېلىپ، ئىللىتىپ ئېرىتىپ، كىچىك ئەينەك قاچىغا سېلىپ، قەغەزگە ياكى سۇلياۋغا قوشۇق بىلەن ئاز-ئازدىن ئېلىپ، قۇتىدىكى خانقىزنى ئوزۇقلاندۇرغان. 30 جۈپ خانقىزنىڭ بېقىلىش ئەھ-ۋالىدىن قارىغاندا، ئۇنىڭ چىشىسى 20 كۈندە ئەڭ كۆپ بولغاندا 396، ئەڭ ئاز بولغاندا 2 تۇخۇم سالىدىكەن. غەيرى تۈسلۈك خانقىز ئاشۇنداق سۈنئىي ئوزۇق بىلەن بېقىلسا، 8 كۈندىلا تۇخۇملايدىكەن. چىشىسىدىن 6 سى، ئەكىگىدىن 3 ى قاچىنىڭ ئىچىدە بېقىلسا، 20 كۈندە جەمى 215 تۇخۇم تۇغىدىكەن. بۇنداق سۈنئىي ئوزۇق ئانا ھەرە شىرنىسىدىن تەييارلىنىدىكەن، قويۇقلۇق دەرىجىسى قەغەزگە چاپلاشمىغۇدەك بولسا بولىدىكەن، بۇنىڭ بىلەن تۇخۇمدىن يېڭى چىققان لىچىنكا بېقىلسا، ئۇ يېتىلىپ قوچاققا ئايلىنىدىكەن، قوچاقتىن چىققانلىرى جۈپلىشىپ تۇخۇم سالالايدىكەن.

2. قارا جىيەكلىك قىزىل خانقىز

بۇ مەملىكەتنىڭ ھەرقايسى جايلىرىغا تارقالغان، ئۇنىڭ يېتىلگەنلىرىمۇ، لىچىنكىلىرىمۇ قاتتىق قاسراقلىق شارسىمان شاپتۇل قۇرۇتىنى، قاتتىق قاسراقلىق شارسىمان ئۈرۈك قۇرۇ-

تىنى، قاتتىق قاسراقلىق ياپىلاق قۇرۇتىنى، يۇمشاق قاسراقلىق ئۇزۇن ھالۋىۋىدەت قۇرۇتىنى، ئاق قاسراقلىق ئۈجمە قۇرۇتىنى، قاسراقلىق چىغ ئاياقنى شۇنىڭدەك يېتىلگەن كۆك پىتىنى، ئۇنىڭ بالىلىرىنى ۋە قۇرۇت تۇخۇملىرىنى يەيدۇ، بولۇپمۇ مۇسلىك دەرەخ ۋە ئورمانلاردا بولىدىغان شارسىمان قاتتىق قاسراقلىق قۇرۇتلارنى ئىشتىھاسى بىلەن يەيدۇ.

تاشقى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى يېتىلگەنلىرىنىڭ ئۇزۇنلۇغى

4~6 مىللىمېتىر، كەڭلىكى 4~5 مىللىمېتىر بولىدۇ. تېنى يۇمۇ-لاقراق بولۇپ، يېرىم شار شەكلىدىكى گۈمبەزگە ئوخشاش كۆرۈنىدۇ. بېشى قىزغۇچ قوڭۇر، داغسىز بولىدۇ. دولىسى قىزغۇچ قوڭۇر، قاتتىق فانتىنىڭ ئاساسى رەڭگى چىلان قىزىل، تاشقى قىرغىغى، ئارفا قىرغىغى پارا بولىدۇ، قاتتىق فانتىنىڭ گىرۋىكى قوڭۇر بولىدۇ. قوساق قىسمى قىزغۇچ قوڭۇر بولىدۇ. (2-رەسىم). تۇخۇمى ئۇزۇنچاق يۇمۇلاق، ساغۇچ بولىدۇ. قېرىغان لىچىنكىسى سۇس بوز بولۇپ، ئىككى ئۇچى ئىنچىكە، ئوتتۇرىسى توم بولىدۇ، ئۇزۇنلۇغى 8~10 مىللىمېتىر بولىدۇ،



ئۈچ جۈپ پۇتى بولىدۇ، كۆكرەك قىسمىدىن قوساق قىسمىغا سوزۇلغان غوليارما سىزىغىنىڭ ئىككى يان تەرىپىدە ئۈچ رەت كۈلرەك تىكەنسيمان تۈك بولىدۇ.

ياشاش ئادىتى 1963-يىلى جىڭجۇدا 2-رەسىم قارا جىيە ئېلىپ بېرىلغان تەكشۈرۈشكە ئاساسلان- ۸كىلىك قىزىل خانقىز

غاندا، ھەر يىلى بىر قېتىم ئەۋلات فالدۇرىدىكەن، يېتىلىپ قىشلاپ، كېيىنكى يىلى 3-ئايىنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا ئۈچەكتىن چىقىپ ئوزۇقلىنىشقا باشلايدىكەن، چىشىسى 3~4 كۈندىن كېيىنلا تۇخۇملايدىكەن، كۆپىنچە، يەپ قۇرۇقداپ قويۇلغان قاسراق ئىچىگە، دەرەخ قوۋزىغىنىڭ بېرىغىغا تۇغىدىكەن. ھەر ئېتىمدا بىرقانچىدىن ئون نەچچىگىچە تۇغىدىكەن، تۇخۇمىنى رەتلىك تىزمايدىكەن، پۈتۈن ئۆمرىدە 100 دىن ئارتۇق تۇخۇم تۇغىدىكەن. ئۇنىڭ لىچىنىكلىرى 3-ئايىنىڭ ئاخىرىدا تۇخۇمدىن چىقىپ، يېقىن جايلاردىكى قاسراقنىڭ ئەتراپىغا توپلىشىدۇ. ناھايىتى ئاز ھەركەتلىنىدۇ. 2 ياشقا كىرگەندىن كېيىن بارغانسېرى كۆپ ھەركەت قىلىپ، يۇمشاق تەنلىك قاسراقلىق ئۇششاق قۇرۇتلارنى شۇ پېتىلا يۇتۇپ كېتىدۇ. قاسراقلىق قۇرۇتنىڭ تېنى فاتتېغلاشقاندىن كېيىن، ئۇنىڭ تېنىدىن بىر تۆشۈك ئېچىپ، تۇخۇمىنى يەيدۇ. بۇ چاغدا، تازا كۆپ يەيدىغان بولىدۇ. دە، قاسراقلىق قۇرۇتنى خېلىلا تىزگىنلىيەلەيدۇ. 4-ئايىنىڭ ئاخىرلىرىدا، لىچىنىكىسى قېرىيدۇ. شۇنىڭدىن كېيىن، ئۇ مۇبلىك دەرەخنىڭ، مۇسسىز دەرەخنىڭ شاخلىرى ئاستىغا توپلىشىپ ماكانلىشىدۇ. بىرقانچىسى ھەتتا بىرقانچە يۈزى بىرلىكتە قوچاققا ئايلىنىدۇ. 20 نەچچە كۈندىن كېيىن 5-ئايىنىڭ ئوتتۇرىلىرى ۋە ئاخىرلىرىدا، يېتىلگەنلىرى قوچاقتىن چىقىپ، قوچاق قېيىنىڭ قېسىدا بېتىپ، تەخمىنەن 2 كۈندىن كېيىن ئۆلمەشكە، ئۇچۇشقا ۋە ئوزۇق-

لىنىشقا باشلايدۇ، ئەمما جۈيلەشمەيدۇ، يەنە 5~6 كۈن ئۆتكەندىن كېيىن، مېۋىلىك دەرەخنىڭ ۋە مېۋىسىز دەرەخنىڭ تۆۋەن شاخلىرىدىكى يوپۇرماقنىڭ ئارفا يۈزىدە باكى دەرىجى شېخنىڭ پەس يەرلىرىدە نەچچە ئونى يىغىلىپ چىقىرىلىدۇ ۋە كۈرۈك بولىدۇ. كۈرۈك بولغانلىرى 6-ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدىن باشلاپ، 100 نەچچە كۈن كۈرۈكلۈك مەزگىلنى باشتىن كەچۈرۈپ، 9-ئاينىڭ بېشىدا يېشىلىدۇ. كۈرۈك بولۇش جەريانىدا ئۆلگەنلىرىنىڭ نىسبىتى %60 تىن ئاشىدۇ. كۈرۈكى يېشىلگەندىن كېيىن، بىر مەزگىل مېۋىلىك دەرەخلەرنىڭ ئۈستىدە يۈرۈپ ئوزۇقلىنىدۇ ۋە جۈپلىشىدۇ، لېكىن تۇخۇملىمايدۇ. 11-ئاينىڭ ئاخىرلىرىدا مېۋىلىك دەرىجى ئەتراپىدىكى داڭگاللىققا، غازاڭ ئارىسىغا، تاشلارنىڭ ئاستىغا ۋە باشقا دالدا يەرلەرگە كۆچۈپ قىشلاشقا كىرىشىدۇ. قىشلاش جەريانىدىكى ئۆلۈش نىسبىتى %80 ئۆپچۆرىسىدە بولىدۇ. بۇ ھادىسە نۇرغا ئىنتىلىدۇ ۋە بىر بىرىنى ئۆلتۈرىدۇ، ئاچلىققا بەك چىدايدۇ، بولۇپمۇ قىش چىقىپ بولغۇچە 3~4 ئاي ئىچىدە ھىج نەرسە يىمەيدۇ.

ئاسراش ۋە پايدىلىنىش قارا جىيەكلىك قىزىل خانقىزنىڭ تەبىئەت دۇنياسىدا زىيانداش ھادىسە تى تۈنۈپ يىيىش رولى ناھايىتى چوڭ، لېكىن شارىمان فاتتىق قاسراقلىق قۇرۇت تىزگىنلەنگەندىن كېيىن، ئوزۇقلۇقىنىڭ بىتتىشمەسلىكى سەۋىيەسىدىن، قارا جىيەكلىك قىزىل خانقىز كۆپلەپ ئۆلۈپ كىتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، قارا جىيەكلىك قىزىل خانقىزنىڭ

يازدىن ئۆتۈپ قىشلاش جەريانىدىكى ئۆلۈش نىسبىتى يۇقۇرى، قالدۇرىدىغان ئەۋلادى ئاز بولىدۇ، نەتىجىدە سۈنئىي يول بىلەن كۆپلەپ ئاۋۇتۇشقا قىيىنچىلىق تۇغۇلىدۇ. شۇڭا تىكەنلىك ئاكا تەسىيە ۋە كىلىون دەرىخىدىكى قاتتىق قاسراقلىق ياپىلاق شارىدە مان قۇرۇت ۋە بۇمىشاق قاسراقلىق ئۇزۇن ھالۋىئۇد ت قۇرۇتى قاتارلىق ھاشارەتلەردىن پايدىلىنىپ، قارا جىيە كىلىك قىزىل خاندە قىزنى سۈنئىي يول بىلەن كۆپەيتىۋېلىپ، ئاندىن ئۇنى مۇبىلىك باقتا ياكى ئورمانلىققا قويۇپ بېرىپ، قاسراقلىق قۇرۇتنى يوقىتىش كېرەك. مۇبىلىك باغ ۋە ئورمانلىقتىكى قاسراقلىق قۇرۇت تىزگىنلەنگەندىن كېيىن، ئاندىن خانقىزنى يىمەكلىكى بار تىكەنلىك ئاكا تەسىيە، كىلىون دەرىخىلىرىگە ۋە باشقا مۇبىلىك دەرىخىلەرگە، ئورمانلىققا يۆتكەپ قويۇش كېرەك، شۇنداق قىلغاندا، قارا جىيە كىلىك قىزىل خانقىزنىڭ ئوزۇقلۇق يېتىشمەي ئۆلۈپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ. قارا جىيە كىلىك قىزىل خانقىز ياز پەسلىدە كۈرۈك بولغاندا، سۈنئىي ئوزۇقلاندۇرۇش ئارقىلىق ئۇنىڭ تەبىئىي ئۆلۈپ كېتىشى نىسبىتىنى ئازايتىش لازىم.

بۇنىڭدىن باشقا، خىمىيىۋى دىخانچىلىق دورىلىرى ئارقىلىق باشقا زىيانداش ھاشارەتلەرنى يوقىتىش ۋاقتىدا، ھەممىنى ئۆلتۈرىدىغان "666" "DDT" "1605" قاتارلىق دورىلارنى ئىشلەتمەسلىك لازىم. قارا جىيە كىلىك قىزىل خانقىز تازا كۆپىيىدىغان مەزگىلدە دورا چاچماسلىق ياكى قۇر ئاتلاپ چېچىش قاتارلىق

مۇداپىئە چارىلىرىنى قوللىنىپ، ئۇنىڭ ئۆلۈش نىسبىتىنى ئازايتىش لازىم.

3. سالجا يەيدىغان قارا داغلىق خانقز

بۇ مەملىكەتنىڭ ھەممە جايلىرىغا تارقالغان بولۇپ، قارا ئىگەك خانقز دەپمۇ ئاتىلىدۇ. ئوزۇقلىنىشى مەخسۇسلاشقان، كۆپلەپ پەيدا بولغان چاغدا، زىيانداش ھاشارەتنى تىزگىنلەشتە كۆرۈنەرلىك رول ئوينايدۇ. قىزىل دولانا ئۆمۈچۈكى، قىزىل كېۋەز ئۆمۈچۈكى ۋە كۆك پىت يەيدۇ.

تاشقى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى يېتىلگەننىڭ تېنى قارا-تۇل بولىدۇ. ئۇزۇنلۇغى 2 مىللىمېتىرچە، كەڭلىكى 1 مىللىمېتىر بولىدۇ، شەكلى سوفىچاق بولۇپ، يېرىم شارسىمان گۈمبەزگە ئوخشاش كۆرۈنىدۇ، ئاقۇش ئۇزۇن بوز تۈكى بولىدۇ. ئەركىگە نىڭ بېشى ساغۇچ قوڭۇر، چىشىنىڭ بېشى قارا بولىدۇ.



دولسى ۋە قاتتىق فانتى پۈتۈنلەي قارا بولىدۇ. قوساق قىسمىمۇ، قاندەنسىنىڭ گىرۋىگىمۇ قارا بولىدۇ.

3-رەسىم (3-رەسىم). 3-رەسىم سالجا يەيدىغان

ياشاش ئادىتى ھەر يىلى 4~5 قارا داغلىق خانقز

ئەۋلات قالدۇرىدۇ، يېتىلگەنلىرى دەرەخ قوۋزىغىنىڭ ئاستىدا، ئوت-چۆپ ئارىسىدا، قىغ ئارىسىدا ۋە يەرنىڭ يېرىقلىرىدا قىشلايدۇ. كېيىنكى يىلى 5-ئايدا ھەركەتلىنىشكە باشلاپ،

قىزىل ئۆمۈچۈك ۋە كۆك پىت تۇتۇپ يەيدۇ، يېگەندە، بۇ ھاشارەتلەرنىڭ تېنىدىكى سۇيۇقلۇقنى پۈتۈنلەي شوراپ، پوستىنىلا قالدۇرىدۇ. 5-ئايىنىڭ ئوتتۇرىلىرى ۋە ئاخىرلىرىدىن 6-ئايىنىڭ باشلىرى ۋە ئوتتۇرىلىرىغىچە تۇخۇملايدۇ. تۇخۇمنى يوپۇرماقنىڭ ئارقا يۈزىدىكى قىزىل ئۆمۈچۈك تۇخۇمىنىڭ چۆرىسىگە ياكى تورغا تۇغىدۇ. چىشىنىڭ ھەر بىرى 500~800 تۇخۇم تۇغىدۇ. لىجىنىكىسى تۇخۇم-دىن چىققاندىن كېيىن، ئۆمىلەپ يۈرۈپ ئوزۇقلىنىدۇ، ھەر كۈنى 130چە قىزىل ئۆمۈچۈك تۇتۇپ يەيدۇ، بىر بىرنى ئۆلۈرىدۇ. 4 ياشلىق لىجىنىكىسى، كۆپىنچە، دەرەخنىڭ كۈن چۈشمەيدىغان يەردىكى يوپۇرماقلىرىنىڭ ئارقا يۈزىگە يىغىلىپ، قۇيرۇغىنى يوپۇرماققا يېپىشتۈرۈپ قوچاققا ئايلىنىدۇ، 4~5 كۈندىن كېيىن قوچاقتىن چىقىدۇ. يېتىلگەنلىرى 29~62 كۈن ئۆمۈر كۆرىدۇ. ھەر كۈنى 20~50 قىزىل ئۆمۈچۈك نۇپۇپ يەيدۇ، دىمەك، پۈتۈن ئۆمرىدە 600~1800 قىزىل ئۆمۈچۈك يەيدۇ. ئوزۇقلۇق يېتەرلىك بولغان ئەھۋالدا بىر بىرنى ئۆلۈر-مەيدۇ، ئەمما ئۆزىنىڭ تۇخۇمىنى يەيدۇ. ئەڭ ئاخىرقى ئەۋلادىدىن يېتىلگەنلىرى 9-ئايىنىڭ ئاخىرلىرىدىن باشلاپ ئۈچەككە كىرىدۇ.

ئاسراتى ۋە پايدىلىنىش سۈنئىي ئوزۇق مەسىلىسى نېچى ھەل بولمىدى. باشقا جايلارنىڭ خەۋەرلىرىدىن قارىغاندا، ساب ھەسەل بىلەن باقسا ناھايىتى ياخشى بولىدىكەن. ئوزۇقلايدۇ.


رىدىغان چاغدا، دىزىنېكىسە قىلىنغان باختىنى ئوزۇقلۇققا
 ھىلا. ئۇنى ئۆسۈرۈش قاچىسىغا سىلىنغان ئالما يوپۇر-
 مىغى تاكى ئاق فەغەرگە قوبۇب، ھەر 2 كۈندە بىر قېتىم
 بەكگۈسلەپ تۇرسا، ئەي بولۇش نىسبىتى %100 كە يېتىدىكەن،
 ئەمما نورمال نۇخۇم نۇغالىمايدىكەن. 6 ئايىدىن 11 ئايغىچە،
 ئەك ۋىسىغا بولغاندا، 2 ئاسدا بىر ئەۋلادىسى سىتىشۈرۈپ
 بولىدىكەن، جىسىسى كۈنىگە ئوننۇرا ھىساپ بىلەن 6.9~11.8
 بۇخۇم نۇغىدىكەن.

4. تاغىل خانقىز

بۇ مەملىكەتتىكى ھەممە بېرىگە بارغان، فىزىل ئۆمۈچۈك،
 كۆك بىت ۋە ئاسقا ھاسارەنلەرىك بۇخۇمنى يەيدۇ.
 قاشتى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى بېتىلگىنىنىك ئۆزۈمبۇغى
 3~5 مىللىمېتىر، كەكلىكى 3~4 مىللىمېتىر بولىدۇ. شەكلى
 سومچاق. رەڭگى سىرىق كېلىدۇ، دۈمبىسى گۈمبەزگە ئوخشاش
 كۆتىرىلىپ تۇرىدۇ. قاتتىق قانتىدىكى داغ سىرىقچىلىرى ئىككى
 جىل تىنا بولىدۇ: ئەسلى تىپتىكى بېتىلگىنىنىك دۈمبىسىدە
 قارامۇل تاغىل سىرىقچە بولىدۇ. ئۆزگەرگەن بىرىمچى تىپتىكى-
 لىرىنىك بەلكىمىدە بىر دانە بۇمۇلاق قارا داغ بولىدۇ؛
 ئۆزگەرگەن ئىككىمچى نىپتىكىلىرىنىك عولنىك بۇرچىگىدە بىر
 ئۆمۇلاق قارا داغ بولۇستىن تاسقىرى، قاتتىق قانتىنىك ئوت-
 نۇرا، نۆۋەن بەرىمىدۇمۇ بىر قارا داغ بولىدۇ. مەيلى ئۆزگەرگەن

تېتىمكىلىرىنىڭ قايسى خىلدىكىسى بولۇشىدىن قاتتىق قورقۇنۇشقا
 ھەممىسىنىڭ فاتتىق فانتىنىڭ بىرلىشىدىغان بىرىدە ئۆزۈمبىسىغا
 سوزۇلغان بىر تال قارا سىزىق بولىدۇ (4-رەسىمگە قاراڭ).

ياشاش ئادىتى يىلىغا 3~4 ئەۋلات قالدۇرىدۇ، يېتىلگەندە
 لىرى يالغۇز ياكى توپلىشىپ، شاپتۇل، ئۈرۈك دەرىخىنىڭ كۆك
 پىت چۈشكەن يوبۇرماقلىرىنىڭ تۈگۈنەكلىرى ئىچىدە ياكى
 دەرەخ قوۋزىغىنىڭ بىرىقلىرىدا قىشلايدۇ. 2-سىلى ھاۋا ئىللە
 غاندا ھەركەتلىنىشكە باشلاپ، ئوزۇقلىنىپ، مۈپلىنىپ، بوپۇر-
 ماڭنىڭ يۈزىگە بىرەنجە ياكى بىرنەنجە 10 نۇجۇم نۇعدۇ.



4. رەسىم ناغىل خانقىز

1. نىملىكى 2. نۇجۇمى 3. لىخىز
- كەسى 4. قوۋزىغى 5. نىملىكىنىڭ
- ئۆزگەرگەن 1- نىمى 6. نىملىكى
- نىمىڭ ئۆزگەرگەن 2- نىمى

بىر ھەپتە ئۆتكەندە تۇخۇمدىن
 لىچىنىكا چىقىدۇ. لىچىنىكىسى
 قېرىغاندىن كېيىن، شىلىملىق
 ماددا چىقىرىپ، قۇيرۇغىنى ئۇنىڭغا
 يېپىشتۈرۈپ قوچاققا ئايلىنىدۇ.
 يېتىلگەنلىرىمۇ، لىچىنىكىلىرىمۇ
 چاققان بولۇپ، كۈچلۈك ھەركەت-
 لىنىش ئىقتىدارىغا ئىگە، يېتىل-
 گەنلىرى 11، 12-ئايلىرىدا قىشلاش

ئۈچۈن ئۈجەككە كىرىپ كېتىدۇ.
ئاسراش ۋە پايدىلىنىش
 7 داغلىق خانقىز سىلىنى
 ئوخشاش.

5. شەيرى نۇسلۇك خانقىز

بۇ مەملىكەتنىڭ ھەممە يېرىگە تارقالغان، كۆك پىت، قاس-
رافلىق قۇرۇت ۋە ياغاچ پىتى فاتارلىقلارنى تۇتۇپ يەيدۇ.

تاشقى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى بېتىلگەنلىرىنىڭ ئۇزۇن-

لۇغى 5~8 مىللىمېتىر، سەككىز نۇخۇمىسىمان بولۇپ، كۈمبەزگە

ئوخشاش كۆرۈنىدۇ. تېنىنىڭ رەڭگىدە، داغلىرىدا ئۆزگىرىش

كۆپرەك بولىدۇ. دولىسى سېرىق بولۇپ، ئوتتۇرىسىدا "M"

شەكىللىك قارا سىزىق بولىدۇ، ئەمما ئوخشاش بولمىغان شەكىلدە

ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ. قاننىق قاننىڭ ئارقا تەرىپىدە ئوغرىسىغا

كەتكەن بىر تال ئۇمۇرتقا سىزىقى بولىدۇ، دېغىنىڭ رەڭگىمۇ

كۆپ ئۆزگىرىدۇ، بەزىلىرىنىڭ سىسى سېرىق بولۇپ، قاتتىق

قاننىدا 1 دانە دېغى بولىدۇ، بۇ

داغىلار بىر جۈپ ئاكى بىر قانچە

جۈپ بولىدۇ، ياكى بولمىسا بۇنۇزىد-

لەي ئۆزگىرىپ بوپات كېلىدۇ.

بەزىلىرىنىڭ قاتتىق قاننىسى


قارامۇل بولۇپ، ئۇنىڭدا 2 دانە

قىزىل داغ بولىدۇ (5-رەسىم).

ياشايش ئادىتى ھە دىلى

بۇ ئىنسانلار ئالدىرىدۇ، بېتىلگە--

لىرى نامىك بېرىمىدا، تاسىنىڭ



5-رەسىم غەيرى نۇسلۇك خانقىز

1. غەيرى نۇسلۇك خانقىزنىڭ

19 داغلىق ئۆرگەرىگەن نۇرى

2. غەيرى نۇسلۇك خانقىزنىڭ

2 داغلىق ئۆرگەرىگەن نۇرى

تۆشۈكلىرىدە، ئۆڭكۈردە توپلىشىپ قىشلايدۇ. كېيىنكى يىلى 3-، 4- ئايلاردا ئۈچەكتى چىقىپ، نەسپۈت پىتى، ئۆڭكۈر لۈك ئاق تېرەكتە بولىدىغان چىپار پىت. ئالما پىتى فاتارلىق ھاشارەتلەرنى تۇتۇپ يەيدۇ. 4- ئاينىڭ ئاخىرلىرىدىن 5- ئاينىڭ باشلىرىغىچە ھۈپلىشىپ تۇخۇملايدۇ، 5- ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرى ۋە ئاخىرلىرىدا تۇخۇمدىن لىجىنكىسى چىقىدۇ، 5-، 6- ئايلاردا يىتىلىپ قوجاقتىن چىققاندىن كېيىن كېۋەزلىككە يۆتكىلىپ، كۆپىيىپ، كېۋەز پىتىنى تۇتۇپ يەيدۇ، ئوزۇنلىنىش مىقدارى 7 داغلىق خانقىزغا قارىغاندا چوڭ بولىدۇ. ئەڭ ئاخىرقى بىر ئەۋلادىدىن يېتىلگەنلىرى 11- ئايلاردا قىشلايدىغان ماكان ئىزلەيدۇ.

ئاسراش ۋە پايدىلىنىش يېتىلگەنلىرى دالدا، دەرەخنىڭ يىلتىزىدا، يېرىقلىرىدا، ئۆڭكۈردە ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش جايلاردا توپلىشىپ قىشلاشنى باخشى كۆرىدۇ، ۋە قىشنا سوغاق قاتتىق بولىدىغان بولغاچقا، كۆپلەپ ئۆلۈپ كېتىدۇ. جىلنى ئۆلكىسىنىڭ خۇەبىدى ناھىيىسىدىكى كەڭ ئامما ھەر يىلى 10-، 11- ئايلاردا قاتتىق سوغاق يېتىپ كېلىشتىن بۇرۇن، تاغدىن خاندان قىزنى تۇتۇپ كېلىپ ئۆبىدە ئاسراپ ھەم مۇۋاپىق ئوزۇقلاندۇرۇپ، ئىككىنچى يىلى ھاۋا ئىسسىغاندا، كۆڭ پىت تارقالغان ئېتىزلارغا ياكى ئورمانلىققا، مېۋىلىك دەرەخلەرگە قونۇپ بېرىدۇ. سىچۇەن ئۆلكىسىنىڭ يەنچۇەن ناھىيىسى ئېتىزلارغا خانقىزنى جەلپ قىلىش ئەسۋاۋى ئورۇنلاشتۇرۇپ، بۇرغۇن

خانقزنى جەلپ قىلىپ قىشتىن ئۆتكۈزىدۇ. ئۇلارنىڭ جەلپ قىلىش ئەسۋاۋى ھاۋا رايى پونكىتىنىڭ بوتكىسى بولۇپ، ئۇلار بۇ ساندۇقنى نوغرىدى - توغرىلا ئەسلىدىكى ئىگىزلىكتە قويغان ھەمدە ئۇنىڭدىن 1~2 سانتىمېتىرلىق يوقۇق ئاچقان. بوتكىنىڭ خەنۇپ تەرىپىگە دىئامېتىرى 1~2 سانتىمېتىر، ئۇزۇنلۇقى 35 سانتىمېتىر كىلىدىغان 4~5 دانە قەغەز تۇرۇپكا ئوربانغان، بۇنىڭ بىلەن ھەر يىلى كۈزدە ۋە قىشتا نۇرغۇن خانقزنى جەلپ قىلىپ قىشلاتقان. تەكشۈرۈشكە ئاساسلانغاندا، 1972 - يىلى قىشتا 5 مىڭدىن كۆپرەك خانقز جەلپ قىلىنىپ قىشلىتىلغان؛ 1973 - يىلى جەلپ قىلىنىپ قىشلىتىلغان خانقز 7~8 مىڭغا يەتكەن؛ 1974 - يىلىمۇ 6 مىڭدىن ئارتۇق خانقز جەلپ قىلىنىپ قىشلىتىلغان. بۇنىڭدىن باشقا، ئىتىزلارغا تاش دۆۋىلەب قويۇپ، ئۇنىڭ ئاسنىغا ئۆلگەن خانقزنى فوبۇپ قويۇش بىلەنمۇ خانقزنى جەلپ قىلىپ قىشلاتقىلى بولىدۇ.

خىنەن ئۆلكىسى تۈكبەي ناھىيىلىك دىخانچىلىق ئىدارىسىدىكى سۈلۈگىبىلىك ئالدىنى ئىلىش - بوقتىش بونكىتى شۇ جاينىڭ ئۆزىدىن يىغىۋېلىنغان غەيرى تۈسلۈك خانقزنى سۈنئىي ئۇسۇل بىلەن بېقىپ، 4 - ئاينىڭ ئاخىرلىرى، 5 - ئاينىڭ باشلىرىدا خانقزنىڭ نۇخۇمىنى كۆپلەپ قولغا كەلتۈرگەن، ھەر كۈنى نۇغۇلغان تۇخۇملارنى شاپتۇل يىلىمى بىلەن قەغەزگە بېشىشتۈرۈپ، تۇخۇم تەۋىكى باسقان، بۇنى $7^{\circ}\text{C} \sim 2^{\circ}\text{C}$ لۇق تۆۋەن تېمپېراتۇرىدا فوبۇپ 2~20 كۈن نۇرغۇزغان، فوبۇپ

بېرىشتىن بۇرۇن ئېلىۋېلىپ، نورمال تېمپېراتۇرىدا 2~4 كۈن قويغان، بۇ ئارىلىقتا نۇخۇم پۈتۈنلەي قارايدىغان ھەمدە بىر قىسىم تۇخۇمدىن لىجىكا چىقىشقا باشلىغان. ئۇلار نۇخۇم نەۋسىسى كېسىپ ئۇستاق پارچە-پارچە قىلىپ، ئاندىن ساپىۋىل يىلىمى ياكى شىلىم بىلەن كېۋەز يوپۇرمىغىنىڭ ئارقا يۈزىگە چاپلىغان ياكى تۇخۇمنى كۆۋەزنىڭ تاج يوپۇرمىغىنىڭ ئىچىگە قىسىپ قويغان، لىجىكىسى تۇخۇمدىن چىققاندىن كېيىنلا، كۆك پىنى كۆپلەپ تۇتۇپ يىگەن. بۇنىڭ بىلەن كۆك پىنىنىڭ ئالدىسى ئېلىنىش ۋە ئۇنى يوقىتىش نۇپۇسى 89.1%~92.3% كە يەتكەن. بۇنىڭدىن باشقا، يەنە ئالىمۇن كۆزنى قوبۇب بېرىش ئۇسۇلى بويىچە، غەيرى تۈسۈك خاقىزىك نۇخۇمىسى زىرائەت يوپۇر-مىغىغا پۈركۈسۈمۈ بولىدۇ.

6. كۆپ ئۇچرايدىغان باشقا خانىقىزىلار

1. قىزىل داغلىق خانىقىزىلار يېتىلگەنلىرىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 3~4 مىللىمېتىر بولىدۇ. بېشى قارا، دولىسى پۈتۈنلەي قارا بولىدۇ. قاتتىق قاننى قارا بولۇپ، چىك ئوتتۇرىسىدا بىردىن بۇمۇلاق قىزىل داغ بولىدۇ. پۇنى قارا بولىدۇ (6-رەسىمنىڭ 1-سى). يېتىلگەنلىرىمۇ، لىجىكىلىرىمۇ قاتتىق قاسراقلىق سا، سىمان باپىلاق قۇرۇتسى، ئاق قاسراقلىق ئۈچمە قۇرۇتسى ئۈنۈپ يەيدۇ.
2. ئۆزگىرىشچان خانىقىزىلار يېتىلگەنلىرىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 4~


5 مىللىمىتىر بولىدۇ. بېشىنىڭ ئالدى تەرىسى ساغۇچ ئاق، ئارقا تەرىپى قاراغۇل بولىدۇ. دولىسى ساغۇچ ئاق بولىدۇ، ئارقا تەرىپىدىن ئالدى تەرىپىگە تۆب ئاچماق قاراغۇل سىزىق سۈرۈلغان بولىدۇ. قاتتىق قانتىنىڭ سىرتقى تەرىپى نەكشى بولۇپ، جەن تەرىپىگە كىچىك نۇرسۇ. ساغۇچ فوكۇر ياكى قىزغۇچ فوكۇر كېلىدۇ. جەمى 13 دانە قارا دىغى بولىدۇ، بەزىدە ئونمۇردىكى 2~3 دېغى بولۇپ كەتكەن بولىدۇ (6-رەسىمنىڭ 2-سى).

ھەر بىلى 3~4 ئەۋلاد قالدۇرىدۇ. تۈكەي تاغلىق رايوندا ھەر بىلى 6~8 ئەۋلاد قالدۇرىدۇ، يېتىلگەنلىرى ناز ئاستىدا، ئۆككۈر ئىچىدە، قالدۇق ساچ-غازاڭ ئاستىدا قىشلايدۇ. يېتىلگەنلىرىمۇ لىجىنىكىلىرىمۇ كۈز يېتىنى، بۇخۇمەك يېتىنى تۇتۇپ بەيدۇ. غەربىي جىمىنىڭ تاغلىق رايونىدىكى ئامما ھەر يىلى كۈزنىڭ ئاخىرلىرىدا ناھەقچى، خانغىز قىشلايدىغان ئۆككۈر-لەردىن خانغىز بۇيۇپ كېلىپ، ئۆيدە يېقىپ ئامان-ئىسەن قىلىنىپ، كېيىنكى يىلى كۈزلىككە قوبۇپ بېرىپ كۆك پىت يوقىنىدۇ.

3. ئىككى داغلىق خانغىز يېتىلگەنلىرىمۇ، لىجىنىكىلىرىمۇ ئىتالىدا بولىدىغان بېسىل بوزاڭ يېتىنى، بۇخۇمەك پىنىسى، كۈز بىنىسى. بۇغداي يېتىنى، شاپسۇل پىنىسى، نۇبۇتلىق قاسراغىلىق قۇرۇقنى تۇتۇپ بەيدۇ.

يېتىلگەنلىرىنىڭ تېنى 4~5 مىللىمېتىر، كەڭلىكى 3~4

مىللىمېتىر، ئۇزۇنچاق بۇخۇم شەكلىدە بولۇپ، يېرىم شار شەكلىدىكى گۈمبەزگە ئوخشاش كۆرۈنىدۇ، بېشى قارامنۇل.



كۆزنىڭ ئىچكى يان نەرىبىدە سىردىن يېرىم بۇمۇلاق سېرىق داغ بولىدۇ. دۈلىسى ساغۇچ ئاي بولۇپ، دۈلىسىدا "M" شەكىللىك بىر قارا سىزىق بولىدۇ. بۇ داغنىڭ ئۈ-

سنىدىكى، ئاسنىدىكى ساغۇچ ئاق بوش ئارىلىق بەزىدە قارامنۇل بولۇپ قالىدۇ. قاتتىق فانتى

ساغۇچ قوڭۇر ياكى قىزغۇچ سېرىق بولۇپ، چىك ئوتتۇرىسىدا توغرىد-

سىغا كەتكەن ئۇزۇن قارا داغ بولىدۇ. بۇ داغلار ئايرىم-ئايرىم

ھالدا قاتتىق فانتىنىڭ ئوتتۇرىد-سىغا جابلاشقان بولىدۇ. داغنىڭ

6-رەسىم كۆپ ئۇچرايدىغان باشقا خانقىزلار

1. قىزىل داغلىق خانقىر

2. ئۆزگىرىشچان خانقىر

3. بۆت داغلىق ئاسمان خانقىر

4. ئىككى داغلىق خانقىر

رەڭگى كۆپ ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ (6-رەسىمنىڭ 4-سى).

4. تۆت داغلىق ئايسمان خانقىز بېتىلگەنلىرىمۇ، لىچىد-

كىلىرىمۇ بۇعداي پىتىنى، كۆكتات پىتىنى، قارىغاي پىتىنى تۇنۇپ يەيدۇ.

بېتىلگىنىنىڭ تېسى 5~7 مىللىمېتىر ئۇزۇنلۇقتا، 4~6 مىللى-

مېتىر كەڭلىكتە بولۇپ، سوزۇنچاق گۈمبەز شەكلىدە كۆرۈنىدۇ.

بېشى، دولسى ساغۇچ ئاق بولىدۇ، كۆكرەك قىسمىنىڭ بۇقۇرى نەرىپىدە ئېنىق كۆرۈنىدىغان "I" شەكىللىك قارا داغ بولىدۇ. قاتتىق قاننى قىزغۇچ سېرىق بولۇپ، قاتتىق ھەر بىرىدە 3 قاتاردىن قارا داغ بولىدۇ. قاتتىق قاننىڭ قاننىڭ بىرلىشىدىغان يېرىدە، قولتۇغدا، تاشقى قىرغىدا ناھايىتى نار قارا يوللۇق گىرۈك بولىدۇ (6-رەسىمنىڭ 3-سى).

2. ئالتۇن كۆز

ئالتۇن كۆزنىڭ لىچىنكىسى كۆك پىت يەيدىغان قۇرۇت دەپ ئاتىلىدۇ، ئۇ كۆك پىت، قاسراقلىق قۇرۇق، قىزىل ئۆمۈچۈك، يوپۇرماق تومۇز قۇرۇتى، نېرىپىس، كېيىنەك تىپىدىكىلەرنىڭ لىچىنكىلىرى ۋە خىلمۇ-خىل ھاشارەتلەرنىڭ نۇخۇمىنى يەيدىغان بىر خىل مۇھىم كۈشەندە ھاشارە. بېقىد-قى يىللاردىن بۇيان ئېلىمىزنىڭ ھەرقايسى پاختىچىلىق رايونلىرىدا كەك كۆلەمدە سۈنئىي يول بىلەن كۆپەيتىپ كۈشەنلىككە قويۇپ بېرىلىپ، كېۋەز پىتى، غوزا قۇرۇق قاتارلىق ھاشارەلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە يوقىتىشقا كۆرۈنەرلىك ئۈنۈم ھاسىل قىلىندى. ھازىر مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلار ماشىنىلاشتۇرۇلغان زاۋۇتلاردا ئاۋۇنۇسى ۋە سۈنئىي تۇخۇم ياساش ماشىنىسى تەتقىق قىلىپ ياساش خىزمىتىنى ئېلىپ بارماقتا. سۈنئىي ئوزۇق جەھەتتە تىمۇ بىرمۇنچە تەجرىبە تېپىپ چىقىلدى.

بېتىلگەنلىرىنىڭ كۆپىنچىسى ئىشىل بولىدۇ. كۆرى ساپ -
سىرىق، ناھايىتى چىرايلىق بولۇپ، ئالۋىدەك پارىراپ تۇرىدۇ.
سەزگۈ نۇرۇتى بېسىماق بولىدۇ. ئاغزى ناھايىتى چوڭ بولۇپ،
جايىنغۇچى ئىغزى فورمىسىدا بولىدۇ. ئىككى جۈپ قانىسى كەك،
سۈزۈك بولۇپ، قانىدا نورسىمان نومۇر بولىدۇ. ئادەتتە ئۇ
كۆك بىب بولالغان دەرىجە نېمىغا ۋە ئۆسۈملۈك يوپۇرماقلىرىدا
ئىك بۇزىگە رەلىك قىلىپ 20~30 دىن ئۈمىدۇ، تۇخۇمىنىڭ
رەككى ئىشىل بولۇپ. ھەر بىرىنىڭ بىردىن سىمىمان ئۇزۇن
سىپى بولىدۇ ۋە ئۇ سۇ تۇرۇن ساپىنىڭ ئۈچىدا قانار سىزىپ
فونۇلغان شارغا ئوخشاش ناھايىتى چىرايلىق كۆرۈلىدۇ.
لىكىسى ئۇرچۇق شەكلىدە بولۇپ، كۈلارەك فوكۇر، ساغۇچ
قوكۇر ئاكى ۋىزىل بولىدۇ؛ سىسىنىڭ ئىككى بان بەرىپىدە
سۆگەلىسىمان نۇك قانارچۇقى بولىدۇ. ئۈستۈنكى ئىكىمكى بىلەن
ئاسىنى ئىكىمكى ئورغانسىمان ئەگمەچ بەرىجە شەكلىدە بولۇپ.
بۇ سورىغۇچى قوس ئىغزىنى شەكىللەندۈرگەن. ئوزۇقلىنىدىغان
چاغدا ئامبۇرسىمان بىر جۈپ نۇمشۇمىسى ئاسفا ھانارەنلەر -
ئىك تېنىگە سايىپ، بىر جىل زەھەرلىك ماددا جىغىرىدۇ - دە،
ئۆزىدىن بىر قانچە ھەسسە چوڭ نۈكلۈك فۇرۇتسىمۇ بىرەچچە
سېكۇنت ئىچىدىلا بېھۇش ھالەتكە چۈسۈرۈپ، قىچىپ كىنەل -
مەيدىغان قىلىپ قولىدۇ، ئاندىن ئۇنىڭ تىنىدىكى سۇنۇقلۇقى
سورايدۇ. ئاق بېشەك ئارنىپ، غورەك بوغۇپ، سۇنىڭ ئىچىدە
فوجاغا ئايلىنىدۇ.

ئالۋىن كۆزىنىڭ تەبىئىي فوجىغى غوزەك ئىچىدە قىلىنىدۇ. بەزىلىرى سىلىپ قىلىنىدۇ. ھەر بىلى 4-ئايىنىڭ ئاخىرىدا چىقىدۇ، 5-ئايىنىڭ ئونۇرلىرىدا نۇجۇمى ئۇچراپقىلى بولىدۇ. بىتىلگەنلىرى بۇرغا قاتتىق ئىنىلىدۇ، كىچىسى تاكى كۈندۈرى بويۇرماقنىڭ ئوك بۇزىگە ياكى ئارفا بۇزىگە، غول سىجىغا نۇقىدۇ. ئەمما بويۇرماقنىڭ ئارفا بۇزىگە ئەك كۆپ نۇقىدۇ. جىنىسىنىڭ ھەر بىرى مىڭ نەچچە بۇزنى نۇقىدۇ بىر ئادەم ئۆمۈر كۆرىدۇ. بىتىلگەنلىرىنىكىمۇ، لىجىنىكىلىرىنىكىمۇ ئۆزىنىڭ تۇجۇمىنى بەۋالىدىغان ئادىنى بار، بەرى جىللىرىنىڭ لىجىنىكىسى ئۆرى يەپ ئىشىپ قالغان قىسرافى دۈمىسىگە ئارتۇلىدۇ، بەزىلىرى كۆترەلىگۈسىز دەرىجىدە ئا، تۈلىدۇ، ھەتتا ئۆرىنىمۇ كۆرگىلى بولمايدۇ. لىجىنىكىلىرى بىر بەرىنى ئۆلتۈرىدۇ. ئادەتتە نۇجۇمدىن بەكى چىققان لىجىنىكىسى نۇجۇم قىسرىدا بىر مەھەل بۇرۇپ، ئاندىن تۇجۇم سىسى بويلاپ چۈسۈپ ئوزۇقلۇق ئىرلەيدۇ. لىجىنىكىسى ئوزۇقلىنىش مەزكىلىدە مانا قىلىمايدۇ. بىتىلگەندىن كېيىن ئاندىن مانا قىلىنىدۇ. قىرىغان لىجىنىكىسى غوزەك نوقۇپ قوچاققا ئالىنىدۇ، بەزىلىرى قانلانغان بويۇرماقنىڭ ئىچى بەرىپىگە غوزەك بوقۇنىدۇ، بەزىلىرى ئۇبراغا غوزەك بوقۇنىدۇ. قوچاقىن چىقىدىغان چاغدا غوزەكنىڭ بۇمۇلانى قاپقىغى بار چاغدىن چىقىپ، سىزىر سىر ھەۋەپ پوزىتىنى ئاسلاپ بېلىگەن ھاسارەنكە ئالىنىدۇ.

ئالۋىن كۆزىنىڭ بېتىلگەنلىرىمۇ لىجىنىكىلىرىمۇ باشقا ھاشا-

رەتلەرنى تۇنۇپ يەيدۇ. يەنە كىلىپ خېلى كۆپ يەيدۇ. مەسىلەن، بىر چوك ئالتۇن كۆز ئۆمرىدە 811 كېۋەز پىتىغا چىپار ئالتۇن كۆزنىك بىر لىچىنكىسى ئۆمرىدە 540 كېۋەز پىتنى يەيدۇ. ياپونىيىنىڭ مەلۇماتىغا قارىغاندا، چىپار ئالتۇن كۆزنىك بىر لىچىنكىسى پۈتۈن ئۆمرىدە 2 مىك 77 كۆكتان پىنى يەيدىكەن، يېتىلگىنى 4 مىكدى ئارتۇق كېۋەز پىتى يەيدىكەن. ئېلىمىزنىڭ تەيۋەن ئۆلكىسىدە ئادەتتىكى ئالتۇن كۆزنىك لىچىنكىسى 3 مىك 780 دانە قاسراقلىق قۇرۇق تۇنۇپ يەيدۇ. ئامېرىكىنىڭ مەلۇماتىغا قارىغاندا، ئادەتتىكى بىر ئالتۇن كۆز لىچىنكىسى 20°C لۇ تېمپېراتۇرا شارائىتىدا، 393 كۆك پىت، مىك دانە فېزىل ئۆمۈچۈك يەيدىكەن.

ھازىر بار مەلۇماتىنى قارىغاندا، ئالتۇن كۆزنىك خىلىلىرى دۆلىسىمىزدە ئون نەچچىگە بېتىدىكەن. خېنەن ئۆلكىسىنىڭ زىرائەت ۋە مېۋىلىك دەرەخ، ئورمانلار ئۈستىدە ئېلىپ بارغان نەكشۈرۈشىدى قارىغاندا، ئالتۇن كۆزنىك مۇھىم ئورۇندا تۇرىدىغان مۇنداق تۆت خىلى بار ئىكەن:


1. چوڭ ئالتۇن كۆز

بۇ خېنەن ئۆلكىسىنىڭ ھەممە يېرىگە تارقالغان، كۆك پىت، فېزىل ئۆمۈچۈك، غوزا قۇرۇتى، ئەگمەخ بەللىك قۇرۇت، كۆمۈرنىڭ ئۆزەك قۇرۇتى، قىياش داغلىق پەرۋانە قاتارلىق لارىك نۇخۇمنى، كىچىك لىچىنكىسى ۋە يوپۇرماق تومۇز

قۇرۇتنىڭ بالىلىرىنى يەيدۇ.

تاشقى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى بېتىلگىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 13~15 مىللىمېتىر، ئالدىنقى قانتى 17~18 مىللىمېتىر بولىدۇ، تېنىڭ رەڭگى ساغۇچ يېشىل بولۇپ، بېشىدا 2~7 قارا داغ بولىدۇ. ئادەتتە 4 داغلىغى كۆپرەك ئۇچرايدۇ، جاۋىغىدا بىر جۈپ داغ بولىدۇ، سەزگۈ بۇرۇتنىڭ ئاسنىقى تەرىپىدە تىك تۆت بۇلۇڭلۇق ياكى بۇمۇلاق بىر جۈپ داغ بولىدۇ، سەزگۈ بۇرۇتنىڭ ئارىلىغىدا بىر كىچىك داغ بولىدۇ، 4 داغلىغىدا ئوتتۇرىسىدا دېغى بولمايدۇ، 7 داغلىغىدا بولسا ئىككى مەك-زىدە يەنە بىردىن قارا داغ بولىدۇ، بېشىدىكى داغنىڭ ئاز-كۆپ-لۈگى، شەكىلىنى ئۆزگەرتىشى ئۇنى باشقا خىللىرىدىن پەرقلەندۈرۈشنىڭ مۇھىم ئاساسى (8-رەسىمنىڭ 1-سى). غولنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئوچۇق كۆرۈنىدىغان ساغۇچ سىزىقى بولىدۇ. فانتىنىڭ تومۇرى كۆپىنچە ساغۇچ بېشىل بولىدۇ، لېكىن ئال-دىنقى قىرغىغىدىكى توغرىسىغا كەتكەن تومۇرلىرىنىڭ كۆپىنچىسى قارامتۇل بولىدۇ. تۇخۇمى يېشىل بولۇپ، ئۇزۇن يېسىمان سېپى بولىدۇ. لېچىنىكىسى ئۇرچۇق شەكىلدە، بوز قوڭۇر بولۇپ، تېنىنىڭ يان تەرىپىدە سۆڭەكلىمەن تۈك فاناچۇغى بولىدۇ. غوزىڭى شارسىمان، يېپى ئاق بولىدۇ (7-رەسىم).

ياشاش ئادىتى ھەر يىلى 5~6 ئەۋلاد قالدۇرىدۇ، تەييار-لىق قوچىغى غوزەك ئىچىدە قىشلايدۇ. كېيىنكى بىلى 5-، 6-ئايلىرىدا يېتىلىپ چىقىدۇ، كۈندۈزىمۇ، كېچىسىمۇ تۇخۇملاۋې-



7-رەسىم چوڭ ئالتۇن كۆز

1. بېلىڭىسى 2. نۇخۇمى 3. لىجىنىكىسى
 4. لىجىنىكىسىدىكى بېشى 5. عوزىدىكى

رىدۇ. ئادەتتە تۇخۇمنى بىر فەۋەن قىلىپ تىزىپ تۇغىدۇ، كۆك پىت كۆپ بولغان يەرگە تۇخۇملاشسى باخشى كۆرىدۇ، پۈتۈن ئۆمرىدە 779 نى تۇغىدۇ. بىرىنچى ئەۋلاتتىن يېتىلگەنلىرى 6-ئايىنىڭ ئوتتۇرىلىرىدىن 7-ئايىنىڭ ئوتتۇرىلىرى ۋە ئاخىرلىرىغىچە پەيدا بولىدۇ، ئىككىنچى ئەۋلاتتىن يېتىلگەنلىرى 8-ئايىنىڭ باشلىرىدىن 9-ئايىنىڭ باشلىرىغىچە بولغان ئارىلىقتا پەيدا بولىدۇ. ئۈچىنچى ئەۋلاتتىن يېتىلگەنلىرى 9-ئايىنىڭ

ئوتتۇرىلىرىدىن 11-ئاسىك باشلىرىغىچە بولغان ئارىلىقىدا بولسا بولىدۇ. نۆتىسى ئەولادىنىك تەييارلىق قوچىغى 10-ئايىنىك ئاھىلىرىدا قىشلاش ئۈچۈن ئۈچە كىكە كىرىدۇ.

ئاسراش ۋە پايدىلىنىش بىقىنى بىللاردىن بۇيان، دۆلەتتىمىز، چەنئەللەرمۇ ئالىمۇ كۆزنى كۆپەيتىش ئارقىلىق زىيانداش ھاشارەتلەرنى يوقىتىشنىڭ خارىسىنى ئىزلىمەكتە. خېسەن ئۆلكىسىنىڭ مىنخۇەن ناھىيىسى ئالتۇن كۆزدىن پايدىلىنىپ غوزا قۇرۇتىنىڭ ئالدىسى ئىلىش ۋە ئۇنى يوقىتىشتا ناھىيىنى ناخشى ئۈنۈم ھاسىل قىلدى. غەربىي شىمال بىزا ئىگىلىك سۆيۈەسى سۈيى نۇخۇم ئارقىلىق ئالىمۇ كۆزنىڭ 2 باسىنى ئاشقان لىخىنىكىسى كۆپەيتىشنى. بۇلارنىڭ ھەممىسى نەى بولۇپ غوزەك ھاسىل قىلدى. خۇكىو دىخانچىلىق-ئورمانچىلىق بەنىلىرى ئاكادېمىيىسى كۆك بىت باكى سال پەروانىسىنىڭ نۇخۇمى بىلەن ئوزۇقتلاندۇرۇپ، قىشلىق ئورۇق مەسىلىسىنى ھەل قىلدى.

ھازىر ھەرقايسى جايلار ئالىمۇ كۆزنى بىقىشتا تۆۋەندىكى سىرقاچە خىل ئۇسۇلى قوللانماقتا: (1) قۇرۇق خېمىرتۇرۇچ-مىن 35 گىرام ئېلىپ، ھەسەلدىن 20 مىللىلىتىر (ياكى شېكەر-دىن 10 گىرام، ھەسەلدىن 10 مىللىلىتىر) ئېلىپ، ئۇنىڭغا 80 مىللىلىتىر سۇ قوشۇش. (2) شىپۇمۇ ئابلىتىكىسى (دوھۇر-لۇفنا ئىشلىتىلىدىغان)دىن 25 گىرام، شېكەردىن 10 گىرام، ھەسەلدىن 10 مىللىلىتىر ئېلىپ، ئۇنىڭغا 100 مىللىلىتىر سۇ

فوسۇتىس. (3) كۆك پىت ئارقىلىق ھەر خىل ئالتۇن كۆز لىچىنە-
كىلىرىنى باقسىمۇ، ئوخشاشلا نورمال ئەي بولۇپ، غوروك
تۇتۇپ، قوچاققا ئايلىنىپ، بېتىلىپ چىقىدۇ، تۇخۇم تۇغىدۇ.
تۇخۇمدىن لىچىنكىسى چىقىدۇ. ئەي بولۇش نىسبىتى %60
تىن يۇقۇرى بولىدۇ.

ئالتۇن كۆز ئارقىلىق زىندانداش ھاشارەتلەرنىڭ ئالدىنى
ئېلىش ۋە ئۇنى يوقىتىشنىڭ چارىسى مۇنداق: ئادەتتە ئالتۇن
كۆزنىڭ تۇخۇم تەۋىكىنى 2 كۈن تۇرغۇزۇپ، تۇخۇمى بوز
رەڭگە ئۆزگەرگەندە، ئېتىزغا قويۇپ بېرىلىدۇ. ۋاقتىنچە ئېتىزغا
قويۇلمايدىغان تۇخۇم تەۋىكىنى تۆۋەن تېمپېراتۇرىدا ساقلىسىمۇ
بولىدۇ. $13^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$ لۇق تۆۋەن تېمپېراتۇرىدا 1~2 ھەپتە
ساقلىغىلى بولىدۇ، $16^{\circ}\text{C} \sim 14^{\circ}\text{C}$ لۇق شارائىتتا بىر ھەپتە ئۆپ-
چۆرىسىدە ساقلىغىلى بولىدۇ. قويۇپ بېرىشتىن بۇرۇن، تۇخۇم
تەۋىكىنى لېنتا شەكلىدە پارچە-پارچە قىلىپ كېسىۋېلىپ (ھەر
بىر پارچىسىدە بىر قانچىدىن تۇخۇم بولۇشى كېرەك)، قويۇپ
بېرىشتىن ئىلگىرى، ئۇزۇن پارچىسىنى زىرائەتنىڭ غولىغا باغ-
لاپ قويسا بولىدۇ، قىسقا پارچىسىنى زىرائەتنىڭ يوپۇرمىغىغا
ياكى شېخىغا شىلىم بىلەن چاپلاپ قويسىمۇ بولىدۇ. چەتئەل-
لەردە ئابىرۇپىلان ئارقىلىق ياكى سۇيۇق دورا پۈركۈش
ماشىنىسى ئارقىلىق ئاۋال ئۆسۈملۈككە نېپەر قىيامى پۈركۈ-
لىدۇ. ئاندىن كېيىن تۇخۇمى پۈركۈلۈپ، يوپۇرماققا يېپىش-
تۈرۈلىدۇ.

بۇنىڭدىن باشقا، خىمىيەۋى دىخانچىلىق دورىلىرى ئارقىلىق باشقا زىيانداش ھاشارەتلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە يوقىتىشتا، ئۆلتۈرۈش دائىرىسى كەڭرى دىخانچىلىق دورىسىنى ئىشلەتمەسلىك كېرەك. ئالەن كۆزنىڭ دورغا چىداش كۈچى ناچار، شۇنىڭ ئۈچۈن ئالەن كۆز يېتىلىۋاتقان مەزگىلدە دورا ئىشلىتىشتىن ساقلىنىش لازىم.


سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ مەلۇماتىدىن قارىغاندا، ئالەن كۆز پارنىك ئىچىگە قويۇپ بېرىلسە، تەرخەمەك چىچىگى شىرنىسىنى يىمەي، جۇڭگو چىنىڭگۈلىسى يەيدىكەن. دىمەك، پارنىك ئىچىگە جۇڭگو چىنىڭگۈلىنى تېرىش ئارقىلىق ئالتۇن كۆزنىڭ كۆپىيىش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىش بولىدىكەن. بۇنىڭدىن باشقا، كېۋەزگە گىلىتسىپىن قوشۇلغان، سۇدا ئېرىيدىغان بىلوك پۇركۇلسە، ئالتۇن كۆز كېلىپ تۇخۇم تۇغىدىكەن.

2. جۇڭخۇا ئالتۇن كۆزى

بۇ خېنەن ئۆلكىسىنىڭ ھەممە يېرىگە تارقالغان، يېتىلگەن-لىرىمۇ، لىچىنىكىلىرىمۇ كۆك پىت، فىزىل ئۆمۈچۈك ۋە باشقا كېپىنەك، پەرۋانە تىپىدىكى ھاشارەتلەرنىڭ لىچىنىكىسىنى تۇخۇمنى يەيدۇ.

ئاشىقى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىگى يېتىلگىنىنىڭ تېنى 9~10 مىللىمېتىر، ئالدىنقى فانتى 13~14 مىللىمېتىر، تېنىنىڭ رەڭگى ساجۇچ يېشىل بولىدۇ، دۈمبىسىدە پۈتۈن بەدىنىنى كېسىپ

ئۆتىدىغان سېرىق سىزىق بولىدۇ، بېشى ساغۇچ ئاق بولۇپ، ئىككى مەخزىدە بىردىن فارا داغ بولىدۇ. ئىككى خاۋىسىدا بىردىن فارا سىزىق بولىدۇ، بۇ ئىككى داغ كۆپىنچە تۈتىشىپ تۇرىدۇ. دىمەك، ئۇنىڭ بېشى چوڭ ئالغۇن كۆزنىڭ، چىپار ئالغۇن كۆزنىڭ بېشىدىن روشەن پەرقلىنىدۇ (8-رەسىمنىڭ 3-سى).



8-رەسىم 3 خىل ئالغۇن كۆزنىڭ بېشى

1. چوڭ ئالغۇن كۆز
2. چىپار ئالغۇن كۆز
3. جۇڭخۇا ئالغۇن كۆزى

ياشاڭ ئادىتى ھەر يىلى 6~7 ئەۋلات قالدۇرىدۇ. يېتىلگەنلىرى ئورمان، ئوت-چۆپ دۆۋىسى قاتارلىق شامال نەغمەيدىغان كۈنگەي يەرلەردە قىشلايدۇ. كېسكى يىلى 4-ئاينىڭ باشلىرىدا ھەركەتلىنىشكە باشلايدۇ. بىرىنچى ئەۋلادنىڭ تۇخۇملايدىغان ۋاقتى 4-ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىغا توغرا

كېلىدۇ. 4-ئاينىڭ ئاخىرلىرى لىخنىكىلىرى تۇخۇمدىن چىقىدىغان ۋاقىت بولىدۇ، 5-ئاينىڭ باشلىرى قوچاق بولۇش مەزگىلى ھېساپلىنىدۇ، 5-ئاينىڭ ئاخىرلىرى يېتىلىپ قوچاقتىن چىقىش مەزگىلى بولىدۇ. ئىككىنچى ئەۋلادى 5-ئاينىڭ باشلىرىدىن 7-ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىغىچە پەيدا بولىدۇ، ئۈچىنچى ئەۋلادى 6-ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدىن 8-ئاينىڭ ئاخىرلىرىغىچە پەيدا بولىدۇ. تۆتىنچى ئەۋلادى 7-ئاينىڭ ئاخىرلىرىدىن 9-ئاينىڭ ئاخىرلىرىغىچە

يەيدا بولىدۇ. بەسجى ئەۋلادى 8-ئابىك ئاھىرلىرىدا تۇخۇم-
لابىدۇ. ئۇنىڭ نۇخۇملىرى ئارقىلىق بولىدۇ، پۈتۈن ئۆمرىدە
211~914 نۇخۇم تۇغىدۇ، ئوتتۇرا ھىساب بىلەن 488 دىن
نۇخۇملايدۇ. بېتىلگەنلىرى 10-ئايىدىن كېيىن فىشلاش ئۈچۈن
ئۇچەككە كىرىدۇ.

لەنجىنكىسىنىڭ ئورۇقلىنىش مىقدارى خېلى چوڭ، تۇتۇپ
ئوزۇقلىنىش نىقتىدارى كۈچلۈك بولىدۇ، پۈتۈن ئۆمرىدە
عوزا قۇرۇقى، فىزىل ئۆمۈچۈكىدىن بولۇپ 1 مىڭ 863 نى،
كىۋەر يىسىدىن 5:4 نى، كېۋەردە بولىدىغان فىزىل كۆسەك
قۇرۇقىدىن 320 نى، عوزا قۇرۇقىدىن بىر ئاسىلى لىجىنكىسى-
دىن 522 نى، ئىككى ئاسىلى لىجىنكىسىدىن 52 نى تۇتۇپ
بەيدۇ.

ئاسراش ۋە بايىدىلىنىش چوڭ ئالتۇن كۆزگە ئوخشاش.

3. چىپار ئالتۇن كۆز

خىسار ئالتۇن كۆز كىچىك ئالتۇن كۆز دەپمۇ ئاتىلىدۇ،
ھەممە يەرگە ئارقالغان، كۆك پىت تۇتۇپ بېشىنى باخشى
كۆرىدۇ.

تاشقى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى بېتىلگىنىنىڭ ئۇزۇنلۇقى
9~11 مىللىمېتىر، ئالدى قانتىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 13~15 مىللىمې-
تىر بولىدۇ. تىنىنىڭ رەڭگى ئوچۇق بېشىل بولىدۇ. بېشىدا 9
دائە داغ بولىدۇ. ئىككى جانىغىدا بىردىن ئۇزۇن داغ بولىدۇ.

ئىككى مەكزىدىمۇ بىردىن ئۇزۇنراق داغ بولىدۇ. سەزگۈ بۇرۇ-
تىنىك تۆۋەن تەرىپىدە يېڭى ئاي شەكىلىك بىر جۈپ سېرىق
بولىدۇ، سەزگۈ بۇرۇتىنىك ئارىلىغىدا بىر داغ، چوققىسىدا بىر
جۈپ داغ بولۇپ. بۇ داغلارنىڭ ھەممىسى كىچىك ھەم يۈمۈلۈك
بولدۇ (8-رەسىمنىڭ 2-سى). دولىسىنىڭ چىڭ ئوتتۇرىسىدا
توغرا ئېرىغىچە بولىدۇ.

ياشاش ئادىتى ھەر يىلى 5~6 ئەۋلات فالدۇرىدۇ، تەييارلىق
قوچىغى عوزەك ئىچىدە قىشلايدۇ. كېيىنكى يىلى 5، 6-
ئايلاردا قوچاقتىن چىقىدۇ. تۇخۇمنى تارقاق تۇغىدۇ. چىشى-
نىڭ ھەر بىرى پۈتۈن ئۆمرىدە 892 تۇخۇم تۇغىدۇ، زىرائەت
تۈپلىرىنىڭ ئۈسۈنكى قىسمىغا ياكى تۇخۇم فاپچۇغىنىڭ بۇقۇرى
قىسمىغا تۇخۇملايدۇ. بېتىلگەنلىرىنىڭ ئۆزىنىڭ تۇخۇمىنى يەۋال-
دىغان ئادىتى بار.

ئاسراش ۋە پايدىلىنىش چوڭ ئالتۇن كۆز بىلەن ئوخشاش.

4. يېشىل ئالتۇن كۆز

بۇ خېنەن ئۆلكىسىنىڭ ھەرقايسى جايلىرىغا تارقالغان، يېتىل-
گەنلىرىمۇ، لېچىنكىلىرىمۇ ھەر خىل كۆك پىنلارنىلا نۇتۇپ
يېيىشنى ياخشى كۆرىدۇ.

تاشقى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى يېتىلگەنلىرىنىڭ تېنىنىڭ
ئۇزۇنلۇقى 10~11 مىللىمېتىر. ئالدى قانتى 18~19 مىللىمې-
تىر بولىدۇ. تېنىنىڭ رەڭگى ساغۇچ يېشىل بولىدۇ. بېشىدىكى

سىزىق- داغلار چىپار ئالتۇن كۆزنىڭكىگە ئوخشاپراق كېتىدۇ. ئالدى قانتىنىڭ ئالدىسى قىرغىدىكى تومۇرنىڭ يانداش ئالدىنىقى قىرغاق تومۇرغا يېقىن بىر ئۇچى فارا، قالغان بېرى يېشىل بولىدۇ. تۇخۇمنى تارقاق تۇغىدۇ.

ياشاش ئادىتى قالدۇرىدىغان ئەۋلادىنىڭ سانى ئېنىق ئەمەس، تەييارلىق قوچىغى غوزەك ئىچىدە قىشلايدۇ، كېيىنكى يىلى 4- ئايدا غوزەكتىن چىقىپ تۇخۇملايدۇ.

ئاسراش ۋە پايدىلىنىش چوڭ ئالتۇن كۆز بىلەن ئوخشاش.

3. سېرىق ھەرە

سېرىق ھەرە بوغۇن دەپمۇ ئاتىلىدۇ. ئۇ ياشاش، كۆپىيىش مەزگىلىدە ھەمىشە باشقا زىيانداش ھاشارەتلەرنى تۇتۇپ يەيدۇ، بالىلىرىنى باقىدۇ. شۇڭا ئۇ زىيانداش ھاشارەتلەرنى يوقىتىدۇ. غا مۇھىم بىر خىل كۈشەندە ھىساپلىنىدۇ. ئەمما ئۇ ئادەمنى چاقىدۇ، نەشپۈت، ئالما، ئۈزۈم فاتارلىق پىشقان مېۋىلەرىمۇ يەيدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن، ئۇ بىر خىل زىيانداش ھاشارەت بولۇپمۇ ھىساپلىنىدۇ.

سېرىق ھەرنىڭ تۈرى جىلى كۆپ، جېنەن ئۆلكىسىدە مۇندە داى تىككى جىل مۇھىم تۈرى ئۇچرايدۇ:

1. ئۇزۇن پۇتلۇق سېرىق ھەرە

بۇ مەملىكەتنىڭ ھەممە جايلىرىغا تارقالغان، يېتىلگەنلىرى

غوزا قۇرۇتى، ئەگمەج بەللىك قۇرۇت، كاپۇستتا كېپىنىڭ قۇرۇتى (كاپۇستتا بولىدىغان كۆك قۇرۇت) قاتارلىق كېپىنىڭ تۈرىدىكى كۆپ خىل ھاشارەتلەرنىڭ لىچىنكىلىرىنى تۇتۇپ، بالىلىرىنى باقىدۇ.

تاشقى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى



يېتىلگەنلىرىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 20 مىللىمېتىر، رەڭگى ساغۇچ قوڭۇر بولىدۇ، چوققىسىدا ئىككى سېرىق سىزىق بولىدۇ. دولىسىدا بىر دانە چوڭ ئۈچ بۇلۇڭلۇق قارا داغ بولىدۇ، غولىنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئۇزۇنسىغا كەتكەن

9-رەسىم ئۇزۇن پۇتلۇق سېرىق ھەرە

ئىككى تال قىزغۇچ سېرىق سىزىق بولىدۇ. قوساق قىسمىنىڭ بىرىنچى بوغۇمى قارا بولۇپ، ئىككى يان نەرىپىدە بىر تالدىن قىزغۇچ سېرىق سىزىق بولىدۇ، قالغان بوغۇملىرى قىزغۇچ قوڭۇر بولىدۇ. تۇخۇمى ئاق، سوقىچاق بولىدۇ. لىچىنكىسى ئۇزۇنچاق نەيچە شەكلىدە، سۇس بوز بولىدۇ. بېشى قارا بولىدۇ، پۇتى بولمايدۇ، سېمىز كېلىدۇ (9-رەسىم).

ياشاش ئادىتى ھەر يىلى 3 ئەۋلات قالدۇرىدۇ. چىشى ئۆيدە، دەرەخنىڭ كامىرىدا، ئوت-چۆپ ئارىسىدا قىشلايدۇ. كېيىنكى يىلى 3-، 4-ئايلىرىدا ھەركەتلىنىشكە باشلاپ، چىچەك شىرنىسى بىلەن ئوزۇقلىنىپ، 5-ئاينىڭ باشلىرىدا ۋە ئوتتۇرىدا لىرىدا كۆنەك تىزىپ تۇخۇملايدۇ. كۆنەك تىزىدىغان چاغدا

ئاۋال سۇ ۋە قەغەز پارچىلىرى باكى ياغاچ كېسىگى ئانا، لىق نەرسىلەرنى يەپ يۇمشىنىپ، يېپىشقا نەرسىگە ئايلايدۇرۇپ، كۆنگىسىك ئۆلىنى، چۆرىسىنى ئاستا-ئاستا ئىگىزلىتىدۇ، كۆندىگىنىك كاۋاكتىرى نۇخۇمنى دالدىغا ئالغۇدەك بولغاندىلا، تۇغۇسغا باشلايدۇ. ھەر بىر كاۋاكتا بىردىن تۇخۇم تۇغىدۇ. 10 نەچچە كۈن ئۆتكەندە تۇخۇمدىن لىچىنىكىسى چىقىدۇ، بۇ چاغدا، ئانا ھەرە يىراق جايلارغا ئۇچۇپ بېرىپ پەرۋانە، كېپە-نەك لىچىنىكىلىرىنى نۇتۇپ كېلىپ كۆنگىدىكى لىچىنىكىلىرىنى باقىدۇ. لىچىنىكىسى يۈتۈن ئۆمرىدە نامامەن ئانىسىنىڭ بېقىشىغا ئايىنىپ ياشايدۇ، سۈنئىي ئۇسۇل بىلەن بېقىلسا، لىچىنىكىسى غوزا فۇرۇتىنىڭ ئىككى ياشلىق لىچىنىكىسىدىن 20~30 نى يەيدۇ. ئوزۇقلۇق بېسە، لىك بولغان سارائىتىنا، لىچىنىكىلىرى 8 كۈندىلا كۆنگىنىك ئاغزىنى ئۆزى ئېنىۋالىدۇ، كۆنگىنىك ئاغزىنى ئېنىۋالىدىن كېيىن ئوزۇقلىشىنى توختىتىپ قوچاققا ئايلىنىشقا باشلايدۇ، 20 نەچچە كۈندى كېيىن يېتىلىپ، كۆنگىنىك ئاغزىنى يېرىپ، ئۆمىلەپ چىقىپ قاناتلىرىنى كېرىپ ئانا ھەرەگە ئايلىنىدۇ.

ئاسراش ۋە پايدىلىنىش خېنەن ئۆلكىسىنىڭ شاڭچېنۇ قاتارلىق ياخشىلىق رايونلىرىدىكى ئامما سۈنئىي كۆچۈرۈش خارىسىنى قوللىنىدۇ، ئالدى بىلەن چۈزگۈن، بۇغداي پاخىلىنىك بىر ئۈچىنى كۈبۈلۈكسىمان ياكى موگۇسىمان فىلىپ بوغۇپ، ھەرە كۆنگى ئۈچۈن فونداق ياسايدۇ ۋە بۇ فونداقنى دەرەخ-

نىڭ غىرىلىغا باكى فوزۇققا يەردىن 2.5 مېتىر ئىككىرىنىڭ قىلىپ باغ-
 لاپ بېكىتىپ قويىدۇ. كېچىسى ھەرە كۆنىگىگە خالدا كىمگۈرۈپ
 تۇرۇپ، ئۇنى پىچاق ياكى فابچا بىلەن كىسىۋېلىپ باكى شاخ
 بىلەن فوشۇپلا ئېلىپ، ئىتىردىكى ئوت-جۆپتىن باسالغان كۆنەك
 قوندىغىغا ئاپىرىپ قوبىدۇ. مىنچۇەن قاتارلىق جايلارنىڭ تەج-
 رىبىسىدىن فارغاندا، ھەر مو كۆۋەز ئىتىرىغا 5~7 ئۇۋا ھەرە
 قويۇلۇپ ئۇنىڭدىكى ھەرلەرنىڭ ئالدىنقى مەزگىلدىكىلىرىدىن
 50~100 ى، كېيىنكى مەزگىلدىكىلىرىدىن 200~300 ى ساقلاپ
 قېلىنسا، غوزا فۇرۇتى ياكى ئەگمەج بەلىلىك فۇرۇتنىڭ زىيان-
 داشلىغىنى تىزگىنلىگىلى بولىدىكەن.

2. تاغىل سېرىق ھەرە

بۇ مەملىكەتنىڭ ھەممە يېرىگە تارقالغان، يېتىلگەنلىرى پەرى-
 ۋانە تىپىدىكىلەرنىڭ لىچىنكىلىرىنى تۇتۇپ كىلىپ بالىلىرىنى
 باقىدۇ. تۇتۇپ ئوزۇقلىنىش ئىقتىدارى خېلى كۈچلۈك، سانىمۇ
 كۆپ.

تاشقى كۆرۈنۈشى ئالاھىدىلىگى يېتىلگەنلىرىنىڭ ئۇزۇنلۇغى
 40 مىللىمېتىر كېلىدۇ، بېشى ساغۇچ فېزىل بولىدۇ، كۆكرەك
 قىسمى پارا قوڭۇر بولىدۇ، چوققىسىدا رومبا شەكىللىك قارا داغ
 بولىدۇ، غولدا يېرىم ئاي شەكىللىك ئىككى قارا سىزىق بولىدۇ.
 فوسانى فېسىمىنىڭ 1-، 2- بوغۇمىدا قىرغۇچ قوڭۇر، 3-، 5-
 بوغۇمىدا خېلى چوڭ قارا سىزىق بولىدۇ. فاستى قوڭۇر بولىدۇ،

توسىمىدا ئۇرۇن ساغۇچ قوڭۇر بۇك بولىدۇ (10-رەسىم).



ياشاش ئادىتى قالدۇرىدىغان

ئەۋلادىنىڭ سانى ئېنىق ئەمەس،

ستىلب فىشلايدۇ، كېيىنكى يىلى

4-ئابدا ئۈچەكتىن چىقىپ، پەرۋانە

تېمىدىكىلەرنىڭ لىجىنىكىسىنى تۇتۇپ

بەيدۇ، بىشابۋاننىڭ ئاستىدا ياكى 10-رەسىم تاغىل سېرىق ھەرە

دەرەخنىڭ كامارلىرىدا ئۇۋىلاپ ئەۋلادىنى كۆپەيتىدۇ

ئاسراش ۋە پايدىلىنىش ئۇزۇن پۈتۈلۈك سېرىق ھەرەگە

ئوخشاش.

4. سېرىق تۇمشۇق ھەرە

سېرىق تۇمشۇق ھەرە دۆلىتىمىزنىڭ جەنۇبىدىكى ھەرقايسى

ئۆلكىلەرگە ئومۇمىي يۈزلۈك تارقالغان. تەككە قاناتلىقلار ئەتراپىدا

دېدىكىلەرنىڭ لىجىنىكىلىرىنىلا تۇتۇپ كېلىپ بالىلىرىنى باقىدۇ.

ئاشىقى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى چىشىنىڭ ئۇزۇنلۇقى

17~23 مىللىمېتىر، رەڭگى ساغۇچ قوڭۇر بولىدۇ، قارا سىزىق-

لىرى بولىدۇ. غولى سېرىق بولۇپ، ئۇزۇنسىغا سوزۇلغان قارا

سىرىقى بولىدۇ. فانتى ساغۇچ قوڭۇر، يېرىم سۈزۈك كېلىدۇ.

فوساق بوغۇملىرىنىڭ ئالدىنقى قىسىملىرىدا قارا سىزىقلار بولىدۇ،

ئاخىرقى قىسىمىنىڭ سېرىق سىزىقلىرى ئارىلىقلىرىدا تولاراق



قىزغۇچ سىزىقلار بولىدۇ، تۇخۇمى ئۇزۇنچاق، سۇس قوڭۇر بولىدۇ، ئۇچىدا بىر تال يىپچىسى بولۇپ، كۆنەكنىڭ ئۈستىدە ساڭگىلا تۇرىدۇ. لىجىنكىسىنىڭ پۈتى بولمايدۇ. تېنىنىڭ ئۇزۇنلۇغى 18~22 مىللىمېتىر، رەڭگى ئاچىق، ئىككى

ئۇچى تۆۋەنگە ئېگىلىگەن بولىدۇ. 11-رەسىم سېرىق توشۇق ھەرە

قوچىغى ساغۇچ بولىدۇ (11-رەسىم). 1. چىشى 2. تۇخۇمى

ياشاش ئادىتى جەنۇب نە رەپتە 3. لىجىنكىسى 4. قوچىغى

ھەر يىلى 2 ئەۋلات قالدۇرىدۇ، نەييارلىق قوچاق ھالىتىدە قىشلايدۇ. كېيىنكى يىلى 5-ئاينىڭ ئاخىرلىرى قوچاققا ئايلىنىشقا باشلاپ، 6-ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرى ۋە ئاخىرلىرىدا يېتىلىدۇ، 7-ئاينىڭ باشلىرى ۋە ئوتتۇرىلىرىدا تۇخۇملايدۇ، 2~3 كۈندىن كېيىن تۇخۇمدىن لىجىنكىسى چىقىدۇ. لىجىنكىسى 8~9 كۈندىن كېيىن تەييارلىق قوچاق مەزگىلىگە كىرىپ، 3~5 كۈن ئۆتكەندە قوچاققا ئايلىنىدۇ، 10~12 كۈندىن كېيىن، قوچاق مەزگىلىنى ئاخىرلاشتۇرۇپ يېتىلىپ چىقىدۇ. 9-ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرى ۋە ئاخىرلىرىدا كۆنەك تىزىپ تۇخۇملايدۇ. ئۇنىڭدىن چىققان لىجىنكىلەر، 9-ئاينىڭ ئاخىرلىرىغا كەلگەندە، تەييارلىق قوچاق مەزگىلىگە كىرىپ قىشلاشقا باشلايدۇ.

بېتىلگەنلەرى كىچىسى بامبۇك نەيچىسى، دەرهخىك كامىرى قانارلىق يېپىسى ئورۇنلارغا كىرىپ، ھەركەنلەشمەي جىم نۇرىدۇ. كۈندۈزى ئېتىزلارغا بېرىپ خۇپلىشىدۇ، زىيانداش ھائارەتلەرنى تۇتىدۇ، تۇخۇملاستى بۇرۇن تۆشۈك-كامارلارنى نىپىپ كىرىپ نەكشۈرۈپ باقىدۇ، ئەگەر شارائىت مۇۋاپىق كەلسە، ئاۋال كامارنىڭ ئىچكىرىگە بىر ئال تۇخۇم نۇغۇب. ئۆشۈكنىڭ ئۈستىگە ئېسىپ قويىدۇ. زىيانداش ھائا-رەنلەرنى تۇتۇش ئۈچۈن ئېتىزلارغا كېتىدۇ. زىيانداش ھائا-رەتنى ئاشاندىن كېسى، دەرھال ئىتىلىپ بېرىپ، ئۇنىڭ بونى-دىس چىشلەپ، ئالدى پۇتى بىلەن جىك قاموالىدۇ، ئاسدىن فوسغىسى زىيانداش ھائارەتنىڭ فوسغىسىك ئارقا بەرىپىدىن ئۆۋەن بەرەپكە ئېگىپ نۇرۇپ نەستىرىنى چىقىرىپ، ئۇنىڭ تىنىگە سانجىپ، زەھەرلىك سۇبۇقلۇق چىقىرىدۇ، بۇنىڭ بىلەن زىيانداش ھائارەت ئاسنا-ئاسنا ھالسىزلىنىپ بەھۇش ھالەتكە كىرىدۇ، چىشىسى تۇتۇپ كەلگەن ھائارەتنى كامارنىڭ ئىچى-دىكى تۇخۇمنىڭ تۆۋەن نەرىيىگە قويۇپ قويۇپ، يەنە ھائا-رەت نۇتقىلى كېنىدۇ. ئادەتتە ھەر بىر تۇخۇمنىڭ تۆۋەن نەرىيىگە 6~25 زىيانداش ھائارەتنى ئېكىرىپ قويۇپ، ئاندىن ئېرىق بويىغا بىرىپ لائى چىشلەپ كېلىپ، ئۇنىسىنى بېچەت-لىۋىنىدۇ؛ لائىنى بېيىز ۋە نەكشى فىلەپ سۇۋابىدۇ. ئۇنىسىنى باساب بولغاندىن كېيىن داۋاملىق ئىككىنچى ئۇنىسىنى ياسايدۇ، 14 سانتىمېتىر ئۇزۇنلۇقتىكى كاۋاك ياغاچنىڭ ئىچىگە ئادەتتە

3~5 ئۇۋا ياسايدۇ، چىشىنىڭ ھەر بىرى ھەر كۈنى 6~12 تۇخۇم تۇغىدۇ. 2~3 كۈندىن كېيىن تۇخۇمدىن لىچىنىكى چىقىپ ھىلىقى ھاشارەت دۆۋىسى ئۈستىگە چۈشۈدۇ-دە، ئۇزاق ئۆتمەيلا ئوزۇقلىنىشقا باشلايدۇ. بىر ھەپتىدىن كېيىن زىيانداش ھاشارەتنى پۈتۈنلەي بەپ بولىدۇ. يەنە 1~2 كۈندىن كېيىن، نەپارلىق قوچاق مەزگىلىگە كىرىدۇ. چىشى تۇتۇپ كەلگەن لىچىنىكلارنىڭ كۆپىنچىسى تەڭگە فاناتلىقلار ئەتىرىدىدىكى 3~5 ياشلىق ھاشارەتنىڭ لىچىنىكلىرىدىن ئىبارەت بولىدۇ. بىر كامارغا تاشلاغان لىچىنىكلارنىڭ تولىسى بىر بىرىگە ئوخشىشىپ كېتىدۇ. خان بىر ئىككى خىل زىيانداش ھاشارەتنىڭ لىچىنىكلىرىدىن ئىبارەت بولىدۇ. لىچىنىكىسى يېتىلگەندىن كېيىن بىر-ئىككى كۈن نۇرۇپلا، ئۇۋىسىنىڭ لايى بىلەن ئېتىۋېتىلگەن يېرىنى بالاپ تېشىپ چىقىپ ئۇچۇپ كېتىدۇ.

ئاسراش ۋە پايىدىلىنىش بۇ خىل ھەرىسنىڭ نۇخۇملاش-كۆپىيىشى ئادىتىگە ئاساسلانغاندا، ئۇنى بەسىمان كاۋاك تاغاققا جەلپ قىلىپ توپلىغىلى بولىدىكەن. مەسىلەن، چېچىباڭ ئۆلكە-سىنىڭ جېنخەي ناھىيىسى شياپۇ گۆكشىسى دۇڭۋاڭ دادۇبى 2 مىڭ دانە بامبۇك نەيچىسى نەپيارلاپ بىر تالىدىن ئاڭى بىر تاغلامدىن قىلىپ ئېستىزغا قادا قوغغان، ئۇنىڭ كۆپىنچىسىگە چىشى كېلىپ، ئۇۋىلاپ تۇخۇم سالغان.

5. تۇتۇپ ئوزۇقلىنىدىغان باشقا ھەرپلەر

(1) بوغماق ھەرە يېتىلگەنلىرى سېرىق ھەرگە ئوخشايراقى

كىتىدۇ، قوسىغىنىك 1 - بوغۇمى بىلەن 2 - بوغۇمىنىڭ ئۈستىدا



ئىنجىكە بىر ساباق بولۇپ، بۇ ھال

ئۇنى قاپاق شەكلىگە كىرگۈزىدۇ،

سۇكا ئۇ ئىنجىكە بىل ھەرە دەيمۇ

ئاتىلىدۇ. قاسنى قارامنىل

بولۇپ، ئۇزۇتقا بىغىلىپ تۇرىدۇ

12 - رەسىم بوغماق ھەرە

(12 - رەسىم).

يېتىلگەنلىرى تامغا باكى ئۆسۈملۈكلەرنىڭ ئۈستىگە لاي

بىلەن لۈكقىسىمان ئۇۋا ئاسايدۇ، ئۆۋىسىنىڭ ئاغزى وارونكا

شەكلىدە بولىدۇ، نامنىڭ بۇلۇكىغا بىر بىرىگە بۇناسۇرۇپ يېرىم

سار شەكلىدە بىر قانچە لاي ئۇۋا ئاسايدىغانلىرىمۇ بولىدۇ.

ئۇنىڭ دەرەخ شېخىغا باسغان ئۇۋىسى سار شەكلىدە بولىدۇ.

يېتىلگەنلىرى تۇنۇپ كەلگەن كۆك قۇرۇق باكى ئۆمۈچۈك تۇرد -

دىكى ھاسارەنلەرنى نەسىنرى بىلەن بېھۇش قىلىپ، ئاندىن

ئۇۋىسىغا ئېلىپ كىرىپ ساقلايدۇ، ئاندىن كېيىن شۇ ئۇۋىسىغا

بۇخۇم بۇغۇت، ئاغرىسى لاي بىلەن ئىتتىۈنىدۇ. لىجىنىكىسى

تۇخۇمىدىن چىققاندىن كېيىن، ئانىسى ئۇۋىسىغا نەسار لاي

قونغان بىمەكلىك بىلەن ئوزۇقلىنىدۇ، يېتىلگەندىن كېيىن،

ئۇۋىسىنىڭ ئاغزىنى بالاي تېشىپ چىقىپ كىتىدۇ.

(2) قىزىل بەل لاي ھەرىسى بېنىلگىنىنىڭ فوسىغى بىلەن

ماق، ئىنجىكە، ئۇزۇن بولغاچقا، بوغۇمى بەل ھەرە دەپمۇ ئاتىلىپ كەلگەن. دولىسى بىلەن يەلكىسى تۇتاشمايدۇ. چىشىنىڭ نېپىسى پارامتۇل بولىدۇ. قوساق قىسمى 1-بوغۇمنىڭ ئىككى بېقىنى، ئارقا قىسمى ۋە 2-بوغۇمنىڭ دۈمىسى شۇنىڭدەك كەينى پۈتتىكى يېرىغى قىزىل بولىدۇ، بېشى، كۆكرىگى، فوسىنىڭ

ئاخىرقى ئۇچى قوڭۇر بولىدۇ، 2-بوغۇمى يوغان بولىدۇ. ئەركىگىنىڭ قوساق قىسمىنىڭ 3-، 4-بوغۇمى قىسمى قىزىل بولىدۇ. تېنىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 26 مىللىمېتىر، فانات كېرىمىسى 35 مىللىمېتىرچە بولىدۇ (13-رەسىم).



13-رەسىم قىزىل بەل لاي ھەرىسى يېتىلگەنلىرى دەرەخقە، تامىك

يۇقىرىغا، ئۆگزىنىڭ بۇلۇڭىغا لاي بىلەن ئۇزۇنچاق، سىرىگە تۇتاشىپ كەتكەن، سىلىندىر شەكىللىك ئۇۋا ياسايدۇ. ئادەتتە كۈن كېيىنىڭ، پەرۋانە تۈرىدىكى ھاشارەلەرنىڭ لېجىنىكىسى ياكى چۈش، يوپۇرماق تومۇز قۇرۇتى قاتارلىق زىيانداش ھاشارەلەرنى تۇتۇپ كېلىپ، لېجىنىكىسى ئوزۇقلاندۇرىدۇ. ئۇنى بېشۇش قىلىپ ساقلاپ، بېنىغا تۇخۇم تۇغۇپ ئۇۋىسى ئېتىپ قويۇپ كىتىدۇ. لېجىنىكىسى تۇخۇمدىن چىققاندىن كېيىن، ئۇۋىسىغا ئېپكەرىپ قويۇلغان قۇرۇت بىلەن ئوزۇقلىنىدۇ. چوڭىيىپ

بېسىلگەن كىشىنى ئاغرىتىش ئۈچۈن تاشنىڭ ئۈچۈن
 خىتتېپ يېرىلدى ما يىساداسى ھاشارەنلەرنى بۇيۇر بەندۇ.

(3) تاغدىن توپتا ھەرىسى سىنىلگىسى سىرىق ھەرىگە
 ئوخشاش تېسىدۇ ھىسى بۇكىلۈك، بۇتى قىسقا ھەم بوعان



بولدۇ. قاندىكى بومبىرى ئانىسىنىڭ
 قىرغىغىغا بېسىپ بارىدۇ. ئەركىگە-

نىڭ قوساى قىسىمىنىڭ 2، 4-
 بوعۇمىدا ساغۇچ كەك يوللۇق سىزىق
 بولىدۇ. نىسىنىڭ ئوزۇنلۇقى 20~24

نىللىمىسى بولىدۇ (14-رەسىم). 14-رەسىم ئاغىل توما ھەرىسى

نىللىمىسى بولىدۇ. ھاھامى بىتىنىڭ-خاسقان كىلىدۇ، يەرگە بىر

مېتىر چوققىدا تىزىلاپ كىرەلەيدۇ، نېز ھەرىكەتلىنەلەيدۇ ھەمدە

توب-بوعرا ماى قوڭغۇزىنىڭ لىجىنىكىسى بار نەرەپكە تىلگىرىد-

لىبەلەيدۇ. ماى قوڭغۇزىنىڭ لىجىنىكىسىغا بىقىنلاشقاندا، نەشتە-

رىسى ئۇنىڭ ئىشىغا ۋە قوساى تەرىپىدىكى بىروا ئۆگىلىرىگە

سالىنىپ، ئۇنى تەھدىت قىلىدۇ، بۇخۇم نۇغۇسىنى بۇرۇن توپىد-

نىڭ خىتتېپ بىر ئۇۋا ئاساب، ماى قوڭغۇزىنىڭ لىجىنىكىسىنى

ئۆزىغا تېلىپ كىرىپ، ئۇنىڭ بېنىگە نۇخۇم ئۇتىدۇ، ئادەتتە

50 نۇخۇم تۇتىدۇ. دەخىمەن 5 كۈندىن كېيىن، لىجىنىكىسى

ماى قوڭغۇزىنىڭ نېپىنى تېشىپ، ئۇنىڭ ئىچىگە كىرىپ ئوزۇق-

لىنىدۇ، بۇيۇن ئۆمرىنى ئۇنىڭ بېنىدە ئۆتكۈزىدۇ. نەخىمەن

10 كۈندىن كېيىن لىجىنىكىسى قېرىپ، كارتون قەغەز تەكىلىدە

غوزەك ھاسىل قىلىدۇ. لېچىنكا ئاشۇ غوزەك ئىچىدە بىر قانچە كۈندىن بىر قانچە ئايغىچە ئۇخلاپ، ئاندىن قوچاققا ئايلىنىدۇ. يېتىلگەندىن كېيىن، يەنىلا غوزەك ئىچىدە تۇرىدۇ، كېيىنكى ۋاقىتلاردا يۇمۇلاق تۆشۈك ئېچىپ چىقىپ كېتىدۇ. نەخسىنى بىر سائەت ئىچىدە بىر مېتىر چوڭقۇر يەردىن ئۆمىلەپ چىقىپ چىچەك سېرىنىسى بار جايلارغا ئۇچۇپ بېرىپ ئوزۇقلىنىدۇ، شۇڭا ئورمان، باغ ۋە ئېسىرلارغا پىلاسىق ھالدا تۈركۈمگە بۆلۈپ بىدە، قىچقا قاتارلىق سېرىنلىق زىرائەتلەرنى تېرىپ توپا ھەرىسى جەلپ قىلىپ كۆپەيتكەندە، ماي قوڭغۇزنىڭ لېچىنكىسى يوقاتقىلى بولىدۇ.

(4) تۈكلۈك قارا ھەرە يېتىلگىنى قارا بولىدۇ، كۆك،

نىل رەڭ، كۆكۈش، قىزغۇنچىلىرىمۇ بولىدۇ، پاقىراپ تۇرىدۇ. بېشى، كۆكرەك قىسمى يوغان بولىدۇ، قوسغىنىڭ ئۇچى يوغان،



فاياقسىمان بولىدۇ، قوسغىنىڭ 1-، 2- بوغۇمىنىڭ ئاخىرقى قىرغىغىدا ئۇزۇنراق سىزىق بولىدۇ. تېنىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 16~19 مىللىمېتىر بولىدۇ

(15- رەسىم). 15- رەسىم تۈكلۈك قارا ھەرە

يېتىلگىنى تاشقا، دەرەخ قوۋزىغىغا لايىدىن شارسىمان باكى يېرىم شارسىمان فالتىق ئۇۋا ياسايدۇ، ئۇۋىسىدا بانداش بىر قانچە بۆلمە بولىدۇ. ئۇۋىسىنى ياساپ بولغاندىن كېيىن،

تۇتۇپ كەلگەن پەرۋانە، كۈن كېيىنكى لىجىنكىلىرىنى سەۋەب قىلىپ، شۇنىڭ ئىچىدە ساقلايدۇ، ئاندىن كىيىن، بارازىت خوجا بىننىڭ تېنىگە نۇخۇم تۇغۇب ئاغزىنى ئېتىۋېتىپ چىقىپ كېتىدۇ. لىجىنكىسى تۇخۇمدىن چىققاندىن كىيىن، ساقلىنىۋاتقان لىجىنكا بىلەن ئوزۇقلىنىدۇ، يېتىلگەندىن كىيىن ئۇۋىسىنى بالاپ تېشىپ چىقىپ ئۇچۇپ كېتىدۇ.

(5) قىزىل قاناتلىق ھەرە يېتىلگىنىنىڭ تېنى فارامتۇل

بولۇپ، قوساق قىسمىنىڭ 2-، 3-، 4- نۆمۈرلىرىدا بىر خۇپتى



سېرىق سىزنى داغ بولىدۇ. قاننى توق قىزىل، قاننىڭ قىرغىنىڭ رەڭگى تۇتۇق بولىدۇ. بېشىدا، كۆكرىگىدە، قوسغىدا فوبۇن نۆك بولىدۇ. تېنىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 16~21 مىللىمېتىر بولىدۇ (16-رەسىم).

16-رەسىم قىزىل

قانداقلىق ھەرە


يېتىلگەنلىرى كۈندۈزى ھەر-

كەتلىنىدۇ. ئادەتتە يەر بېغىرلاپ

پەس ئۇچۇپ، پەرۋانە، كۈن كېيىنكى لىجىنكىلىرىنى نۇتۇپ ئۆزىگە ۋە ئالسىغا ئوزۇق قىلىدۇ.

(6) ياپونىيە ھەرىسى يېتىلگىنى فارامۇل، ساغۇخ سىزىق-

لىق بولىدۇ، سېرىق ھەرەگە بەكمۇ ئوخشاپ كېتىدۇ، ئۇنىڭ ئۇسۇنىكى كالىپۇكى يوغان بولۇپ، ئورتۇپ چىقىپ تۇرىدۇ، شۇخا قانداقلىق ھەرە دەپمۇ ئاتىلىدۇ. تېنىنىڭ ئۇزۇنلۇقى



12 مىللىمېتىرچە، ئالدىنقى قانتىنىڭ ئۇزۇنلۇغى 3 مىللىمېتىرچە بولسۇ (17-رەسىم).


يېتىلگەنلىرى كۆپىنچە قۇملۇق يەرگە ئۇۋا ياسايدۇ، ياز كىرىشى بىلەنلا، بۇ ھەرە تازا كۆپىيىدۇ،

كۈنگەي تەرەپتىكى قۇملۇق يەر - 17-رەسىم ياپونىيە ھەرىسى لەردە توختىماي ئۇ ياقتىن - بۇ ياققا ئۇچۇپ يۈرۈپ، چىۋىن، پاشا تۈرىدىكى ھاشارەتلەرنى تۇتۇپ كېلىپ، ئۇۋىسىدىكى لىجىنكىسىنى باقىدۇ، ھەر قېتىم سىرتقا چىققاندا ئۇۋىسىنىڭ ئاغزىنى ئېتىپ قويۇپ، كەلگەندە ئېچىپ كىرىدۇ، ناھايىتى ئالدىراش ئۆتىدۇ.

6. ياچىۋەك

ياچىۋەك بۆشۈك تەۋرەتتى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. ئۇ تۇتۇپ ئوزۇقلىنىدىغان چوڭ تىپتىكى بىر خىل كۈشەندە ھاشارەت، شۇنداقلا كىشىلەرگە تونۇش بولغان پايدىلىق ھاشارەت. ھەر خىل پەرۋانە، كۈن كېپىنىڭى، يوپۇرماق تومۇر قۇرۇتى، چىۋىن، فارغۇ چىرىپاسكا، چىكەتكە، كۆك پىست شۇنىڭدەك ھەر خىل پەرۋانە، كۈن كېپىنىڭى لىجىنكىلىرىنى تۇتۇپ يەيدۇ. ئەمما بىر بىرىنى ئۆلۈنۈرىدۇ. چوڭلىرى كىچىكلىرىنى، چىشىلىرى

ئەرگەكلەرنى بەۋىتىدۇ. تۇخۇم كالىلىكى ناھايىتى فالتىق بولۇپ، تۇخۇم دۆۋىسى دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇ دورا باسات ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. تاشقى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى تىنى ئۇزۇن ئىنچىكە كېلىدۇ، ئوتتۇرا تىپنىكىلىرى، چوڭلىرى بولىدۇ، رەڭگى يېشىل ياكى قوڭۇر كېلىدۇ. بېشى ئۈچ بۇرجەك بولىدۇ، خاققان ھەركەت قىلالايدۇ، كۆرى بۇرۇنۇپ چىقىپ تۇرىدۇ، كۆكرەك قىسمى ناھايىتى ئۇزۇن بولۇپ، ئىككى تەرەپتە ھەرە چىشى شەكلىدە ئۇششاق چىشلىرى بولىدۇ. ئالدى يۈتى



تۇنۇشقا ئەيلىك، يوتىسى يوغان بولىدۇ قوسغىنىك بان نەرىيىدە يېرىمى بولۇپ، غىلاپ سەكلىسى ھاسىل قىلىدۇ، يېرىمىنىڭ ئىككى تەرىپىدە سىر رەت تىكىنى بولىدۇ. ياقالغىمىك ئىچى نەرىيىدە ئۇششاق تىكىسى بولۇپ، قورۇلغان چاغدا، سىرىمىنىڭ ئىچىگە كىرىپ كىنىدۇ، بۇ خۇددى ئور- عاققا ئوخشاش بولۇپ، ناسقا زىيانداش ھالەتتە- لەرى بۇيۇسقا قۇلايلىق

18-رەسىم ئىككى داغلىمى باھىۋەك

1. سىلىكى 2. بىرچۇم

دۆۋىسى 3. ئالسى

بېرىدۇ. ئادەتتە ئەڭ كۆپ ئۇچرايدىغىنى ئىككى داغلىق ياجىۋەك بولۇپ بېتىلگىنىنىڭ نىسبىتى ئۇزۇنلۇقى 50~70 مىللىمېتىر، رەڭگى بېشىل بولىدۇ. فاستىنىڭ ئوتتۇرىدا سىدا ئۇچ بۇرچەكلىك ئاق داغ بولىدۇ، شۇڭا ئىككى داغلىق ياجىۋەك دەپمۇ ئاتىلىدۇ. تۇخۇمنىڭ قېپىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 30 مىللىمېتىر ئەتراپىدا بولۇپ، سىرنىقى ۋەۋىنى فانىق بولىدۇ. ئىسسىق تۇخۇمىنىڭ بولىدۇ، تۇخۇمخانىسى ئۇزۇنلۇقىغا ئىككى رەت بولۇپ، ھەر بىر تۇخۇمخانىسىدا سىردىن تۇخۇم بولىدۇ (18-رەسىم).

ياشاش ئادىتى ئىككى داغلىق ياجىۋەك ھەر بىلى سىر ئەۋلات قالدۇرىدۇ. تۇخۇم ھالىتىدە قىشتىن ئۆتىدۇ. كېيىنكى يىلى 5-ئاينىڭ ئاخىرلىرى، 6-ئاينىڭ باشلىرىدا تۇخۇمدىن لىجىنكىسى چىقىپ، تۇخۇمنىڭ قېپى ئۈستىدە بېپەك ئارقىلىق ساڭگىلا تۇرىدۇ، شامالنىڭ باردىمى بىلەن ئارقىلىقىدۇ. بۇنداق يېپەك لىجىنكىنىڭ قوسىغىدىن ئاچرىلىپ چىقىدۇ، لىجىنكى يېپەككە ئېسىلىپ شامالدا تەۋرىنىپ تۇرىدۇ، باسقا دەرەخلەر-نىڭ شېخىغا بېقىنلاشقاندا يېپەكتىن ئاچراپ، ئەركىن ھەرىكەت قىلىدۇ. تۇخۇمدىن دەسلەپ چىققان لىجىنكىسى تىتىك بولۇپ، سەكرەپ ئوبتاپدۇ. شۇنىڭدىن كېيىنلا، رىياداس ھاسارەتلەرنى كۆپلەپ تۇتۇپ يەيدۇ. ئادەتتە 5 قېتىم بولۇپ تىتىلىدۇ، نۇرغۇن ئىتتىلىدۇ. كۈندۈزى ھەرىكەتلىنىپ، سۆڭەك بەرپاسى، چوڭ تېرەك پەرزانىسى، يوپۇرماق قوغغۇزى، عوزا قۇرۇنى قاتارلىق

كۆپ خىل تىپتىكى زىيانداش ھاسارەتسى ۋە لىجىنكىلارنى تۇتۇپ يەيدۇ. 1973-يىلى سۈيىك ناھىيىسىدە ئىلىپ بېرىلغان نەكشۈرۈشكە قارىغاندا، يېتىلگىنى ھەر كۈنى پۈتۈك دەرىخىدە بولىدىغان كۈلرەك چوك پەرۋانىنىڭ قېرىغان لىجىنكىسىدىن 5 نى ئۇتۇپ يەدىكەن. يېتىلگىنىمۇ، بالسىمۇ ئاخشىمۇ ئۇزۇقلانماي-دىكەن، ھەر كەتمۇ قىلمايدىكەن. 8-ئاينىڭ ئاخىرلىرىدا چۈپلىنىدىكەن، چۈپلىشىپ بولغاندىن كىس، چىشى ئەر-كىگىنى بەرتىدىكەن. 8-ئاينىڭ ئاخىرلىرىدىن 9-ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىغىچە دەرىخ غولىغا ۋە نېمىغا توپ-توپ قىلىپ تۇخۇم نۇقىدىكەن. ئاۋال تۇخۇمغا سىجا بېيىشقا ماددا چىقىرىپ، ئاندىن تۇخۇمخانىسىنىڭ ھەر بىر بۆلمىسىگە بىردىن رەتلىك نىزىپ تۇغىدىكەن. پۈنۈن ئۆمرىدە 4~5 دۆۋە تۇخۇم تۇغىدىكەن. تۇخۇمىنىڭ قېپى قاننى ھەم بۇخا بولىدىكەن، ئۇ تۇخۇمنى ساقلايدىكەن. گەرچە شۇنداق بولسىمۇ، ئۇ تەبىئەت دۇنياسىدا بەنلا ھەر خىل پارازىت ھەرىلەرنىڭ بارزىتىلىشىغا ئۇچراپ تۇرىدۇ. بۇخۇم قىيىدا يەيدا بولغان نۇرغۇن كىچىك تۆشۈكلەر پارازىت ھەرىلىك چىققان تۆشۈگى بولۇپ ھىساپلىنىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، بىر خىل قارا مېتە لىجىنكىسى بولۇپ، ئۇ ئۆبىدە ساقلىنىۋاتقان بۇخۇم قېپىنىڭ ئىچىدىكى تۇخۇمنى بەت كىتىدۇ.

ئاسرائىل ۋە بايىدىلىنىش ئالىلارغا باجىۋەكنى تۇتماسلىق، تۇخۇمىنى بۇرۇرۇنمەسلىك نەرسىدا تەرىپە بىرىش كېرەك.

قش پەسلدە ئاممىنى ھەركەتلەندۈرۈپ، ياچىۋەك تۇخۇمنى كۆپلەپ يىغىپ، ئۇنى ئاسراپ فىشتىن چىقىرىپ، كىيىنكى يىلى باھاردا مۇبلىك دەرەخنىڭ ئۈستىگە قويۇپ قويۇش كېرەك. بالىسى تۇخۇمدىن چىقىپلا زىيانداش ھاسارەتنى تۇتۇپ يەيدۇ.

7. ياچىۋەك باشلىق ئالتۇن كۆز

تاشقى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى يېتىلگىنىنىڭ تېنى ئوتتۇراھال بولىدۇ، ئالدى پۇتى تۇتۇشقا ئەپلىك بولۇپ، ياچىۋەكنىڭ پۇتىغا ئوخشاپ كېتىدۇ. بېشى قىسقا ھەم كەڭ، ئالدى پۇتى ئۇزۇن بولىدۇ. ئالدى قانستى بىلەن ئارقا قانستى ئوخشىشىپ كېتىدۇ، تار، ئۇزۇن بولىدۇ، تېنىنىڭ ئۇزۇنلۇغى 8~14 مىللىمېتىر بولىدۇ. فانات كېرىمىسى 20~28 مىللىمېتىر بولىدۇ (9-رەسىم). تۇخۇمى ئاق ياكى قىزىل بولۇپ، قىسقا



ساپ ئۈستىگە تۇغىدۇ. تۇخۇم سېپىنىڭ ئۇزۇنلۇغى تۇخۇمنىڭ ئۇزۇنلۇغىدەك ئىككى ھەسسە كېلىدۇ. ئادەتتە تۇخۇمى دۆۋە-دۆۋە بولىدۇ. بىر باشلىق لىچىنكىسى كۈيە شەكلىدە بولۇپ، نېتىكىلىك بىلەن ھەركەتلەندۈرۈش ئىككى ياشتىن كېيىن پۇتىنىڭ ئۆزگەرىشى بىلەن سازاڭ شەكلىگە كىرىدۇ.

9-رەسىم ياچىۋەك باشلىق ئالتۇن كۆز

ياشاش ئادىتى يىتىلگىنىنىڭ ئادىتى باجىۋە كىنىڭكىگە ئوخشايدۇ. بىر ياشلىق لىچىنىكىسى باشقا زىمانداس ھاشارەت-لەرنى ماھىرلىق بىلەن نۇتۇپ يەيدۇ. بىرەر مۇۋاپىق بىمەكلىك، مەسىلەن، ئۆمۈچۈك تۇخۇمنىڭ خالىتىسى ياكى سېرىق ھەرە ئۇۋىسى قاتارلىق نەرسىلەرنى كۆرگەن ھامان ئېتىلىپ بېرىپ يەيدۇ. لىچىنىكىسى قېرىغاندىن كېيىن، ئاخىرقى كىچىك لىچىنىكا قېپى ئىچىدە غوزەك توقۇپ قوچاققا ئايلىنىدۇ.

ئاسراش ۋە پايدىلىنىش يىتىلگىنى چىقىدىغان خاھدا، ئۇنىڭغا زىيانكەشلىك قىلماسلىق كېرەك. باشقا زىيانداش ھاشارەتلەرنىڭ ئالدىنى ئالدىغان ۋە ئۇنى يوقىتىدىغان جاغدا، DDT، 666 قاتارلىق ئۆلتۈرۈش دائىرىسى كەڭرى دورىلارنى ئىشلەتمەي، ياجىۋەك باشلىق ئالتۇن كۆزنى ۋە ئۇنىڭ لىچىنىكىسىنى ئاسراش كېرەك.

8. يىلان باشلىق ئالتۇن كۆز

قاشقى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى تىنى 10~20 مىللىمېتىر، كۆكرىكى خۇددى بويۇغا ئوخشاش ئىنچىكە بولۇپ، جەبدەس-لىك بىلەن ھەركەت قىلالايدۇ، بېشى يىلاننىڭ بېشىغا ئوخشايدۇ. شۇڭا يىلان باشلىق ئالتۇن كۆز دەپ ئاتىلىدۇ. نەرسىلەر تۆگىنىك بويىغا ئوخشىتىپ، تۆگە بويۇن ئالتۇن كۆز دەپمۇ ئاتايدۇ. ئاغزى عاجىلىغۇچى ئېغىز بولۇپ، ئالدى

نەرەپكە حەقىقەت تۇرىدۇ، ئۈستۈنكى ئىككى ناھايىتى قاتتىق بولۇپ، ئامبۇرغا ئوخشايدۇ، ئاستىنقى ئىككىمۇ ناھايىتى تەرەققى قىلغان بولۇپ، نۆتۈپ ئوزۇقلىنىشقا ئەپلىك. قاننى پەردە ماددىلىق بولۇپ، جىم تۇرغاندا ئۆينىڭ ئۆگزىسىگە



ئىخسالىدۇ. بۇتى ئىنچىكە، ئۇزۇن بولۇپ، مېكىشقا ئەپلىك (20-رەسىم).

ياشايش ئادىتى يېتىلگىنىمۇ،

لەيلىكىسىمۇ ناھايىتى نېتىك بولۇپ، 20-رەسىم يىلان باشلىق زىيانداش ھاسارەتلەرنى بەك ئالتۇن كۆز

ئاسان نۆتۈۋالىدۇ. ئورمانلىقتا ھەمىشە دەرەخ غولىنىڭ قوۋزىغى ئاستىدىكى ھاسارەت نۇخۇمىنى ئېلىپ يەيدۇ ھەمدە ئۇششاق پوسىلاققور قاتارلىق دەرەخ غولىغا زىيان يەتكۈزىدىغان ھاسارەتلەرنىڭ تۇخۇمىنى، لېيلىكىسىنى، قوچىغىنى، يېتىلگەنلىرىنى تۇتۇپ بەيدۇ.

ئاسراش ۋە پايدىلىنىش ياچىۋەك باشلىق ئالتۇن كۆزگە ئوخشاش.

9. ئۇزۇن بۇرۇتلۇق ئالتۇن كۆز

تاشى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى يېتىلگىنىنىڭ ئۇزۇنلۇغى 23 مىللىمېتىر، قانات كېرىمىسى 70~80 مىللىمېتىر بولىدۇ. سەزگۈ بۇرۇتى يېپسىمان بولۇپ، ئۇچى توخماق شەكلىنى



ھاسىل قىلىدۇ. لىچىنكىسىنىڭ تېنىدە تەڭگىچە تۈك بولۇپ ئۈستۈنكى ئىككى كۈچلۈك ھەم ئۆتكۈر بولىدۇ. ئۇچى ئەگمەچ بولۇپ، چىشقا ئوخشاش بۆرتۈپ چىقىپ تۇرىدۇ (21-رەسىم).


ياشاش ئادىتى يېتىلگىنى كۈز پەسلىدە 21-رەسىم ئۇزۇن پەيدا بولىدۇ، ئاستا ئۇچىدۇ، كۈندۈزمۇ، بۇرۇتلۇق ئالغۇن كېچىسىمۇ ئۇچۇپ يۈرۈپ، ئۇششاق كۆزنىڭ لىچىنكىسى ھاشارەتلەرنى تۇتۇپ يەيدۇ. ئۆسۈملۈكنىڭ غولىغا نۇخوم تۇغىدۇ، لىچىنكىسى ئۆسۈملۈكتىن ياكى يەردىكى غازاك ئاستىدىن ياكى تاش ئاستىدىن ئۇششاق ھاشارەتلەرنى تۇتۇپ يەيدۇ. لىچىنكىسى قېرىغاندىن كېيىن يىپەك عوزەك ئىچىدە قوچاققا ئايلىنىدۇ.

ئاسراش ۋە پايدىلىنىش ياچىۋەك باشلىق ئالغۇن كۆزگە ئوخشاش.

10. توزاڭ قاناتلىق ئالتۇن كۆز

تاشقى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى يېتىلگەنلىرىنىڭ جۇسى ناھايىتى كىچىك بولۇپ، قانات كېرىمىسى 3~10 مىللىمېتىر بولىدۇ. تېنىمۇ، قانىتىمۇ ئاق رەڭلىك مۇملۇق توزاڭ بىلەن قاپلانغان بولىدۇ، سەزگۈ بۇرۇتى مارجانسىمان بولىدۇ. ئالدىنقى

قانتى بىلەن ئارقا قانتى ئوخشىشىپ كېتىدۇ. ئەمما ئارقا قانتى كىچىكرەك بولىدۇ، قانتىنىڭ تومۇرى بەك ئاز بولۇپ، قىرغاققا بارغاندا شاخلىمايدۇ. لېچىن-



كىسى ياپىلاقراق يۇمۇلاق بولىدۇ، ئىككى ئۇچى ئۇچلۇق بولۇپ، ئۆس-مۈنۈكى ئىككى ئىككى بىلەن تۆۋەنكى ئىككى بىرلىشىپ تۇمۇغىنى ھاسىل قىلىدۇ، كالىپۇگىنىڭ تۈزى ۋە تۆۋەن كالىپۇگى بىلەن ئۆرىلىپ تۇرىدۇ

22-رەسىم توزاڭ قاناتلىق ئالتۇن كۆز (22-رەسىم).
1-بېلىگىنى 2-لېچىنكىسى

ياشاش ئادىتى يېتىلگىنى 4-، 5-ئايلىرىدا ۋە 8-ئايلىرىدا پەيدا بولىدۇ، كېۋەز پىتى، نەشپۈت پىتى، شاپتۇل پىتى كۆپ بەرلەردە يۈرىدۇ. يېتىلگىنىمۇ، لېچىنكىسىمۇ كۆك پىت، توزاڭ پىتى، فاسراقلىق قۇرۇت، قىزىل ئۆمۈچۈك قاتارلىق ئۇشاق ھاشارەتلەرنى ۋە ئۇلارنىڭ تۇخۇملىرىنى يەيدۇ. ئاسراش ۋە پايدىلىنىش ياچىۋەك باشلىق ئالتۇن كۆزگە ئوخشاش.

11. ماڭدامچى قوڭغۇز


بۇنىڭ تۈرى خېلى كۆپ بولۇپ، چوڭ-كىچىكلىگىمۇ بىر خىل بولمايدۇ، رەڭگىمۇ تولا ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ. ھەر خىل

زىيانداش ھاشارەتلەرنى تۇتۇپ يەيدۇ. بۇ ئوزۇقلىنىش مىقدارى ناھايىتى چوڭ بولغان سىرخىل مۇھىم پايدىلىق ھاشارەت بولۇپ ھىساپلىنىدۇ.

تاشقى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى بېشى كۆكرىگىدىن تار بولىدۇ. ئاغزى ئالدى نەرىگە چىقىپ تۇرىدۇ. ساقا رىيانداش ھاشارەتلەرنى تۇتۇپ بەيدۇ. ئادەتتە تىسى قارا تاكى فوكۇر بولۇپ، بارقىراپ تۇرىدۇ. ئاز ساندىكىلىرىنىڭ تىنى سىل تاكى ساغۇچ يېشىل بولىدۇ. ئايىغى تېتىك بولۇپ، خاققان ماڭىدىغانلىقى ئۈچۈن، ماڭدامچى قوڭغۇز دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇنىڭ مۇنداق ئىككى تۈرى كۆپرەك ئۇچرايدۇ: تەن تۈزۈلۈشى بويىچە ئايرىغاندا، ئۇلار مۇنۇلار:

چىپار ماڭدامچى قوڭغۇز: يېتىلگىنىنىڭ ئۇزۇنلۇغى 29~40 مىللىمېتىر بولىدۇ، رەڭگى قارا قوڭغۇر بولۇپ، مېنالدەك پارىراپ تۇرىدۇ. بېشىدا، دۈلىسىدا، قاتتىق قاننىدا قوبۇق داغ بولىدۇ، قاتتىق قاننىنىڭ ھەر بىرىدە ئۇزۇنسىغا كەتكەن چوكرافى 3 تال سېرىق سىزىق بولىدۇ. تۇخۇمى بۇمۇلاق، ئاق بولىدۇ. لىجىنىكىسى كىچىك ۋاقتىدا بوز قوڭغۇر بولۇپ، كېيىن قارىيىدۇ، ئاخىردا ساغۇچ ئاق رەڭگە ئۆزگىرىدۇ. كۆكرەك قىسمىنىڭ ھەر بوعۇمىنىڭ ئارقا تەرىپىدە بىردىن قارا داغ بولىدۇ. قوساق قىسمىنىڭ ئارقا تەرىپىدە — 1 - بوعۇمىدىن 8 - بوعۇمىغىچە بولغان ئارىلىقىدىكى يوغان قارا داغنىڭ ئىككى تەرىپىدە — بىردىن قارا داغ بولىدۇ، قاپ - قارا 3 جۈپ پۇنى بولىدۇ، قوساق قىسمىنىڭ 9 - بوعۇمى -

نىڭ ئارقا نەرىپىدە بىر چۈپ ئاچماق قۇيرۇق قاپارخۇغى بولىدۇ، 10- بوغۇمدا يالغان پۇتى بولىدۇ. فېرىغان لىجىنىكىسىدە نىڭ تېنى 31~46 مىللىمېتىر بولىدۇ، قوچىغى ساغۇچ قوڭۇر بولىدۇ (23- رەسىم).



نامازشام ماڭدام قوڭغۇزى: يېتىل- گىنىنىڭ ئۇزۇنلۇغى 14~19 مىللىمېتىر بولىدۇ، بېشى، دۈلىسى سېرىق بولۇپ، ئوتتۇرىسىدا "±" شەكىللىك فاراسىزىق بولىدۇ، قاتتىق قانستى فارا بولۇپ، ئوتتۇرىسىدا بىر جۈپ سېرىق سىزىق بولىدۇ.

23- رەسىم چىپار ماڭدامچى

قوڭغۇز

ياشاش ئادىتى سېرىق چىپار

ماڭدامچى قوڭغۇز ھەر يىلى 1- سىلگى 2- لىجىنىكىسى بىر نەزىلاپ قالدۇرۇپ، يېتىلىپ تونا ئارىسىدا فىشلايدۇ، ئاز ساندىكىلىرى لىجىنىكا ھالىتىدە فىشلايدۇ. كېيىنكى يىلى 3- ئاي- نىڭ ئاخىرلىرىدا نۇپراقتى چىقىپ ھەركەتلىنىدۇ. 5- ئاينىڭ ئاخىرلىرىدى 6- ئاينىڭ باشلىرىغىچە بولغان ئارىلىقتا بۇخۇم تۇغىدۇ. بۇخۇملاش مەزگىلى 4~6 كۈن بولىدۇ. لىجىنىكىسى 3 ياشقا كىرىدۇ، لىجىنىكا مەزگىلى 23~25 كۈن بولىدۇ، قوچاق مەزگىلى 5~8 كۈن بولىدۇ. يېتىلگىنى 2~4 يىل ئۆمۈر كۆرىدۇ. بېنىلگىنى چاققان ھەركەت قىلىدۇ، نۇرغا ئىنتىلىدۇ، ئەمما ياخشى ئۇچالمايدۇ، كېچىسى ھەركەتلىنىدۇ. ھەر بىرى كۈزىگە

47 دانە يېپىشقا قۇرۇت تۇتۇپ يەيدۇ، بۇ، ئۆزىنىڭ ئېغىر-
لىغىدەك 17.6 ھەسسە كېلىدۇ. ئوزۇقلىنىدىغان حاغدا، ئۈستۈنكى
ئىككى بىلەن لىجىنكىنى تۇتۇپ تۇرۇپ، پوستىنى چىشلەپ
يېرىپ، ئىچىدىكى سۇيۇقلۇقنى شورايىدۇ، ئاخىردا يېپىز بىر
فەۋەت پوسنىلا قويدۇ، بەزىدە ئازراق سۇيۇقلۇقنى شوراپ
قوبۇلا كېتىپ، باشقا لىجىنكىلارنى تۇتسىدۇ. بىر نەرسىدىن
ئۆرگۈپ كەتكەندە، سېسىق بۇس چىقىرىدۇ ھەمدە ئاۋاز چىقىرىپ،
كۈشەندىدىن مۇداپىئەلىنىدۇ. ئۇنىڭ خىمىيىۋى دىخانچىلىق
دورلىرىغا قارشى تۇرۇش كۈچى ئاجىز بولۇپ، 666، DDT
چېچىلسا، كۆپ ساندىكىلىرى ئۆلىدۇ. توپا ئارىسىغا ئۇۋا ياساپ
تۇخۇملايدۇ. چىشىنىڭ ھەر بىرى 80 نەچچە تۇخۇم تۇغىدۇ،
لىجىنكىسى ئۆلگەن بولۇپ يېتىۋېلىشنى بىلىدۇ ھەمدە سېسىق
بۇس چىقىرىپ ئۆزىنى قوغدايدۇ، ئۆملىيدىغان يۇمشاق تەنلىك
ھاشارەتلەرنىڭ لىجىنكىلىرىنى تۇتۇپ يەيدۇ، ئەمما ئانچە كۆپ
ئوزۇقلانمايدۇ، قېرىغاندا توپا ئارىسىغا كىرىپ ئۇۋا ياساپ،
قوچاققا ئايلىنىدۇ.

ئاسراش ۋە پايدىلىنىش ماگدامجى قوڭغۇز خىمىيىۋى
دىخانچىلىق دورىلىرىغا، ئومۇمەن، ئىنتايىن سەزگۈر كېلىدۇ.
شۇكا ئېتىزلاردا، باغلاردا ياكى ئورمانلىقتا ماگدامجى قوڭغۇزنىڭ
پەيدا بولغانلىغى مەلۇم بولسا، خىمىيىۋى دىخانچىلىق
دورلىرىنى چاچماسلىق كېرەك.


12. تاغىل قوڭغۇز

تاغىل قوڭغۇز چېبار قوڭغۇز دەپمۇ ئاتىلىدۇ. ئۇ تولاراق يولدا تۇرىدۇ، ئادەم يېقىنلاشسا، ئالدى تەرەپكە ئۇچۇپ بېرىپ يەنە يولدا توختايدۇ، ئادەم يەنە يېقىنلاشسا، ئۇ يەنە ئالدى تەرەپكە ئۇچۇپ بېرىپ يولدا توختايدۇ. ئۇنىڭ ئادەم كەلگىچە يولدا توختاپ، يېقىنلاشقاندا ئۇچۇپ كېتىپ يەنە يولدا توختايدىغانلىغىغا ئاساسەن، ئۇ "يول توسار"، "باشلامچى" دەپمۇ ئاتىلىدۇ.

قاشقى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى جۇغى ئوتتۇراھال بولۇپ، رەڭگى ئوچۇق، تېنىمۇ، قاننىمۇ ساغۇچ يېشىل رەك بىلەن قىزغۇچ سۆسۈن رەڭنىڭ قوشۇلمىسىغا ئوخشاش بولۇپ، پارقراپ تۇرىدۇ. لىجىنكىسىنىڭ تېنى چىۋىن لىجىنكىسىنىڭ تېنىگە ئوخشاش يۇمشاق بولىدۇ، 8-بوغۇمدا قاپارتمىسى ۋە بىر جۈپ تەتۈر ئىلمىگى بولىدۇ. بۇنىڭ بىلەن تامنىڭ تۆشۈكىگە ئىلىنىپ مەزمۇت تۇرالايدۇ، ئادەتتە "تۆگە قوڭغۇز" دەپمۇ ئاتىلىدۇ. ئادەتتە ئۇنىڭ تۆۋەندىكىدەك ئىككى تۈرى كۆپرەك ئۇچرايدۇ. يېتىلگىنىنىڭ تەن تۈزۈلۈشى مۇنداق:

قۇملۇقتا ياشايدىغان تاغىل قوڭغۇز: يېتىلگىنىنىڭ ئۇزۇنلۇغى 10 مىللىمېتىر، رەڭگى قارامتۇل يېشىل بولۇپ، پارقراپ كۆكۈش كۆرۈنىدۇ. قاتتىق قاننىنىڭ تۈۋىدە ۋە ئۇچىدا "C" شەكىلدە

ئاق داغ، ئوتتۇرىسىدا "S" شەكىللىك ئاق سىزىق بولىدۇ (24-رەسىمنىڭ 1-چىسى).



جۇڭخۇا تاغىل قوڭغۇزى: يېتىلگە-
 نىنىڭ ئۇزۇنلۇغى 20 مىللىمېتىر،
 رەڭگى ساغۇچ يېشىل باكى توق
 سۆسۈن بولىدۇ. قاتتىق فانتى نوق
 سۆسۈن بولۇپ، ئوتتۇرىسىدا
 توغرىسىغا كەتكەن كەڭ ئاق سىزىق
 بولىدۇ، فانتى قانتىنىڭ تۈۋىدە
 ساغۇچ ئاق سىزىق بولىدۇ. بۇتى

24-رەسىم تاغىل قوڭغۇز
 1 نۇملۇقىدا ئاشاندىغان ئاغىل
 قوڭغۇر 2. جۇڭخۇا ئاغىل
 قوڭغۇزى 3 جۇڭخۇا ئاغىل
 قوڭغۇزىنىڭ لىجىكسى

ياشايش ئادىتى فالدۇرىدىغان
 ئەۋلادىنىڭ سانى ئېشىنى ئەمەس.

ھەر يىلى 6~8-ئايىلاردا ئۇنى ئالدىداش چىسىرىغى بىلەن
 كۆپلەپ تۇتقىلى بولىدۇ. ئۇ كۆپىنچە دەريا لاتقىلىرىدا، قۇملۇق-
 لاردا ۋە باغنىڭ ئۆيچۆرىسىدىكى نەم جايىلاردا پەيدا بولىدۇ.
 باشقا زىيانداش ھاشارەتلەرنى تۇتۇپ يەيدۇ. بېتىلگەنلىرى
 ئادەتتە جىلغىلاردىكى تاش ئارىسىدا ۋە داللىلاردىكى يول بوي-
 لىرىدا يۈرىدۇ ياكى پەس ئۇچۇپ كىچىك قۇرۇتلارنى تىرىپ
 يەيدۇ. شۇڭا، "ھاشارەت قوڭغۇزى" دەپمۇ ئاتىلىدۇ. ئۇ فورق-
 مايدۇ، يامغۇر ياققان سوغاق كۈنلەردە تۆسۈكلەرگە كىرىپ،


تۆشۈكسىك ئاغرىغا توپا دۆۋىلەپ قويدۇ. لىچىنىسىنىڭ تىنى يۇمشاق بولۇپ، چۈش قۇرۇتغا ئوخشايدۇ. 8- بوغۇمنىڭ دۈمبە تەرىپىدە قاپارتمىسى ۋە بىر حۇب تەتۈر ئىلمىگى بولۇپ، تامنىڭ تۆشۈگىگە ئېسىلىپ مەزمۇت تۇرالايدۇ، ئادەتتە "تۆگە قوڭغۇزى" دەپمۇ ئاتىلىدۇ. ئۇ كۆپىنچە قۇملۇق يەرلەردە تىك، يۇمۇلاق تۆشۈك كولاپ، شۇنىڭ ئىچىدە تۇرىدۇ. ئۇزۇقلىنىدۇ. خان چاغدا، تۆشۈكتىن بېشىنى چىقىرىپ ئاغزىنى ئېچىپ تۇرىدۇ ۋە چۈمۈلە، كۈمۈت قاتارلىق ئۇششاق ھاشارەتلەرنى تۇتۇپ، ئۇۋىسىغا ئېپكىرىپ يەيدۇ. ئادەتتە كىچىك بالىلار ئۇنى نۇتۇش ئۈچۈن ئۇششاق ئوت- چۆپىنى ئۇنىڭ ئۇۋىسىنىڭ ئاغزىغا تىقىپ قويدۇ، ئۇۋىدىكى لىچىنىكا ئوتنى بىمبىش ئۈچۈن چىققاندا، ئوتنى تارتىدۇ- دە، لىچىنىكا ئوتقا ئىلىنىپ چىقىدۇ. ھەر يىلى 5~9- ئايلاردا بېتىلگەنلىرى يەيدا بولىدۇ، نۇرغۇن بەك ئىنتىلىدۇ. ئاسراش ۋە پايدىلىنىش ھاسارەت نىغىنى ساندۇغىغا بىر- فانجە فەۋەت تاحىناي ئورنىتىپ قويۇش لازىم. خىرە نۇرلۇق چىراق بىلەن ھاشارەتنى جەلپ قىلغاندا، ناغىل قوڭغۇز كىرىپ قالسا، ئۇنىڭ زەھەرلىنىپ ئۆلۈپ قېلىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، ئۇنى دەرھال ئايرىۋېتىش لازىم.

13. يوشۇرۇن قاناتلىق قوڭغۇز

خېنەن ئۆلكىسىنىڭ جېكجۇ، شۇچاڭ قاتارلىق جايلارىدا

كۆپرەك پەيدا بولىدۇ. يېتىلگەنلىرىنى 6-، 7- ئايلاردا خىرە تۇرلۇق چىراق ئاستىدا كۆپلەپ تۇتقىلى بولىدۇ.

تاشقى كۆرۈنۈشى ئالاھىدىلىكى خۇشى كىچىك بولۇپ، تېنى ئۇزۇنچاق ياپىلاق كېلىدۇ، چۈمۈلىگە ئوخشايدۇ، بىر ئاز پارقىراپ تۇرىدۇ. فاتتىق قانتى ناھايىتى فىسقا بولۇپ، قوساق قىسمىنىڭ 1- بوغۇمىنىلا ياپالايدۇ، شۇڭا يوشۇرۇن فاناتلىق



قوڭغۇز دەپ ئاتىلىدۇ، رەڭگى فىزغۇچ قوڭغۇر بولىدۇ، ئارقا قانتى گەرچە خېلى چوڭ بولسىمۇ، ئالدى قانتىنىڭ ئاستىدا يوشۇرۇنۇپ تۇرىدۇ. قوساق قىسمى قارا بولىدۇ، ئەركىن ھەرىكەت قىلالايدۇ، كەينىگە ئېگىلەلەيدۇ

25- رەسىم يوشۇرۇن

(25- رەسىم).

قاناتلىق قوڭغۇز

ياشاش ئادىتى ھەر بىلى قالدۇرد.

دىغان ئەۋلادىنىڭ سانى ئېنىق ئەمەس. يېتىلگەنلىرى ئىتىزلاردا ياكى ئورمان ئارىسىدا يۈرىدۇ، كۈندۈزى باغاج- تاش ئارىسىدا، دەرەخ قوزغىسىك قېتىدا يۈرىدۇ. قاراڭغۇ چۈشكەندىن تارتىپ كېچىچە ئۇچۇپ يۈرۈپ، باشقا ئۇششاق ھاشارەتلەرنى تۇتۇپ يەيدۇ، نۇرغا بەك ئىنتىلىدۇ. ھەر بىلى 5- ئايدىن كېيىن، ھاشارەت چىرىغى ئاستىغا كۆپلەپ يىغىلىدۇ، بۇنى ئوبدان ئاسراش كېرەك. بۇنىڭ ئۇچۇن، ھاشارەت جەلپ قىلىش ئەسۋاۋى ئىچىگە ھاشارە

تايىرىش تاختىسى ئورنىتىپ، يوشۇرۇن قاناتلىق قوڭغۇزنى تېز رەك
تايىرىپ، ئۇنىڭ زەھەرلىنىپ ئۆلۈپ قېلىشىدىن ساقلىنىش
كېرەك.


شۇچاڭ ناھىيىسىنىڭ شىچياۋ رايونىدا بىر خىل يوشۇرۇن
قاناتلىق تومپاق كۆز قوڭغۇز بار. ئۇنىڭ ئۇزۇنلۇغى 4 مىللىم.
مېتىر ئەتراپىدا بولۇپ، رەڭگى قارا چۈمۈلىگە ئوخشايدۇ،
تۈگۈنەك سۆڭەك پاشىسىنىڭ ئۈستىدە ياكى كۆتىرىلىپ قالغان
قوۋزاق ئاستىدا ياشايدۇ. لىچىنكىسى شۇنىڭ ئىچىدە يۈرۈپ،
تۈگۈنەك سۆڭەك پاشىسىنىڭ لىچىنكىسىنى، قوچىغىنى يەيدۇ.
ھەر يىلى 5-ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدىن 6-ئاينىڭ باشلىرىغىچە
بولغان ئارىلىقتا ئەتىگەنلىكى ۋە كەچقۇرۇنلۇغى كۆپلەپ قوچاق-
تىن چىقىپ ئورمانلىقتا ئۇ ياقىتىن-بۇ ياققا ئۇچۇپ يۈرىدۇ،
ئادەم يولىدىن ئۆتكەندە ئېتىلىپ كېلىپ يۈز-كۆزىگە ئۆزىنى
ئۇرىدۇ، شۇڭا كۈمۈت دەپ ئاتىلىدۇ، كەچقۇرۇن ۋە ئەتىگەندە
ناھايىتى كۆپ بولىدۇ.

ئاسراش ۋە پايدىلىنىش تاغىل قوڭغۇز بىلەن ئوخشاش.

14. ئىلمەك قۇرۇت

بۇ قىسقىچ قۇرۇت دەپمۇ ئاتىلىدۇ، يەرنىڭ ئۈستىدە، توپ-
نىڭ ئارىسىدا كۆپ ئۇچرايدۇ.

تاشقى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىگى تېنى ئىنچىكە، ئۇزۇن،



بولۇپ، قوڭغۇزغا بەكمۇ ئوخشايدۇ. ئەمما قۇيرۇغىنىڭ ئۇچىدا قىسقىچى بولۇپ، ئۈستىدىن پەرقلىنىدۇ. ئەركىگىنىڭ قىسقىچى ئىچىگە ئېگىلگەن بولۇپ، يېرىم ئايغا ئوخشايدۇ. ئالدى قانتى قىسقا، ياغاچ بولۇپ، فوسغىنىڭ يېرىمىنىمۇ ياپالمايدۇ. بەدىسى قىزغۇچ فوكۇر بولۇپ، پارىزراپ تۇرىدۇ (26-رەسىم).

ياشاش ئادىتى ھەر يىلى فالدۇرىدىغان ئەۋلادىنىڭ سانى ئېنىق ئەمەس. بىلىگەن.

26-رەسىم ئىلمەك قۇرۇت
لىرى كېچىسى ھەركەتلىنىپ، كۈندۈزى توبا ئارىسىدا، ئانىنىڭ ئاستىدا، دەرىجە

قوزغىنىڭ قىتىدا، ئوب-چۆب ئارىسىدا بوشۇرۇنۇپ بۇرىدۇ. گۆسخورلۇق خۇسۇسىيىتى كۆرۈنەرلىك بولۇپ، ئۆسۈملۈك بىلەن باكى چىۋىن بۇرىدىكىلەر بىلەن، يەرنىڭ ئۈستىدە بۇرىدىغان باشقا ئۇتتاشقا ھاشارەتلەر بىلەن ئوزۇقلىنىشى باخشى كۆرىدۇ. جىنىسى تۇخۇمنى توبا ئارىسىغا نۇغۇب، خۇددى مىكىيان تۇخۇم باسقاندا، بېسىپ ياتىدۇ. بالىلىرى تۇخۇمدىن چىققاندىن كېيىن ئانىسىنىڭ ئەتراپىدا يۈرۈپ ياكى ئانىسىنىڭ ئاستىدا يېتىپ، ئۆزىنى قوغدايدۇ. بىر نەرسىدىن ئۆرۈكۈپ قېچىپ كەتسە، ئانىسى ئۇلارنى تىپىپ كېلىدۇ. بالىلىرىنىڭ تېنى بۇمىشاق، ئاق بولىدۇ. قانتى بولمايدۇ. بەرىنى كولىغاندا، بۇ ھاشارەتنى كۆپ

ئۇچرانقىلى بولىدۇ. تېگىپ قويسلا، قۇيرۇغىنى ئالدى تەرەپكە
 ۋەلىپ، ۋەسقۇچى بىلەن فارشلىق كۆرسىتىدۇ باكى چاقىلىق
 يېتىلگىنى نۇرغا ئىنتىلىدۇ. جېكجۇدا 9~10-ئايلاردا ئەڭ كۆپ
 پەيدا بولىدۇ.

ئاسراش ۋە پايدىلىنىش لىچىكىسى توننا ئارىسىدا يۇرىدۇ.
 بۇ ھاشارەتى رەھەرلىنىپ قېلىشتىن ساقلاش ئۈچۈن،
 نۇپرافنا حىمىيوى دىھابچىلىنى دورىلىرىنى بەك كۆپ چاچماس-
 لىق كېرەك.

15. دوغداق قوڭغۇز

قاشى كۆرۈنۈشى، ئۇھىدىلىكى جۇعى كىچىك بولۇپ،
 ئۇزۇنلۇقى 5~1 مىللىمېتىر كىلىدۇ. سەرگۈ نۇرۇتى نوقماقاسمان
 بولىدۇ. فاتتىق فانىنىك ئاخىرقى ئۇجى فرىوتىلىگەندەك
 تەكشى بولىدۇ، شۇكا قوساق قىسىمىك
 ئاخىرقى ئۇجى بالىكچاچ نۇرىدۇ، شۇكا
 ئۇ دوغداق قوڭغۇز دېيىلىدۇ. فاتتىق
 فانىنى پارامىزۇل، ساغۇچ باكى سىزغۇچ
 بولىدۇ (27-رەسىم).



ياشاش ئادىتى يېتىلگەنمۇ، لىچىكىدە 72-رەسىم دوغداق
 سىمۇ كۆپىنچە دەرىخ غولىدا يۈرۈپ، قوڭغۇزى
 پوسىلاخخورلارنى، شۇبىكىدەك كۆك پىپ، فاسراقلىق

فۇرۇتلارنى ۋە دەرەخ غولسىنى تېشىدىغان باشقا بەزى رىيانداس ھاسارەتلەرنى، ئۇلارنىڭ لىچىنكىلىرىنى، قوچاقلرىنى بۇنۇپ يەيدۇ. ئۆسۈملۈكلەرنىڭ ئۈستىدە ياشاپ، گۈلنىڭ ئاتى-ئانىسى، ئانىلىقلىرىنى بەدىغالىرىمۇ بولىدۇ، شۇڭا ئۇ رىيانداس ھاسارەت بولۇپمۇ ھىساپلىنىدۇ.

ئاسراش ۋە پايدىلىنىش تەتقىق قىلىشقا توغرا كېلىدۇ.

16. شەيتان قوڭغۇزى

تاشنى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى بۇ كىچىك تىپتىكى قوڭغۇز بولۇپ، ئۇزۇنلۇغى 1~4 مىللىمېتىر كېلىدۇ. غولى كەكرەك، ئەمما دىھىلى، قاتتىق بولۇپ، پارقراپ تۇرىدۇ. قاتتىق فانتى قىسىمى بولۇپ، قوساق قىسمىنىڭ ئاخىرى ئىككى بوغۇمىنى بائالمايدۇ. رەڭگى كۆپىنچە قوڭۇر، قارا، قىزغۇچ قوڭۇر بولىدۇ. ئالدى بۇتى كولىغۇچى پۇت بولۇپ ھىساپلىنىدۇ، بەزى تۈرلىرىنىڭ ئوتتۇرا يۇتى ۋە ئارقا پۇتىمۇ كولىغۇچى پۇت بولىدۇ. سەرگۈ بۇرۇتى جەينەكسىمان بولۇپ، بولغاسىمان قىسمى ناھا-يىنى زىچ بولىدۇ، ئادەتتە كۆكرىگىدىكى سەزگۈ بۇرۇنى ئۈۋىسى ئىچىدە تۇرىدۇ. لىچىنكىسىنىڭ تېنى كەكرەك بولىدۇ. كۆكرەك ئاستى قېتىلىشىپ كەتكەن بولىدۇ. قوساق قىسمىنىڭ بوغۇملىرى توغرىسىغا قورۇلۇپ كەتكەن بولىدۇ، قۇيرۇغى بەرەپتە سىر چۈپ فۇبۇزى بۈكچىسى بولىدۇ (28-رەسىمگە قاراڭ).



ياشاش ئادىتى كۆپىنچە دەرەخ قوۋ-
زىغى ئاستىدا، شاخ-عازاڭ ئارىسىدا ۋە
قىغ ئارىسىدا ياشايدۇ. چىۋىن قۇرۇتى،
بۇرگە قاتارلىق تازىلىققا زىيان يەتكۈزىدىغان
ھاشارەتلەرنى ۋە دەرەخ غولىدىكى پوست-
لاقخور، پىل تۇمشۇق قوڭغۇز، ئالتۇن
قوڭغۇز قاتارلىقلارنىڭ لىچىنكىسىنى،
قوچىغىنى ۋە تۇخۇمنى يەيدۇ.

28-رەسىم شەيتان
قوڭغۇزى

ئاسراش ۋە پايدىلىنىش تەتقىق قىلىشقا توغرا كېلىدۇ.

17. ئالا قوڭغۇز

تاشقى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى رەڭگى ئوچۇق، ئاساسەن
فىزىل، كۆك، قارا، يېشىل، ئاق بولىدۇ. جۇغى ئوتتۇراھال،
بۇمۇلاق، سىلىندىر شەكلىدە بولىدۇ. ئۇزۇنلۇغى 7~10 مىللە-



مېتىر بولىدۇ. لىچىنكىسى قىزغۇچ، بېشى
ياپىلاقراق بولىدۇ. قوساق قىسمىنىڭ 9-
بوغۇمىدا قېتىنلىشىپ كەتكەن ئۈستىخان
پىلاستىنكىسى بولۇپ، ئۇنىڭدا خېلى چوڭ
ئىككى ئىلمەك ئۆسۈپ چىققان بولىدۇ

29-رەسىم ئالا قوڭغۇز

(29-رەسىم).

ياشاش ئادىتى يېتىلگىنى ناھايىتى تېتىك بولۇپ، كۆپىنچە

تۇتۇب ئوزۇقلىنىشنى بىلىش باشايدۇ، دائىم ئوبدانلىقنى ئۇچۇپ زىيانداش ھانىھارەتلەر بار دەرەخكە ئاكى فوورسى سېۋىلىمغان ياغاچقا قوبۇب، رىبانداش ھانىھارەتلەرنى تۇتۇب يەيدۇ، پوسە-لاقخورى ياخشى كۆرۈب يەيدۇ. لىھىكىسىمۇ تۇتۇب ئوزۇقلىغىدۇ، پوسىلاقخورلارنىك، دەرەخكە رىبان بەتكۈزىدىغان پاشقا ھانىھارەتلەرنىك ئۇۋىسىغا ئاكى سىرىپ ھەرىمىنا، ھەسەل ھەرىمىنىك ئۇۋىسىغا كىرىۋىلىپ، دەرەخكە رىبان بەتكۈزىدىغان ھەرىمىنىك باسقۇچىكى ھانىھارەتلەرنى تۇتۇب يەيدۇ. بەرى نۇرلىرى چىكەتكىسىك نۇخۇمىنى يەيدۇ.

ئاسراش ۋە پايدىلىنىش بەتقىن ۋىلىنىغا نوسرا كېلىدۇ.


18. يىگىناغۇچ

يىگىناغۇچ كىشىلەر دائىم ئۇچرىتىپ نۇرىدىغان ئابدلىق ھانىھارەت بولۇب، كۆب جىل زىيانداش ھانىھارەتى بۇنۇپ بەيدۇ.

تاشقى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى شەكىلى تۈرىگە قاراپ چوك-كىچىك بولىدۇ، ئىككى مۇرەككەب كۆرى، 3 ئاددى كۆزى بولىدۇ، ئاغزى چابىنىغۇچى ئېغىز پورمىسىدا بولىدۇ. ئالدى فاستىمۇ، ئارفا فاستىمۇ تار، ئۇزۇن بولۇپ، تورغا ئوخشاش نومۇرى بولىدۇ، جىم تۇرغاندا فانىنى ئىككى يان تەرىپىدە بەكىشى تۇرىدۇ ياكى دۈمبىسىدە تىك بۇرىدۇ. قوسىغى ئۇزۇن،

تۈۋرۈك شەكلىدە ياكى يەلبۈگۈچ شەكلىدە بولىدۇ. بالىسى سۇ چايىنى دەپ ئاتىلىدۇ، سۇدا باشايدۇ، ئاستىنى كالبۇكى ئۆرۈم گىرىپ يۈز فاسرىغى تەكلىگە ئايلىنىپ قالغان بولىدۇ. ئادەتتە يېڭىغاغۇچنىڭ تۆۋەندىكى ئىككى خىلى كۆپرەك ئۇچرايدۇ، باشقى كۆرۈنۈشىدىن ئېپىئادا، ئۇلار مۇنۇلار:

چوك بىگىناغۇچ: يېتىلگىنىڭ تىمىك ئۇزۇنلۇغى 30 مىللە- مېتىرچە كېلىدۇ، قوسا قىسمىدا يېنىل باكى كۆكۈش، قارا قوڭۇر داغ بولىدۇ، ئالدى بۇتىنىڭ ئىچى نەرسىدە قارا سىزىق بولۇپ، باشقا خىلدىكىلىرىدىن تەكلا پەرقلىنىپ تۇرىدۇ (30- رەسىمنىڭ 1-سى).



30- رەسىم بىگىناغۇچ

1. چوك بىگىناغۇچ 2. ناعىل
- بىگىناغۇچ 3. ناعىل بىگىنا-
- غۇچنىڭ قوسىمىسىڭ ئىخىرى
- نۇچى 4. چوك بىگىناغۇچ-
- نىڭ بالىسى

تاغىل بىگىناغۇچ: يېتىلگىنىنىڭ تېنى ئىسجىكە، ئۇزۇن بولۇپ. 28 مىللە مېتىر كېلىدۇ، رەڭگى يېنىل بولىدۇ. يېشىڭ ئالدى تەرىپىدە "J" شەكىللىك قارا سىزىق بولىدۇ، قوسىمىدا نۇر- غۇنلىغان سېرىق سىزىق بولىدۇ، قوسىمىنىڭ ئالدى تەرىپى ئىنچىكە بولىدۇ (30- رەسىمنىڭ 2-سى).

3-سى).
ياشاش ئادىتى يېتىلگىنى ناھايىتى تېتىك بولۇپ، ئادەتتە

ئاز بىلەن كۈز ئالمىشىدىغان مەزگىللەردىكى ئىسسىق، تىنچىق كۈنلەردە كەچ كىرىشكە بىقىن، يامغۇر يېغىشتىن بۇرۇن، ئېتىز-ئاردا، سۇ بويلىرىدا توپلىشىپ پەس ئۇچۇپ، كۈن كېيىنكى، پەرۋانە، ياشا، چىۋىن فاتارلىق زىيانداش ھاشارەتلەرنى تۇتۇپ بەدۇ. تۇخۇملايدىغان چايدا سۇ يۈزىدە ئۇ ياقىتىن-بۇ ياققا ئۇخۇب بۇرىدۇ ۋە قۇرۇقنى سۇغا تەككۈزۈپ، سۇغا تۇغىدۇ. تۇخۇمدىن كىچىك بالىسى چىقىدۇ، بۇ سۇ چايىنى دەپ ئاتىلىدۇ، سۇدا ياشايدۇ، قېرىغاندىن كېيىن سۇنىڭ ئىچىدىكى ئوت-جۆپلەرگە ئۇرۇلۇپ، دۈمبىسىدىكى قېپىنى يېرىپ، يېتىلىپ چىقىپ، ھاۋادا ئۇچۇپ يۈرىدىغان بولىدۇ.

ئاسراش ۋە پايدىلىنىش بالىلارغا بىگىناغۇچىنى تۇتۇپ زەخمىلەندۈرمەسلىك توغرىسىدا نەزىيە بېرىش كېرەك.

19. ھاشارەت يەيدىغان چىرىپاشكا

ھاشارەت يەيدىغان چىرىپاشكا ئوۋچى چىرىپاشكا دەپمۇ ئاتىلىدۇ. بۇنىڭ نۇرى جېلى كۆپ بولۇپ، دۆلىتىمىزدە 2 مىڭ خىلدىن كۆپرەك تۈرى بارلىقى ئىسپاتلاندى. يۇمشاق تەنلىك ھەر خىل زىيانداش ھاشارەتلەرنى، مەسىلەن، پەرۋانە، كۈن كېيىنكى فاتارلىقلارنىڭ لىچىكىسىنى شوراپ بەيدۇ.

ئاشىقى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى تېنىنىڭ شەكلى ئادەتتىكى ئاسقا رېيانىسى چىرىپاشكىلاردىن روشەن پەرق قىلمايدۇ. ئەمما


زىيانلىق چىرىپاشكىلارنىڭ ھەممىسىنىڭ سېسىق پۇرىغى بولىدۇ، ھاشارەت يەيدىغان چىرىپاشكىنىڭ سېسىق پۇرىغى بولمايدۇ. بۇنىڭدىن باشقا، ھاشارەت يەيدىغان چىرىپاشكىنىڭ تۇمشۇغى فائىتىق بولىدۇ، تۇمشۇغىنىڭ تۇۋى ئالدى تەرەپكە سوزۇلۇپ چىققان بولۇپ، ئۇچى ئىلمەكتەك ئېگىلىپ تۇرىدۇ، زاڭىغا چاپلىشىپ تۇرمايدۇ، زىيانلىق چىرىپاشكىنىڭ تۇمشۇغى بولسا چوققىسىدىنلا تۆۋەن تەرەپكە قاراپ چىققان بولۇپ، زاڭىغا چاپلىشىپ تۇرىدۇ ۋە بىۋاسىتە ھالدا تېنىنىڭ ئارقا تەرىپىگە قاراپ سوزۇلغان بولىدۇ. ئىلمەكسىمان بولمايدۇ. ھاشارەت يەيدىغان چىرىپاشكىنىڭ ئادەتتە كۆپرەك ئۇچرايدىغىنى تۆۋەندىكى 3 خىلدىن ئىبارەت:

دالا ئوۋ چىرىپاشكىسى: يېتىلگىنىنىڭ تېنى ساغۇچ، قوڭۇر بولۇپ، ئۇزۇنلۇغى 7~8 مىللىمېتىر كېلىدۇ، تېنى ئىنچىكە، بېشى ئۇچلۇق بولىدۇ، چوققىسىدا ئۇزۇنغا كەتكەن قارا سىزىق بولىدۇ، مۇرەككەپ كۆزى تۇتۇق قوڭۇر بولىدۇ (31-رەسىمنىڭ 2-سى).

ھاشارەت يەيدىغان يوغان قوساق چىرىپاشكا: يېتىلگىنىنىڭ رەڭگى قارا قوڭۇر، قوسىغى يوغان بولىدۇ، قانىتى قىسقا بولۇپ، قوسىغىنىڭ يېرىمىنى ئاران ياپالايدۇ. ئۇزۇنلۇغى 10 مىللىمېتىرچە بولىدۇ (31-رەسىمنىڭ 3-سى).

ئوۋچى چىرىپاشكا: قوسىغى كەڭرەك، رەڭگى قارا بولىدۇ. تۇمشۇغى ياي شەكلىدە ئېگىلگەن بولىدۇ، كۆكرىگىگە چاپلىدۇ.

شېپ تۇرمايدۇ (31-رەسىمنىڭ 1-سى).



31-رەسىم ھاشارەت يەيدىغان چېرىشكا

1. ئۈۈچى چېرىشكا 2 دالا ئۈۈ چېرىشكىسى 3. ھاشارەت

يەيدىغان بونان قوساق چېرىشكا

ياشايش ئادىتى ئورۇنلىرىسى دائىرىسى ناھايىتى كەڭرى بولۇپ، تېتىلگەنلىرىمۇ، بالىنىرىمۇ بوبۇرمانى قۇرۇنى، قىرىلجا پەرۋاسى، عوزا قۇرۇنى، يۇرچاق قۇرۇنى قاتارلىق كۆپ خىل يۇمشاق تەنلىك زىيانداش ھاشارەتلەرنى تۇتۇپ يەيدۇ، ئادەتتە زىرائەت ئۈستىدە، مەۋلىك دەرەخ، ئورمان قاتارلىق ئۆسۈم-لۈكلەرنىڭ يوبۇرمىغى ياكى قوۋزىغى ئاستىدا بۇرىدۇ، زىيانداش ھاشارەتلەرگە بولۇققان چاغدا، يېكىسىمان ئاغزىنى زىيانداش ھاشارەتلىك نېنىگە ساسىچىپ، ئۇنىڭ تىسىدىكى ئوزۇقلۇقنى شوراپ، ئۇنى ئۆلمۈرىدۇ. قىش يەسىلىدە كۆپىنچە دەرەخ قوۋزىغى ئاستىدا ياكى بېيىنجا ئۆسۈملۈكلەر ئاستىدا نوپىلىشىپ يوشۇرۇن ھالەتتە قىشلايدۇ.

ئاسراش ۋە پايدىلىنىش چەتئەللەرنىڭ خەۋەر قىلىشىچە،
1972-يىلى ئامېرىكا بىر خىل فىزغۇج ئۇزۇن ئوۋچى چىراشنى
كىنى قوي يېمى بىلەن بېقىپ، ھەر ھەپتىدە 7000 نى تۇغدۇر-
غان. ئەگەر بېقىپ كۆپەيتىلگەن ئوۋچى چىراشكىنى ئېتىزغا
قويۇپ بېرىش بىلەن زىيانداش ھاشارەت يوقىتىلىدىغان بولسا،
بۇمۇ زىيانداش ھاشارەتنى يوقىتىشنىڭ ئەڭ ياخشى چارىسى
ھىساپلىنىدۇ.

بۇنىڭدىن باشقا، ھاشارەت بەدىدىغان چىراشكىمۇ خىمىيىۋى
دىخانچىلىق دورىسىغا قارىتا ناھايىتى سەزگۈر كېلىدۇ، شۇڭا
ئۇنىڭ ئۆلۈپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن، دورا چاچقاندا ئاسراشقا
دىققەت قىلىش كېرەك.

20. قوڭۇر قاناتلىق چىراشكا

بۇ خېنەن ئۆلكىسىنىڭ ھەممە يېرىگە تارقالغان، ئۇنىڭ
يېتىلگىنىمۇ، بالىلىرىمۇ ھەر خىل زىيانداش ھاشارەتلەرنىڭ
تېنىدىكى سۇيۇقلۇقنى شوراپ يەيدىغان بىر خىل پابدىلىق
ھاشارەت بولۇپ ھىساپلىنىدۇ. ئەمما ئۇ ئەينى ۋاقىتتا، نەشپۈت-
نىڭ، ئالمنىڭ مۇسسىگە ۋە زىرائەتكىمۇ زىيان يەتكۈزىدۇ،
شۇڭا ئۇ بىر خىل زىيانداش ھاشارەت بولۇپمۇ ھىساپلىنىدۇ.

تاشقى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى بېتىلگىنىنىڭ ئۇزۇنلۇقى
16~18 مىللىمېتىر، رەڭگى قارامنىل فوڭۇر بولۇپ، كۆكۈش

قوڭۇر رەڭلىك قونۇق دىغى بولىدۇ. بېشى ئۇزۇنچاق چاسا بولۇپ، ئالدى تەرەپكە چىقىپ تۇرىدۇ. كۆكرىگىنىڭ ئالدى قىرغىغا بىقن يېرىدە 4 دانە ساغۇچ قوڭۇر داغ بولىدۇ. كىچىك قالقان-سىمان پىلاستىنكىسىنىڭ ئالدى قىرغىغا يېقىن ئىككى ئۇچىدا



2 دانە سېرىق داغ بولىدۇ. ئالدى قانتى پەردىلىك بولۇپ، رەڭگى سېرىق بولىدۇ. تۇخۇمى ئاقۇش بوز بولۇپ، قىسقا سىلىندىر شەكلىدە بولىدۇ، ئادەتتە 10 نەچچە تۇخۇم-مىنى بىر يەرگە تەكشى تىزىپ تۇغىدۇ.

بالىلىرىنىڭ دۈمبىسىدە بىرقانچە داغ (32-رەسىم قوڭۇر بولىدۇ (32-رەسىم). قاناتلىق چىرىپاشكا

ياشايش ئادىتى ھەر يىلى بىر ئەۋلات قالدۇرىدۇ، يېتىلگەن-لىرى ئۆينىڭ بۇلۇڭى، ئوت-چۆپ دۆۋىسى قاتارلىق ئورۇنلاردا قىشلايدۇ. كېيىنكى يىلى 4-ئاينىڭ ئاخىرىدا ئۇچۇشقا باشلاپ، 5-ئاينىڭ باشلىرىغىچە شۇنداق ياشايدۇ. بۇ مەزگىللەردە بېكى چىققان بوپۇرماقنى شوراپ ئوزۇقلىنىدۇ. 5-ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدا جۈپلىشىپ تۇخۇم تۇغىدۇ، كۆپىنچە، يوپۇرماقنىڭ ئارقا يۈزىگە رومبا شەكىللىك قىلىپ ياكى رەتسىز تىزىپ تۇغىدۇ، ھەر بىر تۇخۇم مونسىگىدە 16~20 تۇخۇمى بولىدۇ. تۇخۇم مەزگىلى 2~10 كۈن بولىدۇ. 6-ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدا بالىلىرى كۆپلەپ نۇخۇم-دى چىقىدۇ. 4 قېتىم تۈلەپ يېتىلىدۇ. يېتىلگەنلىرىمۇ، بالىلىرىمۇ ھەمىشە يىكسىمان تۇمشۇغىنى پەرۋانە، كۈن كېيىنىڭكى لىچىن-

كەسىننىڭ قوچىغىغا ياكى يېتىلگەنلىرىنىڭ تېنىگە سانجىپ، ئۇنىڭدىكى سۇيۇقلۇقنى شورايىدۇ. بۇنىڭ بىلەن زىيانداش ھاشارەت قورۇلۇپ ئۆلىدۇ، ئۇ يەنە چىرىپاشكا، يوبۇرماق قوڭغۇزى قاتارلىق زىيانداش ھاشارەتلەرنىڭ تېنىدىكى سۇيۇقلۇقنىمۇ شوراپ يەيدۇ.


يېتىلگەنلىرىمۇ، بالىلىرىمۇ زىيانداش ھاشارەتلەرنىڭ تېنىدىكى سۇيۇقلۇقنى شوراش بىلەنلا فالماي، پاۋتۇك، چۈلۈك قاتارلىق دەرەخلەرنىڭ نوتىلىرىنى، نەشپۈت ۋە ئالمنىڭ غورىلىرىنىمۇ شوراپ، مۆبىسىنى غەيرى تەبىئى شەكىلگە كىرگۈزۈپ قويىدۇ. شۇڭا ئۇ ئورمانغا، مۈشلىك دەرەخقە زىيان يەتكۈزىدۇ. خان ئاساسلىق زىيانداش ھاشارەت ھىساپلىنىدۇ. كۈزنىڭ ئاخىرلىرى يەنى 11-ئايلىرىدا ئۆيىنىڭ بۇلۇكى ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش يونسۇرۇن جايلارغا ئۇچۇپ كېلىپ توپلىشىپ قىشلايدۇ ھەمدە سېسىق پۇراق چىقىرىپ، تازىلىققا دەخلى يەتكۈزىدۇ.

ئاسراش ۋە پايدىلىنىش يېقىنقى يىللاردىن بۇيانقى تەكشۈرۈشلەرگە ئاساسلانغاندا، كۆچەتلىك ۋە ئورمانلىقلاردا بۇنىڭ زىيىسىدىن كۆرە پايدىسى كۆپ ئىكەن. شۇڭا ئاسراشقا دىققەت قىلىپ، ئۇنىڭ دىخانىچىلىق دورىلىرىنى قالايمىقان ئىشلىتىش بىلەن ئۆلۈپ كېتىشىدىن ساقلىنىش لازىم. ئەمما باغلاردا بولسا ئۇنىڭ پايدىسىدىن كۆرە زىيىنى كۆپ بولىدۇ، كۈزنىڭ ئاخىرلىرىدا، يەنى ئۇ ئۈچەككە كىرگەن مەزگىلىدە، ئۇنى توپلىشىپ قىشلاش ئادىتىدىن پايدىلىنىپ تۇتۇپ، باغدىن يىراق جايلاردىكى

كۆچەتلىك ياكى ئورمانچىلىق رايونىغا يۆتكەپ فىشتىر، ئامان - ئىسەن ئۆتكۈزۈپ، كىسكى يىلى باھاردا قوبۇپ نەرسىمۇ بولىدۇ.

21. گۈللۈك چىرىپاشكا

گۈللۈك چىرىپاشكا خىنەن ئۆلكىسىنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى كېۋەزلىكلەردە، مېۋىلىك دەرەخلەردە كۆپ بولىدۇ. فىرىل ئۆمۈچۈك، كۆك يىپ قانارلىق زىيانداش ھاتارەتلەرنى نۇپۇي يەيدۇ.



تاشقى كۆرۈنۈشى ئالاھىدىلىكى
يېتىلگەنلىرىنىڭ تېپى قارا قوكۇر بولۇپ، ئۇرۇنلۇغى 2 مىللىمېتىر كېلىدۇ، بۇجۇم شەكلىدە بولۇپ، ئۇششاق سومۇر قۇرۇتقا ئوخشايدۇ.

بېشى ئۇچلۇق، مۇرەككەپ كۆزى 33-رەسىم گۈللۈك چىرىپاشكا قارا بولىدۇ (33-رەسىم).

1. بىلىگىسى 2. بالىسى

باشاش ئادىتى قالدۇرىدىغان ئەۋلادىنىڭ سانى ئىنىمۇ ئەمەس. يېتىلگەنلىرى قالدۇرى ساج-عاراك ئارىسىدا، بەرىك يېرىقلىرىدا شۇندەك فىشىنى ئۆتىدىغان زىرائەت ئارىسىدا قىشلايدۇ. كېيىنكى يىلى باھار كىلىپ ھاۋا ئىللىغاندا ھەركەتلى-نىشكە باشلايدۇ. يېتىلگەنلىرىمۇ، بالىلىرىمۇ ئوخشاسلا كۆك پىت،


ۋەزىلى ئۆمۈچۈك، فارغۇ چىرىپاشكا، تېرىپىس ۋە غوزا قۇرۇتى قاتارلىق زىياندىن ھاسارەتلەرنىڭ نۇخۇمىنى يەپ ياشايدۇ. ئۆسۈملۈك بۇقۇلمىسى ئىچىدە تۇخۇملايدۇ، نۇرغا ئىنتىلىدۇ، سېسىق سۇيۇقلۇق چىقىرىدۇ. بەزىدە ئادەمنى چېقىپ، تېرىسىنى زىدە قىلىپ قويىدۇ.

ئاسراش ۋە بۇيىدىلىنىش قارا غوللۇق يېشىل فارغۇ چىرىپاشكاغا قارالمۇن.

22. قارا غوللۇق يېشىل قارغۇ چىرىپاشكا

قارا غوللۇق يېشىل قارغۇ چىرىپاشكا شالدا بولىدىغان ئۇچار پىتىنىڭ مۇھىم كۈشەندىسى. گۇاكدۇكىدا ئېلىپ بېرىلغان تەكشۈرۈشكە قارىغاندا، كەنجى شالىنىڭ ئاخىرقى مەزگىلىدە ئۇنىڭ قوڭۇر سال پىتىنىڭ تۇخۇمى سوراپ يېيىشى ئوتتۇرا ھېساب بىلەن %74.23 كە يېتىدىكەن.

تاشنى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى يېتىلگىنىنىڭ تېنىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 3 مىللىمېتىر، رەڭگى ساغۇچ يېشىل بولۇپ، پىشانە-سىدىق جوقىسىغىچە سوزۇلغان قارا قوڭۇر رەڭلىك چوكراق بىر داغ بولىدۇ. دۇلىسى قارا قوڭۇر بولىدۇ. غولنىڭ يۇقۇرقى تەرىپىدە بىر جۈپ لۆكسى بولىدۇ، لۆكسىنىڭ كەينىدىكى ئوك-سول بەرەپلىرىدە ئۇزۇنغا كەتكەن ئىككى تال قارا قوڭۇر سىزىق



بولدۇ. كۆكرىگىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى
 فالقانسىمان پىلاستىنكىسى قارا قوڭۇر
 بولدى، كىچىك فالقانسىمان پىلاستىن-
 كىسىنىڭ ئوتتۇرىسىدا بىر قارا قوڭۇر
 داغ، ئىككى يان تەرىپىدە ئۇزۇنسىغا
 كەتكەن بىر جۈپ قارا قوڭۇر داغ

بولدى. پۇتى ساغۇچ يېشىل بولدىۇ
 34-رەسىم قارا غوللۇق يېشىل
 قارغۇ چىرىپاشكا
 (34-رەسىم).

ياشاش ئادىتى يېتىلگەنلىرىمۇ،
 بالىلىرىمۇ شالدا بولىدىغان ئۇچار
 1. بېسىلگىسى 2. بۇخۇمى
 3. نالىسى

پىتىسىك تۇخۇمىنى شوراپ يەيدۇ. ئالدى بىلەن ئۇچار پىت
 تۇخۇمى بار جايلارنى ئىزلەپ تېپىپ، ئاندىن كېيىن نەشتىرىنى
 تۇخۇمىنىڭ ئىچىگە سانجىپ تۇخۇم سۇيۇقلۇقىنى شوراپ يەيدۇ.
 تۇخۇم سۇيۇقلۇقى شورۇۋېلىنغاندىن كېيىن فورۇلۇپ كالىكە
 بولۇپ قالىدۇ، شۇمۇرۇلۇپ بولمىغان تۇخۇم غەلىتە شەكىلگە
 كىرىپ قالىدۇ-دە، بالا يېتىلدۈرۈش ئىقتىدارىدىن قالىدۇ.
 قارا غوللۇق يېشىل قارغۇ چىرىپاشكا سۇۋانغان شال، ياپ-يېشىل
 شال ئۇچار پىتى كۆپ پەيدا بولغان ئېنىزدا يۈرۈشنى ياخشى
 كۆرىدۇ. تۇخۇمىنى يوپۇرماق غىلىۋىغا ياكى ئوتتۇرا تومۇر
 توقۇلمىسىغا تارقاق قىلىپ تۇغىدۇ، نۇرغا خېلى ئىنتىلگەك
 بولىدۇ.

ئاسراش ۋە پايدىلىنىش تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىپ، بۇ

خىل كۈشەندە ھاشارەت كۆپەيگەن چاغدا، ئۆلتۈرۈش دائىرىسى
كەڭرى دىخانچىلىق دورىسىنى چاچماسلىق كېرەك.

23. كۆك پىت يەيدىغان قارا قارغۇ چىرىپاشكا

بۇ خېنەننىك پاختىچىلىق رايونلىرىنىڭ ھەممىسىگە تارقالغان
بولۇپ، كۆك پىت يەيدۇ.

تاشقى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى يېتىلگىنىنىڭ رەڭگى قارا



قوڭۇر، ئۇزۇنلۇغى 4.8 مىللىمېتىر بولىدۇ،
كېچىك قالقانسىمان پىلاستىنكىسىنىڭ
يۇقۇرى بۇرجىگى ئاقۇش، ئوتتۇرىسى قارا
بولىدۇ. قاتتىق فانتىنىڭ ئوتتۇرىسىدا،
ئالدىنقى بۇرجىگىدە، ئارفا بۇرجىگىدە ۋە
شىناسىمان پىلاستىنكىسىنىڭ يۇقۇرىسىدا
بىردىن چوڭ قارا داغ بولىدۇ. بالىسى
قوڭۇر، ئۇزۇن تۈكلۈك بولىدۇ. دۈلىسى

كېچىك بولىدۇ. كېچىك قالقانسىمان پىلاستىنكىسىنىڭ
تېنىسىدا ۋە بىخلىما قانتىدا بۇلۇتسىمان قارا قارغۇ
داغ بولىدۇ، قوسىغى قىزىل بولىدۇ
چىرىپاشكا
1. دەسلەپكى 2. بالىسى
(35-رەسىم).

ياشاش ئادىتى پەيدا بولۇش ئەھۋالى ئېسى ئىدەس،

يېتىلگەنلىرىمۇ، بالىلىرىمۇ ھەر خىل كۆك پىنلارنىڭ تىنىدىكى سۇبۇقلۇقنى سورايدۇ. كېۋەزلىكتە كۆپرەك پەيدا بولىدۇ. ئاسراش ۋە پايدىلىنىش قارا غوللۇق يېشىل قارغۇ چىرى-پاسكىغا ئوخشاش.

24. يوغان كۆزلۈك ياپىلاق چىرىپاشكا

بۇ خېنەن ئۆلكىسىنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى كۆۋەز، كۆكتات، يېشىل ئوغۇت قاتارلىق زىرائەت ئىتىزلىرىغا تارقالغان بولۇپ، ھەر خىل كۆك پىنلارنىڭ ۋە پەرۋانە، كۈن كېيىنىگىنىڭ لىخنىكىلىرىنى شوراپ يەيدۇ.

تاشقى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى يېتىلگىنىنىڭ ئۇزۇنلۇغى 5~6 مىللىمىتىر، رەڭگى قارا بولىدۇ، تېنى باپىلاق، كەكرەك بولىدۇ، ئالدى قانتىنىڭ پەردىلىك قىسمىدا



ئۇزۇنغا كەتكەن 4~5 تال تومۇر بولىدۇ. بېشى دىھماق ھەم كەك بولىدۇ، مۇرەككەپ كۆرى يوغان، ئۇزۇنخاق، ئۇمۇلاق بولۇپ، ئارقا بەرىپىگە بۆرتۈپ چىقىپ نۇرىسىدۇ،

رەڭگى قارا قوڭۇر بولىدۇ (36-رەسىم).

36-رەسىم يوغان كۆزلۈك ياپىلاق چىرىپاشكا

باشقا ئادىتى يېتىلگەنلىرى سىدىلىككە، ناخ عازاك ئوت-چۆپ، ئارىسىدا

ئىشلايدۇ. يېتىلگەنلىرىمۇ، بالىلىرىمۇ غوزا قۇرۇتى،

قىزىل غوزا قۇرۇتى، كېۋەزنىڭ ئۈزەك قۇرۇتى، قىيپاش سىزىقلىق پەرۋانە قاتارلىق كېپىنەك تۈردىكىلەرنىڭ لىچىنكىلىرىنى ۋە تۇخۇمنى يەيدۇ، كۆك پىت، قارغۇ چىرىپاشقا قاتارلىق زىيانداش ھاشارەتلەرنىمۇ تۇتۇپ يەيدۇ. كۆكتات، ئاشلىق، يېشىل ئوغۇت قاتارلىق زىرائەتلەردە ۋە كېۋەزدە بۇنى ئۇچراتقىلى بولىدۇ.


ئاسراش ۋە پايدىلىنىش قارا غوللۇق يېشىل قارغۇ چىرىپاش- كىغا ئوخشاش.

25. كۆك پىت يەيدىغان تۈگۈنەك پاشا

بۇ خېنەن ئۆلكىسىنىڭ ھەممە يېرىگە تارقالغان، ئۇنىڭ لىچىنكىسى كۆك پىت يەيدۇ، كېۋەزلىكتە، مېۋىلىك دەرىخ شۇنىڭدەك كۆك پىت كۆپ بولغان باشقا جايلاردا كۆپلەپ پەيدا بولىدۇ.

تاشقى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى يېتىلگىنىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 1.4~1.8 مىللىمېتىر بولۇپ، كىچىك پاشىغا ئوخشايدۇ. رەڭگى بوز يېشىل بولىدۇ. سەزگۈ بۇرۇتى ناھايىتى ئۇزۇن، مارجانسىمان بولىدۇ، ھەر بىر بوغۇمىدا ئايلىنىما تۈك بولىدۇ. لىچىنكىلىرى چىۋىن قۇرۇتى شەكلىدە بولۇپ، رەڭگى ساغۇچ قىزىل كېلىدۇ، بېشى ئېنىق كۆرۈنىدۇ، كۆكرەك-قوساق تەرىپىدە "Y" شەكلى-لىك نېپىز ئۈستىخان پىلاستىنكىسى بولىدۇ، قۇيرۇغىدا 8 نال

تېكەنچىسى بولىدۇ. قوچىغى ساغۇچ
 فېزىل بولىدۇ. چېكىسىدە بىر خۇب
 ئىنچىكە تۈك بولىدۇ، كۆكرىگىدە
 بىر جۈب نەپەسلىنىش نەيچىسى
 بولىدۇ (37-رەسىم).



ياشاش ئادىتى ھەر بىلى 5~6
 ئەۋلاد فالدۇرۇپ، قوجاق ھالىتىدە
 قىشلايدۇ، نۇخۇمدىن جىغىپ
 سىتلىگىچە 16~29 كۈن كېتىدۇ،
 چىشىسىنىڭ ھەر بىرى 116~125
 تۇخۇم تۇغىدۇ، تۇخۇملاش مەزگىلى

3 كۈن ئەتراپىدا بولىدۇ، لىخنىكا
 مەزگىلى 10 كۈن ئەتراپىدا بولىدۇ.
 نۇخۇمدىن دەسلەپ جىققان لىخنى-
 كىسى كۆك پىت ئارىسىدا يۈرۈپ،
 ئۇنى يىمىشكە باسلايدۇ، باش
 لىخنىكىلىرى ئىغز ئىلىمىگىنى
 سوزۇپ، كۆك پىتنىڭ قوسىغى بىلەن

37-رەسىم كۆك پىت يەيدىغان
 تۈگۈنەك پاشا

1. نەسلىگىنى 2. نۇخۇمى
3. لىخنىكىسى 4. قوچىغى
5. كۆك پىتنىڭ ئالدى
 بۇيىسى بارىلاندىرۇپ،
 رەھىرىسى سانجىت بھۇس
 فىلوانغان لىخنىكا

ئالدى پۇتى ئوتتۇرىسىدىن تىپىرىسىنى سىرتىپ،
 تېنىدىكى سۇيۇقلۇقنى سوراپ يەيدۇ. بىرئاز چوكاباغىدىن
 كىيىن، نەشتىرىنى كۆك پىت پۇتىنىڭ بافالغىدىكى بوغۇم
 ئارىلىغىغا سانجىپ، ئۇنى زەھەرلەپ بھۇش قىلىپ، ئاسىدىن


كېيىن شورايىدۇ. لىچىنكىسى يېتىلگەندىن كېيىن، يېمەك قۇسۇپ، كۆك پىتىك قۇرۇق تېرىسنى چىرماپ يوپۇرماقنىڭ ئارقا يۈزىدە ياكى يەردە قىزغۇچ سېرىق نېپىز غوزەك توقۇپ قوچاققا ئايلىنىدۇ. ئاسراش ۋە پايدىلىنىش قارا غوللۇق يېشىل فارغۇ چىرپاش-كىغا ئوخشاش.

26. تىرىپىس

تىرىپىس ناھايىتى كىچىك بىر خىل ھاشارەت، ئادەتتە كۆز بىلەن ئاسانلىقچە كۆرگىلى بولمايدۇ. كۆپىنچە مۈنلىك دەرەخ، كېۋەز، كۆكتات قاتارلىق ئۆسۈملۈكلەردە پەيدا بولىدۇ. بۇنىڭ كۆپىنچىسى زىيانداش ھاشارەت، ئەمما ئۇنىڭ كۆك بىب، توزاك پىتى، قىزىل ئۆمۈچۈك فانارلىقلارنى ئۇتۇپ يەيدىغان بەزى پايدىلىق تۈرلىرىمۇ بار، بۇ نەرىپىسى ئالغاندا، ئۇ مۇھىم كۈشەندە ھاشارەت ھىساپلىنىدۇ.

تاشقى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى رەڭگى سېرىق، ساغۇچ قوڭۇر ياكى قارا بولىدۇ. ئۇزۇنلۇقى 0.8~2 مىللىمېتىر بولىدۇ. يەردە قاناتلىق بولۇپ، قاننى ناھايىتى تار، ئۇزۇن تاسما شەكىلدە بولىدۇ، قاننىڭ تومۇرى ناھايىتى ئاز بولىدۇ ياكى بولمايدۇ. چۆرىسىدە پەيگە ئوخشايدىغان ئۇزۇن تۈكى بولۇپ، جىم تۇرغاندا دۈمبىسىنىڭ يان تەرىپىدە تەكشى تۇرىدۇ. قوساق قىسمى ئىنچىكە ئۇزۇن بولىدۇ. ئاغزى سانچىپ شورغۇچى

فورمىسىدا بولىدۇ. ئادەتتە تۆۋەندىكى 2 خىل تىرىپىس كۆپرەك ئۇچرايدۇ، يېنىلگەنلىرىنىڭ كۆرۈنۈشى مۇنداق:



ئالە داغلىق تىرىپىس: يېتىلگەن-
لىرىنىڭ رەڭگى ساغۇچ ئاق بولۇپ،
يېشىنىڭ رەڭگى نۇتۇقراق بولىدۇ،
قانىنى ئاق سۈزۈك بولىدۇ، ئالدى
قانىنىڭ ھەر بىرىدە 3 تالدىس قارا
فوكۇر داغ بولىدۇ. تېنىنىڭ ئۇزۇن-
لۇغى 0.8 مىللىمېتىر بولىدۇ (38-
رەسىمىنىڭ 1، 2-سى).

38-رەسىم تىرىپىس

تاغلىق تىرىپىس: يېنىلگەنلىرىنىڭ
1.7 مىللىمېتىر بولۇپ، تېنى سېرىق
بولىدۇ. بېشى، دۈلىسى پاقراقراق
كېلىدۇ. قانىنى كەكرەك بولىدۇ.
ئالدى قانىنىڭ، كەينى قانىنىڭ
ئوتتۇرىسىدا 2 دانە قارا داغ
بولىدۇ. ئالدى قانىنىڭ چۆرىسىدىكى تۈكى قىسقا بولىدۇ
(38-رەسىمىنىڭ 3، 4-سى).

1. ئالە داغلىق تىرىپىسنىڭ
يېتىلگەنلىرىنى 2. ئالە داغلىق
تىرىپىسنىڭ بالىسى 3. تاغلىق
تىرىپىسنىڭ يېنىلگەنلىرىنى
4. تاغلىق تىرىپىسنىڭ قوجىسى

ياشايش ئادىتى ئالە داغلىق تىرىپىس بىلەن تاغلىق
تىرىپىسنىڭ ھەر ئىككىسىمۇ ئۇلادىنىڭ سانى ئېشىپ
ئەمەس. 6~7-ئايلىرىدا مېۋىلىك دەرەختتە كۆپ پەيدا بولىدۇ.
دۇلانا فىزىل ئۆمۈچۈگى ئارىسىدا ياشاپ، ئۇنى تۇتۇپ يەيدۇ.

دۇلانا قىزىل ئۆمۈچۈگىنى تىزگىنلەشتە مەلۇم رول ئوينايدۇ. باشقا كۆك پىت، كېۋەز تىرىپىسى، تام سالجىسى ۋە باشقا كىچىك ھاسارەتلەرنىمۇ تۇتۇپ يەيدۇ.

ئاسراش ۋە پايدىلىنىش زىيانداش ھاسارەتلەرنى يوقىتىدىغان چاغدا، پايدىلىق تىرىپىنى ئاسراپ قېلىش ئۈچۈن ئۆلتۈرۈش دائىرىسى كەڭرى دىخانچىلىق دورىلىرىنى ئىشلەتمەسلىك لازىم، دورا چېچىش مەزگىلىگىمۇ دىققەت قىلىش كېرەك.

27. كۆك پىت يەيدىغان چىۋىن

كۆك پىت يەيدىغان چىۋىن ھەسەل ھەرىسىگە ئوخشايدۇ، ئەمما دۈمبىسىدە توغرىسىغا كەتكەن نۇرغۇن سېرىق سىزىقلار بولىدۇ. گۈل-چىچەكلەر ئارىسىدا يۈرۈپ، چىچەك تۈزىكى ۋە گۈل شىرنىسىنى يەيدۇ، ئادەتتە ئۇچۇپ يۈرىدۇ ياكى ئىككى فانتىنى تەۋرىتىپ ئۆز ئورنىدا جىم تۇرۇپ، يەنە ئۇشتۇمتۇتلا باشقا يەرگە ئۇچۇپ بېرىپ، ئايلىنىپ يۈرىدۇ. كۆك پىت توپى ئارىسىغا ياكى ئۇنىڭ ئەتراپىغا تۇخۇم تۇغىدۇ، تاسادىپى ھالدا بوپۇرماققا ياكى ئۆسۈملۈكنىڭ غولىغا قونۇپ يۈرۈپمۇ بۇغۇپ قويدۇ، تۇخۇمى ئاق، ئۇزۇنچاقراق بولىدۇ. لىچىنىكى-سىنىڭ شەكلى چىۋىن قۇرۇتقا ئوخشاش بولۇپ، بېشى ئۇچلۇق، قۇيرۇقى دىخماق، تېنى يىرىك كېلىدۇ، تېنىدە ئۇزۇنغا كەتكەن سىزىق بولىدۇ، ھەمىشە تېنىنىڭ ئالدىنقى يېرىمىنى كۆتىرىپ،

ئىككى يېنىغا ئىغاڭلاب تۇرىدۇ. كۆك پىت ئۇچراپ قالسىلا، كاپ قىلىپ چىشلەپ، ئۇچۇپ يۈرۈپ شۇمۇرۇپ يەيدۇ، بەدەن سۇيۇقلۇغىنى شۇمۇرۇپ بولغاندىن كىيىن، قالغان جەسىدىنى تاشلىۋېتىپ، يەنە داۋاملىق تۇتۇپ يەيدۇ. لىچىنكىسىنىڭ ھەر بىرى پۈتۈن ئۆمرىدە بىر قانچە يۈز كۆك پىتنى ھەتتا مىڭ نەچچە يۈز كۆك پىتنى تۇتۇپ يەيدۇ. بەزىدە يوپۇرماق تومۇز قۇرۇتى، فاسراقلىق قۇرۇت، تىرىپىس، پەرۋانە، كۈن كېيىنىگىنىڭ لىچىنكىلىرىنى ۋە تۇخۇملىرىنىمۇ يەيدۇ. ئۇ زىيانداش ھاشارەت-لەرنىڭ مۇھىم كۈشەندىسى ھىساپلىنىدۇ.

كۆك پىت يەيدىغان چىۋىن ھەر يىلى 5~7 ئەۋلات قالدۇ-رۇدۇ، كۆپىنچە، لىچىنكا، قوچاق ھالىتىدە ئۆسۈملۈكنىڭ يىلتىزى تۈۋىدىكى توپا ئارىسىدا قىشلايدۇ. باھار پەسلىدە ئالدى بىلەن مېۋىلىك دەرەخ، ئورمان، كۆكتاب، بۇغداي تۈرىدىكى زىرا-ئەت، يېشىل ئۇغۇت قاتارلىق ئۆسۈملۈكلەر ئارىسىدا كۆك پىت تۇتۇپ يەيدۇ، 5~6-ئايلىرىدا كۈەز قاتارلىق زىرائەتلەر ئارىسىدا كۆك پىت تۇتۇپ يەيدۇ، كۆك پىت ئازىيىدىغان 7-8-ئايلىرىنى قوچاق ھالىتىدە ئۆتكۈزۈپ، كۈز پەسلىدە يەنە مېۋىلىك دەرەخ، ئورمان، كۆكتات ۋە باشقا كۈزلۈك زىرا-ئەتلەر ئارىسىدا كۆپىيىپ، كۆك پىت تۇتۇپ يەيدۇ. ياز پەسلى-دىكى ئەۋلادىنىڭ تۇخۇم مەزگىلى ئاران 2~3 كۈن بولىدۇ. لىچىنكا ۋە قوچاق مەزگىلى نەخمىنەن 6~7 كۈن بولىدۇ. بىر ئەۋلادىنىڭ ۋاقتى نەخمىنەن 16~28 كۈن بولىدۇ.


خېنەندە تۆۋەندىكى بىرقانچە خىل كۆك پىت يەيدىغان چمۇن كۆپرەك ئۇچرايدۇ.

1. كۆك پىت يەيدىغان ئۇزۇنچاق چمۇن

بۇ خېنەن ئۆلكىسىنىڭ ھەممە يېرىگە تارقالغان، ئۇنىڭ لىچىنكىسى بۇغداي پىتى، شاپتۇل پىتى، نەسپۇت پىتى، كۆكتاب پىتى قاتارلىق ھاشارەتلەرنى تۇتۇپ يەيدۇ.

تاشقى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى بېنىلگەنلىرىنىڭ ئۇزۇن-لۇغى 6~8 مىللىمېتىر، غولى كۆكۈش قارامتۇل بولىدۇ، ئىككى يان تەرىپىدە ئۇزۇنغا كەتكەن قىزغۇچ سېرىق سىرىق بولىدۇ.

كىچىك قالقاسمان پىلاستىنكىسى قىزغۇچ سېرىق بولىدۇ. پۇتى سېرىق، قوساق قىسمى ئىنجىكە، ئۇزۇن، قىزغۇچ سېرىق بولىدۇ. توغرىسىغا كەتكەن قوڭۇر يوللۇق 4 تال دېغى بولىدۇ. تۇخۇمى ساغۇچ ئاق، ئۇزۇنچاق، ئەگمەچ-رەك يۇمۇلاق بولىدۇ، لىچىنكىسى



10~12 مىللىمېتىر، ساغۇچ بېشىل كېلىدۇ، چمۇن قۇرۇتى شەكلىدە بولىدۇ، نېسى بىرىك بولىدۇ، ئالدى نەرسىسى ئۇچلۇق،

39-رەسىم كۆك پىت يەيدىغان ئۇزۇنچاق چمۇن

1. ئەنلىگىنى 2. تۇخۇمى
3. لىچىنكىسى 4. فوھىغى

ئارفا نەرسى دىخماق، يۇمۇلاق بولىدۇ، ئۇچىدا تىك چىقىپ تۇرغان بىر جۈپ نەپەسلىنىش نەيچىسى بولىدۇ. فوچىغى 8 مىللىمېتىر بولۇپ، ئۇچىدا لىجىنكا ھالەتتە ئاخىرقى قېتىم تۈلگەن تېرىسى بولۇپ، ئۇ يوپۇرماققا ياكى شاخقا يېپىشىپ فالىدۇ (39-رەسىم).

ياشاش ئادىتى بىر مىلدا بىرقانچە ئەۋلات قالدۇرۇپ، فوچاق ھالىتىدە ۋىشلاندى. كېيىنكى يىلى 3~4-ئايلىرىدا يېتىلىپ چىقىدۇ. كۆك پىت نوپى ئارىسىغا ياكى شۇنىڭغا يېقىن يوپۇرماق-لارىنىڭ ئارفا بۇزىگە تۇخۇم تۇغىدۇ. لىجىنكىسى تۇخۇمدىن چىققاندى كېيىن، كۆك پىت ياكى باشقا زىيانداش ھاشارەت-لەرنىڭ تېنىدىكى سۇبۇقلۇقنى شورايىدۇ. قېرىغان لىجىنكىسى ئەك ئاخىرقى قېتىم تۈلگەن نېرىسىنى يوپۇرماققا يېپىشتۈرۈپ فوچاققا ئايلىنىدۇ. فوچاق مەزگىلى 5~7 كۈن بولىدۇ، يېتىلىپ چىققاندىن كېيىن جۈپلىشىپ تۇخۇم تۇغىدۇ. 1~2 كۈندىن كېيىن ئۆلىدۇ.

ئاسراش ۋە پايدىلىنىش زىيانداش ھاشارەتلەرنى يوقىتىدۇ. دىغان چاغدا ئۆلتۈرۈش دائىرىسى كەڭ بولغان دىخانچىلىق دورى-لىرىسى ئىشلەتمەسلىك لازىم، كۈشەندە ھاشارەتنىڭ ئۆلۈپ كەت-مەسلىكى ئۈچۈن، دورا چاچىدىغان ۋاقىتقا دىققەت قىلىش كېرەك.

2. كۆك پىت يەيدىغان باشقا چىۋىنلەر

(1) كۆك پىت يەيدىغان چىۋىن كۆك پىت كۆك پىت چىۋىن

بېتىلگەنلەرنىڭ ئۇزۇنلۇغى 8~10 مىللىمېتىر، رەڭگى قارامۇل بولىدۇ. بېشى بىلەن كىچىك قالدانسىمان پىلاستىنكىسى قىزغۇچ سېرىق بولىدۇ. قوساق



قىسمى ئۇزۇنچاق يۇمۇلاق، 2-، 3-، 4- بوغۇمنىڭ ئىككى يان تەرىپىدە بىر جۈپتىن ئالدىغا ئېگىلگەن ئىلمەكسىمان ساغۇچ

توغرا سىزىق بولىدۇ (40) - 40- رەسىم كۆك پىت يەيدىغان كۈلرەڭ چىۋىن رەسىم).

(2) كۆك پىت يەيدىغان چوڭ يېشىل چىۋىن يېتىلگەن.

نىڭ ئۇزۇنلۇغى 12~15 مىللىمېتىر، رەڭگى كۆكۈش بوز بولىدۇ، غولى تون كۆكۈش بولۇپ، پاقىراپ تۇرىدۇ. دۈمبىسىدە توغرىسىغا كەتكەن يېرىم ئاي



شەكىللىك 3 جۈپ ساغۇچ ئاق 41- رەسىم كۆك پىت يەيدىغان چوڭ يېشىل چىۋىن داغ بولىدۇ (41- رەسىم).

(3) كۆك پىت يەيدىغان تىكەن ئاياقلىق چىۋىن بېتىلگەن.

نىڭ ئۇزۇنلۇغى 6~10 مىللىمېتىر، رەڭگى كۆكۈش قارامۇل بولىدۇ، كىچىك قالدانسىمان پىلاستىنكىسى ساغۇچ ئاق بولۇپ، ئوتتۇرىسى قارا قوڭۇر كېلىدۇ. ئەركىگىنىڭ ئارفا نۇتىسىدا تىزىدا چوڭراق تىكەن بولىدۇ. قوساق قىسمىدا بوغرىسىغا

كەتكەن 3 تال سېرىق بالداق بولىدۇ، ئۇنىڭ بىرى ئوتتۇرىسىدىن ئۈزۈلۈپ قالغان بولىدۇ (42-رەسىم).

(4) كۆك پىت يەيدىغان قارا بالداق چىۋىن يېتىلگەندىن كۆكۈش بولۇپ، پاقىراپ تۇرىدۇ، ئۇزۇنغا كەتكەن 4 تال ساغۇچ بوز سىزىق بولىدۇ. قوساق قىسمىنىڭ 2-، 3-، 4- بوغۇملىرىدا توغرىسىغا تارتىلغان ئىككى تالدىن قارا سىزىق بولىدۇ. بۇنىڭ ئالدى تەرەپتىكىسى كەڭ، ئارقا تەرەپتىكىسى تارراق بولىدۇ (43-رەسىم).



42-رەسىم كۆك پىت يەيدىغان تىكەن ئاياقلىق چىۋىن



43-رەسىم كۆك پىت يەيدىغان قارا بالداق چىۋىن


28. ھاشارەت يەيدىغان كۆكۈيۈن

ھاشارەت يەيدىغان كۆكۈيۈن فاۋول بولۇپ، ئۇچۇشقا ماھىر، ناھايىتى ۋەھشى كىلىدۇ، ئۇچۇپ يۈرگەن زىيانلىق ھاشارەت-لەرنى تۇتۇپ يەيدۇ، تۈرى كۆپ، ھەممىلا يەردە بولىدۇ.

تاشى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى ھاشارەت يەيدىغان كۆكۈ-
يۈننىڭ تېنى ئىنچىكە، ئۇزۇن كېلىدۇ، نۇرغۇن تىكەنلىك تۈكى
بولدۇ. تولىسىنىڭ تۇمشۇقى ئىلمەك بولىدۇ، چوققىسى ئويما،
كۆزى تومپاق بولىدۇ. كۆپىنچىسىنىڭ تېنى پارا قوڭۇر بولىدۇ،
قوساق قىسمىنىڭ ھەر بىر بوغۇمىنىڭ ئارقا يېرىم قىسمىدا توغ-
رىسىغا كەتكەن سېرىق بالداقلار بولىدۇ ھەمدە نۇرغۇنلىغان
سېرىق ئىنچىكە، قىسقا تۈك بولىدۇ. ئەركىگىنىڭ قوساق قىسمى-
نىڭ ئاخىرقى ئۇچىدا نۇرغۇن سېرىق ئىنچىكە تۈك بولىدۇ،
چىشىسىنىڭ ئۇنداق بولمايدۇ. ئۆزى فاۋۇل بولۇپ، ئۆزىدىن
چوڭ ھاشارەتلەرنى، مەسلەن، چىۋىن تۈرىدىكىلەرنى نۇتۇپ
يىيەلەيدۇ. تۇخۇمى ئاق بولىدۇ، ھەر خىل ئۆسۈملۈكلەرنىڭ
يويۇرماقلىرىغا تۇغىدۇ. لىچىنىكىسى ساغۇچ ئاق بولىدۇ، تېنى
تۈز، سىلىقراقى ھەم قاتتىق بولۇپ، بېشى ئالدى تەرەپكە چىقىپ
تۇرىدۇ. ئۇچلۇق ياپىلاق بولىدۇ، ئادەتتە ئۇنىڭ تۆۋەندىكى
ئىككى خىلى ئۇچرايدۇ:

ھاشارەت يەيدىغان جاڭگال كۆكۈيۈنى: يېتىلگەنلىرىنىڭ
تېنىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 20~28 مىللىمېتىر، رەڭگى قارا بولىدۇ،
غولى كۆتىرىلىپ تۇرىدۇ، كىچىك قالقانسىمان پىلاستىنىكىسى
ساغۇچ قوڭۇر بولىدۇ. قوساق قىسمى ئىنچىكە. ئۇزۇن، ھەرفاي-
سى بوغۇملىرىنىڭ ئاخىرقى قىرغىغىدا سېرىق بالداق بولىدۇ،
ئەركىگىنىڭ فۇبىرۇغىنىڭ ئۇچىدا ئاق تۈكلۈك داغ بولىدۇ،
چىشىسىنىڭ ئۇنداق بولمايدۇ (44-رەسىمىڭ 2-سى).

ھاشارەت يەيدىغان جۇڭگو كۆكۈيۈنى: بىتىلگىنىنىڭ تېنىنىڭ ئۇزۇنلۇغى 20~28 مىللىمېتىر، رەڭگى ساغۇچ قوڭۇر ياكى قىزغۇچ قوڭۇر بولىدۇ، سەزگۈ بۇرۇتى فارا، ساغۇچ قىزىل بولىدۇ، 3-بوغۇمى قارا بولىدۇ. كۆكرەك قىسمى قىزغۇچ سېرىق، قوساق قىسمى ساغۇچ قىزىل بولىدۇ (44-رەسىمنىڭ 1-سى).



44-رەسىم ھاشارەت يەيدىغان كۆكۈيۈن

1. ھاشارەت نەيدىغان جۇڭگو كۆكۈيۈنى 2. ھاشارەت

نەيدىغان خاڭگال كۆكۈيۈنى 3. ماي قوڭغۇزىنىڭ

لىخنىكىسى نەۋائىغان كۆكۈيۈن لىخنىكىسى

ياشاش ئادىتى بىتىلگەنلىرى كۈندۈزى ھەركەت قىلىدۇ، ئادەتتە بول بويىدا حم تۇرۇپ، بېنىغا كەلگەن ھاشارەتلەرنى نۇپۇس يەيدۇ ياكى ھاشارەتلەرنى كۆرگەن ھامان قوغلاپ


يۈرۈپ تۇتىدۇ. ھەر خىل ئۆسۈملۈكلەرنىڭ يوپۇرماقلىرىغا تۇخۇملايدۇ. لىچىنكىسى تۇخۇمدىن چىققاندىن كېيىن تۇپراقتا ياكى چىرىگەن دەرەخ شېخى ئارىسىدا يوشۇرۇنۇپ يۈرۈپ، ماي قوڭغۇزىنىڭ لىچىنكىسى فاتارلىق ھاشارەتلەرنى تۇتۇپ يەيدۇ.

ئاسراش ۋە پايدىلىنىش كۆك پىت يەيدىغان چىۋىنىڭ ئوخشاش.

29. تۇتۇپ ئوزۇقلىنىدىغان سالجا

تۇتۇپ ئوزۇقلىنىدىغان سالجا گۆشخور كانا دەپمۇ ئاتىلىدۇ، ئۇ فىزىل ئۆمۈچۈكىنى تۇتۇپ يەيدىغان مۇھىم كۈشەندە ھاشارەت. يېقىنقى بىرقانچە يىلدىن بۇيان، خىمىيىۋى دىخانچىلىق دورىلىرى فالايمقان ئىشلىتىلگەچكە، فىزىل ئۆمۈچۈكىنىڭ (بويۇرماق سالجىسىدا) دورىغا قارشى كۈچ پەيدا بولۇپ قالدى، ھازىر بىئولوگىيىلىك ئۇسۇل ئارقىلىق ئالدىنى ئېلىش، بوقتىشقا بۇنۇپ ئوزۇقلىنىدىغان سالجىنىڭ، بولۇپمۇ ئۆسۈملۈك كانىسىنىڭ كۆكۈلدىكىدەك ئۈنۈم بېرىدىغانلىقى سېزىلدى. چۈنكى ئۇنىڭ ئوزۇقلىنىشى شىددەتلىك ھەم مەخسۇس بولىدۇ، بىر خىمىيە سالجا كۆمۈردە بولىدىغان بەش خىمىيە فىزىل ئۆمۈچۈكىنىڭ ئىككى ھەپتە ئىچىدە كۆپەيگەن ئەۋلادىنى تامامەن بوفىمىلايدۇ. خېمەن ئۆلكىسىنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى باغچىلاردا دىھقانچىلىق

سالجا ۋە فارغۇ سالجا ئومۇمى يۈزلۈك پەيدا بولىدۇ. تاشقى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى خۇشى كىچىك بولۇپ، ئادەتتە كۆز بىلەن كۆرۈش تەس. دىخماق سالجىنىڭ تېنى يۇمۇلاق ياكى سوقىماق بولىدۇ، بىشى تېنىدىن سوزۇلۇپ چىقىپ



نۇرىدۇ. ئاغزى سانجىپ شورىغۇچى ئىغىز فورمىسىدا بولۇپ، نۇمشۇغىنى باسقا سالجىلارنىڭ باكى باشقا ھاشارەتلەرنىڭ تېنىگە سانجىپ، نەن سۇيۇقلۇغىنى شورىدۇ. قاننى، كۆزى بولمايدۇ ياكى 1~2 جۈپ

45-رەسىم تۇتۇپ ئوزۇقلىنىد.

دىقان سالجا

ئاددى كۆزىلا بولىدۇ. 4 جۈپ بۇتى بولىدۇ (45-رەسىمنىڭ 1-سى).

1. فارغۇ سالجىنىڭ تېنى ياپلاق، سۈزۈك، سۇس ساغۇچ بولىدۇ. دىخماق جىشى سالجىنىڭ دۈمە نەرەبىس كۆرۈنۈشى

2. چىلى كىچىك ئۆسۈملۈك ياشاش ئادىتى بۇنۇپ ئوزۇق-

سالجىسى

لىنىدىغان سالجا كۆپىنچە

نەسلىنىپ خۇپلىشىپ كۆپىيىدۇ. چىشىسى ئەركىگى بىلەن جۈپلەسكەندىن كېيىن ئۇرۇقلىنىدۇ، بالىسى بۇخۇمدىن كېيىن

3 جۈپ پۇت چىقىدۇ. بۇلجىنكا دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇ بۇلجىگەندىن كىيىن باس فۇرۇب مەرگىلىگە كىرىدۇ، 4 جۈپ بۇتى بولىدۇ،

يەنە تۈلىگەندىن كېيىن بېتىلىدۇ. نەزى تۈرلىرىنىڭ جىشىسى بەككە ھالدىمۇ كۆپىيىدۇ. بىر بىلدا كۆپ ئەۋلات فالدۇرىدۇ،

29~30°C لۇق ئەڭ مۇۋاپىق تېمپېراتۇرا شارائىتىدا 3~5 كۈندە بىر ئەۋلات قالدۇرۇپ ماڭىدۇ، بىر چىشى سالجا ھەر كۈنى 3 تۇخۇم تۇغىدۇ، تۇغۇش مەزگىلى 30 كۈندىن ئېشىپ كېتىدۇ. يېتىلگەنلىرىمۇ، بالىلىرىمۇ كۈچلۈك ھەركەتلىنىش ئىقتىدارىغا ئىگە بولۇپ، مەخسۇس ئوزۇقلىنىدۇ، ھەمىشە قىزىل ئۆمۈچۈك توپى ئارىسىدا ياشاپ، باشقا يېتىلگەن سالجالارنى ۋە ئۇنىڭ بالىلىرىنى تۇتۇپ يەيدۇ. تۇخۇمنى يىمەيدۇ، قىزىل ئۆمۈچۈك-نىڭ بەك يامراپ كېتىشىنى چەكلەشتە ناھايىتى چوڭ رول ئوينايدۇ.

قارغۇ سالجىنىڭ يېتىلگەنلىرىمۇ، بالىلىرىمۇ قىزىل ئۆمۈچۈك، قاسراقلىق قۇرۇت، توزاڭ پىتى ۋە ئۆسۈملۈك شىرنىسى، چېڭى بىلەن ئوزۇقلىنىدۇ. 25~28°C لۇق مۇۋاپىق تېمپېراتۇرا شارائىتىدا 5~7 كۈندە بىر ئەۋلات قالدۇرىدۇ. كۈزنىڭ ئاخىر-لىرىدا قىشلاش ئۈچۈن دەرەخ قوۋزىغىنىڭ قېتىغا كىرىۋالىدۇ. چىلى كىچىك ئۆسۈملۈك سالجىسى (45-رەسىمىنىڭ 2-سى) نى جياڭسۇ يېزا ئىگىلىك ئىنستىتۇتى 1976-يىلى چىلدەن ئېلىپ كەلگەن. ئوزۇقلاندۇرۇپ كۈزىتىشكە ئاساسلانغاندا، تۇخۇمدىن تارتىپ يېتىلگەن ھاشارەتكە ئايلانغىچە بولغان راۋاجلىنىش ۋاقتى 4~6 كۈن ئەتراپىدا بولىدىكەن. يېتىلگەن سالجا بولۇش مەزگىلى 25 كۈن بولىدىكەن. 20°C لۇق تېمپېراتۇرا شارائىتىدا بىر ئەۋلادنى يېتىشتۈرۈش ئۈچۈن 6 كۈنچە ۋاقىت لازىم بولىدىكەن، 29°C لۇق تېمپېراتۇرا شارائىتىدا 9

كۈن ۋاقتى كىتىدىكەن، كېۋەز قىزىل ئۆمۈچۈگىنىڭ يېتىلىشى بىلەن سېلىنىشۇرغادا 1.7 ھەسسە تېز بولىدىكەن. جۈپلىشىش ۋاقتى 2 سائەتكە بېتىدىكەن. جۈپلىشىپ 2 كۈندىن كېيىنلا بۇخۇملاشقا باشلايدىكەن، 3- كۈندىن ئېتىۋارەن كۆپلەپ نۇغۇسقا باشلايدىكەن. نۇخۇمنى يوپۇرماقنىڭ ئارقا يۈزىدىكى بومۇرىنىڭ ئىككى بېنىغا، كۋەزدە بولىدىغان قىزىل ئۆمۈچۈك نوردىنىڭ ئۈستىگە ياكى يوپۇرماقنىڭ ئويما يېرىگە تارقاتى ھالدا ئوتتۇرا ھىساپ بىلەن ھەر كۈنى 1.5 نى، جەمئىي 40 نى تۇغىدىكەن. كۆپ تۇققان كۈنلىرى 3~5 نى تۇغىدىكەن. تۇغىدىغاندىن 20 كۈندىن كۆپرەك داۋاملىشىدىكەن. بالىلىرى بۇخۇمدىن چىققاندىن كېيىن كۋەز قىزىل ئۆمۈچۈگىنىڭ بالىلىرىنى ۋە نۇخۇمىنى ئىشتىھاسى بىلەن يەيدىكەن. بېتىلگەنلىرىنى بېتىلگەن قىزىل ئۆمۈچۈك ۋە ئۇششاق قىزىل ئۆمۈچۈك بىلەن ئوزۇقلىنىدىكەن. ئۆيدە ئۆستۈرۈش قاچىسىدا باققاندا پايدىلىق ئۆمۈچۈك بىلەن زىيانلىق ئۆمۈچۈكنىڭ سانىنىڭ سېلىنىشۇرمىسى 150:6 بولغان، 7 كۈندىن كېيىن تۇتۇپ يەيدىغان سالجا 8 ھەسسە كۆپەيگەن، زىيانلىق سالجا %82 ئازايغان، 9 كۈندىن كېيىن، پۈتۈنلەي يوقىتىلغان. ئېتىزلىقتا كېۋەز قىزىل ئۆمۈچۈگى نوپلاشقان كېۋەز تۈپلىرىگە تۇتۇپ يەيدىغان سالجا كۆچۈرۈلسە، بىر كۈندىن كېيىن، ئۇنىڭ %40 ى شۇ ھەرگە ماكانلىشىدىكەن، 7 كۈندىن كېيىن ئۇ 24 ھەسسە كۆپىيىدىكەن. پايدىلىق سالجا بىلەن زىيانلىق سالجا 1:160

لەك-نەسبەت بويىچە كۆچۈرۈلسە، تۇتۇپ ئوزۇقلىنىدىغان سالجا كېۋەزدە بولىدىغان قىزىل ئۆمۈچۈكنى 10 كۈن ئىچىدە يۇتۇپ-لەي يەپ بولىدىكەن. بۇنۇپ ئوزۇقلىنىدىغان سالجىنىڭ كېۋەزىگە كۆچۈرۈلۈشى ئاساسەن ئوزۇقلۇق بىلەن پەرقلىنىدۇ، پايدىلىق سالجا بىلەن رېبانلىق سالجىنىڭ نەسبىتى 1:5 دىن كۆپ بولغان چاغدا، تۇتۇپ ئوزۇقلىنىدىغان سالجا يۆتكىلىشكە باشلايدۇ، 13 كۈندىن كېيىن خوشنا كېۋەز تۈپلىرىدىكى قىزىل ئۆمۈچۈكنى تامامەن يەپ تۈگىتىدۇ.

ئاسراش ۋە پايدىلىنىش دولتىمىردە بەزى مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلار يېقىنقى بىر قانچە يىلدىن بۇيان، بۇ جەھەتتىكى نەتىقىلەر ھەققىدە تەتقىقاتى باشلىۋەتتى، مەسىلەن، گۇاڭدۇڭ ئۆلكىلىك ھاشارەت تەتقىقاتى يۇرتى بىر خىل ئۆسۈملۈكنىڭ دىخماق سالجىسى ئارقىلىق ئاپپىلسۇن قىزىل ئۆمۈچۈگى يوقىتىۋاتىدۇ، ئۇلار ئىككى يىللىق بولغان ئىككى تۈپ ئاپپىلسۇن دەرىخىدە ئۇسك نۇتۇپ ئوزۇقلىنىش ئىقتىدارى كۈزەتكەن، ئۇلار قىزىل ئۆمۈچۈكنى كۆچۈرۈپ، 2~3 كۈندىن كېيىن، ئاندىن ئۆسۈملۈك دىخماق سالجىسىنى كۆچۈرگەن ئىكەن، ئىككىسىنىڭ نەسبىتى 1:4.5 بولۇپ، 5 كۈندىن كېيىن تەكشۈرسە، سېلىش-مۇرما نەسبىتىدە، قىزىل ئۆمۈچۈكنىڭ لىچىكىسى، ياش قۇرۇنى ۋە يېتىلگىنى 84% ئازىيىپتۇ، 10 كۈندىن كېيىن 90% ئازىيىپ-ئۆتۈپ بېرىپ قىلىنغان تۈپىدىكى قىزىل ئۆمۈچۈككە تۇخۇم-دىس بالىلىرىنىڭ چىقىش نەسبىتى 16.6% بولۇپتۇ، سېلىشتۇرما

نىسبىتى بولسا %80.9 بولۇپمۇ. دىمەك، بۇنىڭدىن دىھماق
 سالخنىك ئاپىلسۇن فىزىل ئۆمۈچۈگىنى سان جەھەتتىن خەك-
 لەشە بەلگىلىك رول ئوبايىدىغانلىغىنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ.
 شىۋىنىسبە تۇتۇپ ئوزۇقلىنىدىغان سالخنى كۆپەيتىدىغان
 زاۋۇت قۇرۇپ، بارنىكتىكى فىزىل ئۆمۈچۈگىنى يوقاتماقتا، ھەر
 يىلى كۆپەيگەن تۇتۇپ ئوزۇقلىنىدىغان سالجا مەملىكەت بويىچە
 يېرىم پارنىكتا ئۆسۈرۈلىدىغان كۆكتاتلاردىكى فىزىل ئۆمۈچۈك-
 نى يوقىتىش ئىھتىياخنى فامدىماقتا. ھىندىستاندا، فىزىل
 ئۆمۈچۈك ئاپەت خاراكىترلىق زىيانداش ھاشارەت ھىساپلىنىدۇ.
 بۇنۇب ئوزۇقلىنىدىغان سالجا قويۇپ بېرىلگەن جايلارنىڭ
 ھەممىسىدە فىزىل ئۆمۈچۈك ئاساسەن تۈپىن بوقىتىلغان.
 خەنئەللە، نىك ماتىرىيالغا ئاساسلانغاندا، نۇتۇب ئوزۇقلىنى-
 دىغان سالخنى كۆممە فوناقنىك گۈل چېكىمغا ھەسەل تېمىشى
 ئارقىلىق بېقىپ كۆپەيتكىلى بولىدىكەن.
 بۇنىڭدىن باشقا، تۇتۇپ ئوزۇقلىنىدىغان سالجا ھاك-گۈڭ-
 گۇرۇت ئارىلاشمىسىغا فارىتا بەك سەزگۈر كېلىدۇ، مۆسلىك
 دەرەخنىكى دولانا فىزىل ئۆمۈچۈگىنىك ئالدىنى ئېلىشقا ۋە
 ئۇنى بوقىتىشقا توغرا كەلسە، تۇنۇب ئوزۇقلىنىدىغان سالخنىك
 زەخمەتلىنىشى ۋە ئۆلۈپ كېتىشىنى ئازايتىش ئۈچۈن، ئاخىرقى
 مەزگىلدە باشقا دىخانچىلىق دورىلىرىنى ئىشلىتىش كېرەك.

30. ئۆمۈچۈك

ئۆمۈچۈك دىخانىچىلىققا، ئورمانچىلىققا زىيان بەتكۈزىدىغان ھاشارەتلەرنىڭ مۇھىم كۈشەبىدىسى. ئېتىزلاردا، مۈسلىك دەرمەخلەردە نۇرغۇن ئۆمۈچۈك ياشايدۇ، ھەر مو يەردە ئەڭ كۆپ بولغاندا نەچچە ئون مىڭدىن ئىككى يۈز مىڭغىچە ئۆمۈچۈك بولىدۇ، ئۇ، تۇتۇپ ئوزۇقلىنىدىغان كۈشەندە ھاشارەتلەر ئىچىدە مۇتلەق ئۈستۈنلۈكنى ئىگەللەيدۇ.

ئۆمۈچۈك ئۆمۈچۈك تۈرىدىكىلەر سىنىپىغا، ئۆمۈچۈك ئەترىدەگە كىرىدۇ. تېنى باش - كۆكرەك قىسمىدىن ۋە قوساق قىسمىدىن تەركىپ تاپقان بولۇپ، ئادەتتە بۇ قىسىملىرى ئېنىق ئايرىلىپ تۇرىدۇ. ئادەتتە ئوتتۇرا ھال ۋە كىچىك تىپتا بولىدۇ. قوشۇمچە ئەزاسى 6 جۈپ بولىدۇ، بىرىنچى جۈپى قىسقاچىلىق بولۇپ، ئىلمەكسىمان ياكى ئامبۇرسىمان كېلىدۇ، ئىككىنچى جۈپى سەزگۈ ئەزاسى، ئۈچىنچى جۈپىدىن ئالتىنچى جۈپىگىچە بولغان قوشۇمچە ئەزاسى پۈتى بولۇپ ھىساپلىنىدۇ. قوساق قىسمى بوغۇملارغا بۆلۈنىدۇ ياكى ئېنىق بۆلۈنمەيدۇ، قوساق قىسمى بىلەن باش - كۆكرەك قىسمىنىڭ تۇتاشقان يېرى ئىنچىكە بولىدۇ. قوساق قىسمىنىڭ ئاخىرقى ئۇچىدا يىپەك تارتىدىغان قاپارتما بولىدۇ.

ئېتىزلاردىكى ئۆمۈچۈكنىڭ مۇتلەق زور كۆپچىلىگى،

ئاساسەن، زىيانداش ھاشارەت بىلەن ئوزۇقلىنىدۇ، ئۇنىڭ تۇتۇپ ئوزۇقلىنىش ئۇسۇلى ئىككى خىل بولىدۇ: (1) تور باغ-لىماي ئايلىنىپ يۈرۈپ تۇتۇپ ئوزۇقلىنىدىغان ئۆمۈچۈك، مەسىلەن، بىرتىقۇچ ئۆمۈچۈك، تاقىتاق ئۆمۈچۈك، قىسقىچ ئۆمۈچۈك، ئوغرى ئۆمۈچۈك قاتارلىقلار. (2) تور باغلاپ تۇتۇپ ئوزۇقلىنىدىغان ئۆمۈچۈك. بۇنداق ئۆمۈچۈك تور باغلاش ئارقىلىق زىيانداش ھاشارەتنى تۇتۇپ يەيدۇ، مەسىلەن، ئوتلاق-لاردا بولىدىغان كىچىك قارا ئۆمۈچۈك، سېرىق ئۆمۈچۈك، ئۈزۈم پۇتلۇق ئۆمۈچۈك قاتارلىق ئۆمۈچۈكلەر.

ئۆمۈچۈكنىڭ تۇتۇپ ئوزۇقلىنىش دائىرىسى ناھايىتى كەڭ، ئوزۇقلىنىش مىقدارى كۆپ بولۇپ، ھەر خىل كېپىنەك، پەرۋا-سىلەرنى، ئۇلارنىڭ تۇخۇمىنى، لىجىنىڭسىنى، يوپۇرماق تومۇز قۇرۇتى، ئۇچار پىت، كۆك پىت، فزىل ئۆمۈچۈك قاتارلىقلارنى تۇتۇپ بەىدۇ. ئەمما ئادەتتە ئۆمۈچۈكنىڭ دورىغا قارشى كۈچى بەك ئاجىز بولىدۇ، دورا چېچىلغاندىن كېيىن كۆپىنچە ئۆلۈپ كېتىدۇ، مەسىلەن، شاللىققا 1605، 666 دورىسى چېچىل-غاندىن كېيىن، ئۆمۈچۈك 81% ئازىيىپ كېتىدۇ. دېمەك، ھەر تەرەپلىمە ئۇسۇل ئارقىلىق ئالدىنقى ئېلىش ۋە يوقىتىش خاراكتېرىنى تۈزۈشكە ئۆمۈچۈكنى ئاسراش بىلەن خىمىيىۋى دېھقانچىلىق دورىلىرىنى مۇۋاپىق ئىشلىتىشى ئۆزئارا ماسلاشمۇ-رۇس كىرەك.

ئۆمۈچۈكنىڭ تۈرى ناھاسى كۆپ، دۆلىتىمىزنىڭ جەنۇبىي


رايوليرىدىكى شاللىقلاردا ئېلىپ بېرىلغان نەكشۈرۈشتىن قارىغاندا، ئۇنىڭ 20 ئائىلە، 90 تۈرى بار ئىكەن، كېيىنكى ئائىلە بولسا 9 ئائىلە، 22 تۈرى بار ئىكەن. جياڭسۇنىڭ شال، كېيىنكى كۆممە قوناق، يېشىل ئوغۇت ئېتىزلىرىنى نەكشۈرۈشتە، ئۇنىڭ 7 ئائىلە، 19 تۈرى بارلىقى ئېنىقلانغان.

1. كىچىك ئۆسۈملۈك ئۆمۈچۈڭى

بۇ خېنەن ئۆلكىسىنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى كېۋەز، كۆممە قوناق ۋە مېۋىلىك دەرەخلەرگە تارقالغان بولۇپ، كۆك پىت ۋە كېپىنەك تۈرىدىكىلەرنىڭ لىچىنىكلىرىنى نۇتۇب يەيدۇ.

تاشقى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى چېشىسىنىڭ تېنى 2.8~3.2 مىللىمېتىر، ئەركىگىنىڭ تېنى 2.5~3.2 مىللىمېتىر بولىدۇ. ئەركىگىنىڭ باش، كۆكرەك قىسمى قىزغۇچ قوڭۇر، يۇتى ساقۇق قوڭۇر بولىدۇ، قوساق قىسمى بوز قوڭۇر، قارا فوكۇر بولىدۇ، قويۇق تۈكى بولىدۇ، بەزىلىرىنىڭ دۈمبىسىنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئۇزۇنغا كەتكەن ئىنچىكە، ئاق بىر سىزىق ۋە توغرىسىغا كەتكەن نۇرغۇن يانتۇ سىزىقلار بولىدۇ. بالىلىرىنىڭ رەڭگى بوز قوڭۇر بولىدۇ، تۇخۇم خالىتىسى سوقىچاق، كالىك بولۇپ، سىرتى ئاق يىپەك بىلەن ئورسلىپ تۇرىدۇ. نۇخۇمى شارسىمان بولىدۇ، دەسلەپ تۇققان تۇخۇمى ئاپپاق بولىدۇ. كېيىن سۇس سېرىق بولۇپ فالدۇ (46-رەسىمنىڭ 1-سى).

ياشاش ئادىتى قالدۇرىدىغان ئەۋلادىنىڭ سانى ئېشىق



46-رەسىم ئۆمۈچۈك

1. كىچىك ئۆسۈملۈك ئۆمۈ-
 2. 8 حۈگى (جىنسى) -
 - داغلىق بوغاق فوساق ئۆمۈ-
 3. ئۇزۇن بۇتلۇق پىلتە
- فوساق ئۆمۈچۈك

ئەمەس. نۇخۇم خالتىسىنى كۆمە قوناق، شال ياكى مېۋىلىك دەرەخ- نىڭ يوپۇرماقلىرىنىڭ ئوك يۈرىگە تۇغىدۇ. ئانا ئۆمۈچۈك ھەمىشە تۇخۇم خالتىسىنىڭ قېشىدا مۇھا- پىزە تىجىلىك قىلىپ تۇرىدۇ. تۇخۇمى شارسىمان بولىدۇ، دەسلەپتە تۇققان تۇخۇمى ئاق بولىدۇ، كېيىن سۇس سېرىق بولۇپ قالىدۇ، بىر دانە تۇخۇم خالتىسىنىڭ ئىچىدە 40 نەچچە تۇخۇمى بولىدۇ، ھەر كۈنى 2~4 تۇخۇم خالىنىسى تۇغىدۇ، 4~7 كۈن ئىچىدە تۇخۇمدىن لىچىد- كىسى چىقىدۇ. تۇخۇمدىن دەسلەپ چىققان لىچىنكىسى ئاق بولىدۇ، ھە دىگەندىلا تۇخۇم خالتىسىدىن چىق-

ماي. 1~2 كۈن تۇرۇپ، ئاندىن چىقىپ ئوزۇقلىنىدۇ، رەڭگى قېنىقلىشىدۇ. كۆپىنچە كۆمە قوناق يوپۇرمىغىنىڭ قولىتۇغىدا، ئىچ يوپۇرمىغىنىڭ ئىچىدە ۋە كېۋەزنىڭ يۇمران قىسمىدا شۇنىڭدەك مېۋىلىك دەرەخ يوپۇرمىغىنىڭ ئارىلىقلىرىدا تور باغلايدۇ، ھەر بىر ئورۇندا بىرسلا تۇرىدۇ. يېتىلگەن ئۆمۈچۈك ياكى كىچىك ئۆمۈچۈك بىر نەرسىدىن ئۆرگۈپ كەنسە، يىپەك قۇسۇپ

ساڭگىلاپ تۇرىدۇ، بەزىدە زىرائەتنىڭ شاخ-يوپۇرماقلىرى ئارىسىدا، يوپۇرماقنىڭ يۈزىدە نېپىز قەغەزسىمان، رەتسىز كىچىك تور توقۇيدۇ، ئەمما ئادەتتە توردىن ئايرىلىپ ئايلىنىپ يۈرىدۇ. يېتىلگەنلىرىنىڭ ھەر بىرى ھەر كۈنى 12~25 كۆك پىت يەيدۇ، ئەڭ كۆپ بولغاندا 63 كۆك پىت يەيدۇ، بۇنىڭدىن باشقا، كۆممە قوناق كېيىنىگىنىڭ، ئىككى ئەۋلاتلىق كېيىنەك-نىڭ، غوزا قۇرۇتىنىڭ لىجىنىكىسىنى تۇتۇپ يەيدۇ.

ئاسراش ۋە پايدىلىنىش ئۆمۈچۈك خىمىيىۋى دىخانچىلىق دورىلىرىغا بەك سەزگۈر كېلىدۇ. باشقا زىيانداش ھاشارەتلەر-نىڭ ئالدىنى ئالدىغان ۋە يوقىتىدىغان چاغدا، دىخانچىلىق دورىلىرىنى ئىمكان قەدەر ئاز ئىشلىتىش ياكى ئىشلەتمەسلىك كېرەك.

2. باشقا ئۆمۈچۈكلەر

1. 8 داغلىق يوغان قوساق ئۆمۈچۈك تېنىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 2~3 مىللىمېتىر كېلىدۇ، كۆپىنچىسى سۇس يېشىل ياكى ئاق، سېرىق بولىدۇ. بېشىدا، كۆكرەك قىسمىنىڭ ئارقا بۆلىگىنىڭ چىڭ ئوتتۇرىسىدا ئۇزۇنغا كەتكەن ساغۇچ قوڭۇر داغ بولىدۇ، دۈم-بېسىدە ئۇزۇنسىغا 2 رەت تىزىلغان 4~5 جۈپ قارا داغ بولىدۇ، قوساق قىسمى كۆپىنچە بۇمۇلاق بولىدۇ. يېتىلگەن چىشىنىڭ قوساق قىسمىنىڭ ئۇچىدا شارسىمان ئاق تۇخۇم خالىتىسى بولىدۇ، تۇخۇم خالىتىسىنىڭ پەردىسى نېپىز بولغاچقا، ئۇنىڭ

ئىچىدىكى تۇخۇمنى كۆرگىلى بولىدۇ (46-رەسىمنىڭ 2-سى)،
زىرائەت ئارىسىدا قالايمىقان، غەلۋىرسىمان ياكى تەخسىسىمان
كىچىك نور باغلايدۇ.

2. ئۇزۇن پۇتلۇق پىلتە قوساق ئۆمۈچۈك ئەركىگىنىڭ
خۇى بوغانراق، ئۇزۇنلۇغى 7 مىللىمىتىر بولىدۇ، چىشىسىنىڭ
تېى 8 مىللىمىتىر، رەڭگى ساغۇچ بولىدۇ. ئۈستۈنكى، تۆۋەنكى
ئىككى نە رەققى قىلغان بولىدۇ. قوساق قىسمى ئۇزۇنچاق،
سىلىدىر شەكلىدە بولىدۇ، يىپچە چىقىرىدىغان فاپارتمىسى
قوساق قىسمىنىڭ ئۈچىنىڭ ئاستى تەرىپىگە جايلاشقان بولىدۇ
(46-رەسىمنىڭ 3-سى). زىرائەتنىڭ ياكى مۆسىز، مۈلىك
دەرەخنىڭ ساج-يوپۇرماقلىرى ئارىسىغا نەكشى، بۇمۇلاق تور
باغلاپ، ئۇچۇپ كەلگەن رىيانداش ھاشارەنلەرنى تۇتۇپ
يەيدۇ.

ئىككىنچى باپ

پارازىت ياشايدىغان كۈشەندە ھاشارەتلەر

پارازىت ياشايدىغان كۈشەندە ھاشارەتلەر دىگەندە باشقا زىيانداش ھاشارەتلەرنىڭ تېنىدە پارازىتلاپ، ئۇنىڭ تېنىدىكى سۇيۇقلۇق بىلەن ئوزۇقلىنىپ، زىيانداش ھاشارەتلەرنى ئۆلتۈرىدىغان پارازىت كۈشەندە ھاشارەتلەر كۆزدە تۇتۇلىدۇ. بۇ خىل كۈشەندە ھاشارەتلەرنىڭ تۈرى ناھايىتى كۆپ، ئاساسلىقى پارازىت ھەرە ۋە پارازىت چىۋىدىن ئىبارەت. ھاشارەتچىلىك مۇتەخەسسسلەرنىڭ مۆلچەرلەپ كۆرۈشىچە، پەقەت پەردە قاناتلىقلار ئەترىدىگە كىرىدىغان توقال ھەرە تۈرىدىكى كۈشەندە ھاشارەتلەرلا 1 مىليونغا يېتىدىكەن. بۇ ھازىر بىئولوگىيەلىك ئۇسۇل بىلەن ئالدىنى ئېلىش ۋە يوقىتىشتا ئەڭ كۆپ بايدىلىنىلىۋاتقان، ئۈنۈمى ئەڭ ياخشى پارازىت ھەرە. مەسىلەن، قىزىل كۆزلۈك ھەرە ئارقىلىق تۈكلۈك قارىغاي قۇرۇتى، كۆممە قوناق كېپىنىكى، ئالدىدا بولىدىغان يوبۇرماق پەرۋانىسى قاتارلىق ئورمانچىلىققا، دىخانچىلىققا زىيان بەتكۈزىدىغان ھاشارەتلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى يوقىتىشتا كۆرۈنەرلىك نەتىجە ھاسىل قىلىندى.

پارازىت باشىدىغان كۈشەندە ھاشارەت زىيانداش ھاسارەت- لەرنىڭ يېتىلىشىدىكى ھەرفايىسى مەزگىللەردە، مەسىلەن، تۇخۇم مەزگىلىدە، لىچىنكا (ياش قۇرۇت) مەزگىلىدە قوچاق بولۇش مەزگىلىدە ۋە يېتىلىش مەزگىلىدە پارازىت ياشىيالايدۇ، پارازىت ياشايدىغان كۈشەندە ھاشارەتلەرنىڭ ئادىتىمۇ ناھايىتى مۇرەككەپ بولىدۇ، پارازىت ياشاش ئادىتى تۆۋەندىكىدەك بىرقانچە خىل بولىدۇ.

(1) يەككە پارازىت ياشاش: پارازىت ياشايدىغان بۇ خىل كۈشەندە ھاشارەت پەقەت بىرلا پارازىت خوجايىنى تېنىدە پارازىت ياشايدۇ، مەسىلەن لىخۇ چىرپاشكىسى تۇخۇمى ئادەتتە پەقەت بىرلا تەكشى قوساقلىق كىچىك پارازىت ھەرە تەرىپىدىن پارازىتلىنىدۇ.

(2) ئۆملىشىپ پارازىت ياشاش: بىر پارازىت خوجايىنى شۇ خىلدىكى بىردىن ئارتۇق پارازىت ھاشارەت تەرىپىدىن پارازىتلىنىدۇ، مەسىلەن، قىزىل غوزا قۇرۇتى نۇرغۇنلىغان كىچىك سىرىق ھەرە تەرىپىدىن بىرلا ۋاقىتتا پارازىتلىنىدۇ.

(3) كۆپ خىل ھاشارەتلەرنىڭ بىللە پارازىت ياشاشى: بىر پارازىت خوجايىنى ئىككى خىلدىن ئارتۇق پارازىت ھاشارەت تەرىپىدىن پارازىتلىنىدۇ، مەسىلەن، تۈكلۈك قۇرۇتى لىچىنكىسى ئورمانلىقتا كۆپ خىل پارازىت ھەرە تەرىپىدىن پارازىتلىنىدۇ.

(4) تەكرار پارازىتلىنىش: بىر خىل پارازىت خوجايىنى

يەنە بىر خىل پارازىت ھاشارەت تەرىپىدىن پارازىتلىنىدۇ، لېكىن بۇ خىل پارازىت ھاشارەت يەنە بىر خىل پارازىت ھاشارەت تەرىپىدىن پارازىتلىنىدۇ، بۇنداق ھادىسە تەكرار پارازىتلىنىش دەپ ئاتىلىدۇ. بىرىنچى قېتىم پارازىتلىنىش باشلانغۇچ پارازىتلىنىش ياكى بىر قېتىم پارازىتلىنىش دەپ ئاتىلىدۇ. ئىككىنچى قېتىم پارازىتلىنىش ئىككى قېتىم پارازىتلىنىش دەپ ئاتىلىدۇ. ئىككىنچى قېتىم پارازىتلىنىش ھاشارەت ئۈچۈنچى قېتىم پارازىت ھاشارەت تەرىپىدىن پارازىتلىنىش، بۇ ئۈچ قېتىم پارازىتلىنىش ياكى كۆپ قېتىم پارازىتلىنىش دەپ ئاتىلىدۇ.

(5) تەن سىرتىدا پارازىتلاش: بىر خىل پارازىت ھاشارەت پارازىت خوجايىنىنىڭ تېنى سىرتىدا تۇرۇپ ئوزۇقلىنىدۇ. مەسىلەن، كېۋەز پىتىنىڭ تېنىدە پارازىت سالىجىدىسى بىرقانچىسى ھەتتا بىرقانچە ئونى پارازىتلايدۇ.

(6) تەن ئىچىدە پارازىتلاش: بۇنداق پارازىت ھاشارەت ئۆزىنىڭ تۇخۇمىنى پارازىت خوجايىنىنىڭ تېنى ئىچىگە تۇغىدۇ، لېچىنكىسى تۇخۇمدىن چىققاندىن كېيىن پارازىت خوجايىنىنىڭ تېنىدە تۇرۇپ ئوزۇقلىنىدۇ، ئۇنىڭ يېتىلىش جەريانىدا، پارازىت خوجايىنى ئاستا-ئاستا ئۆلىدۇ. بەزىلىرى پارازىت خوجايىنىنى ئاۋال ئۆلتۈرۈپ، ئاندىن ئۇنىڭ تېنىدە داۋاملىق ئوزۇقلىنىپ يېتىلىدۇ. بەزىلىرى پارازىت خوجايىنىنىڭ تېنى سىرتىغا تۇخۇم تۇغىدۇ، لېچىنكىسى تۇخۇمدىن چىققاندىن كېيىن پارازىت خوجايىنىنىڭ تېنىگە تېشىپ كىرىپ ئوزۇقلىنىپ، پارازىت خوجا-

بىسىنى ئۆلنۈرىدۇ.

(7) ئۆز نۈرىدىكىلەرنىڭ تېنىدە بارازىتىلاش: بىر خىل بارازىت ھاشارەت ئۆز نۈرىدىكى ھاشارەتنىڭ تېنىدە بارىرىتلايدۇ.

1. پارازىت ھەرىلەر

پارازىت ھەرىلەر باشقا ھاشارەتلەرنىڭ تېنىدە بارازىتلايدىغان ھەرىلەردۇر. ئۇلار سئولوگىيىلىك ئالدىنى ئېلىش-يوقىتىش جەھەتتە ھاشارەتى ھاشارەت ئارقىلىق يوقىتىشتا خېلى كەڭ قوللىنىلىۋاتقان، كۆرۈنەرلىك ئۈنۈم بېرىدىغان مۇھىم كۈشەندە ھاشارەت. مەسىلەن، قىزىل كۆزلۈك ھەرە ئارقىلىق كۆمە قوباقى كېيىنكى، ئالىمدا بولىدىغان يوپۇرماق پەرۋانىسى، تۈكلۈك قارىغاي قۇرۇتى فاتارلىقلارنى يوقىتىشتا ياخشى ئۈنۈم ھاسىل قىلىنىۋاتىدۇ، بەزى جايلار بۇ ئۇسۇلنى كەڭ كۆلەمدە قوللىنىپ ئومۇملاشتۇرۇۋاتىدۇ. بەزى جايلار سۈنئىي كۆپەيتىشتىن ئاپوماتلاشقان زاۋۇتتا ئىشلەپچىقىرىشقا ئۆتتى.

پارازىت ھەرىلەرنىڭ تۈرى ناھايىتى كۆپ، ھازىرغىچە مەلۇم بولغان بۇرى 15 مىڭ خىلدىن ئاشىدۇ، بۇلارنىڭ پارازىت ياشاش ئادەتلىرىمۇ ئوخشاش ئەمەس. بەزى پارازىت ھەرىلەر تۇخۇمىنى باشقا ھاشارەتلەرنىڭ تۇخۇمى ئىچىگە تۇغىدۇ، لېكىن كىسى تۇخۇمىدىن چىققاندىن كېيىن، شۇ تۇخۇم ئىچىدىكى

ئوزۇقلۇق ماددىلار بىلەن ئوزۇقلىنىدۇ ھەمدە شۇ تۇخۇمنىڭ ئىچىدە يېتىلىپ چوڭ بولىدۇ، ئاندىن كېيىن تۇخۇمنى بېرىنجى چىقىپ، يەنە باشقىدىن پارازىتلايدۇ. بەزى پارازىت ھەرىكلەر باشقا ھاشارەتلەرنىڭ لىچىنكىسى ياكى فوچىغىغا تۇخۇم تۇغىدۇ، لىچىنكىسى تۇخۇمدىن چىققاندىن كېيىن شۇ ئورگانىزىمدا ئوزۇقلىنىدۇ. پارازىتلانغان لىچىنكا ئۆزىنىڭ ئىچكى ئەزالىرىنىڭ پارازىت ھەرىكەت تەرىپىدىن يېمىلىپ بېرىشىغا ئەگىشىپ ئاستا-ئاستا قورۇلۇپ، كىچىكلەپ ئۆلىدۇ. پارازىت ھەرىكىنىڭ لىچىنكىسى بولسا يېتىلگەندىن كېيىن ئۇنىڭ تېنىنى تېشىپ چىقىدۇ ياكى پارازىتلانغان ئورگانىزىم ئىچىدە تۇرۇپ غوزەك ھاسىل قىلىپ فوچاققا ئايلىنىدۇ، كېيىنەككە ئايلىنغاندىن كېيىن ئۇچۇپ چىقىدۇ. بەزىدە پارازىتلانغان لىچىنكا بۇرۇنقىدەكلا نورمال فوچاققا ئايلىنىشىمۇ، لېكىن پارازىت ھەرىكىنىڭ ئوزۇقلىنىشى نەتىجىسىدە قۇرۇپ قېتىپ قالىدۇ. دە، قوسىغىنى مىدىرلىتالمايدۇ. پارازىت ھەرىكىنىڭ لىچىنكىسى قوڭغۇز ۋە باشقا يېتىلگەن ھاشارەتلەرنىڭ تېنىنى تېشىپ چىققاندىن كېيىن، ئاندىن ئۇ ھاشارەتلەر ئۆلىدۇ. پارازىتلانغانلىقى تۇخۇم، لىچىنكا، فوچاق يېرىم يولدا ئۆلىدۇ.

پارازىت ھەرىكىنىڭ كۆپ ساندىكىلىرى گۈل چېكى ۋە گۈل شېرىسى بىلەن فوسۇمچە ئوزۇقلىنىدۇ. ئەمما ھەرە تۈرىدىكىلەر، نىڭ بەزىلىرى خۇسۇسەن ئۇششاق ھەرىكلەر پەيدا بولغان چاغدىلا نۇخۇممۇ يېتىلگەن بولىدۇ، شۇڭا ئۇلار ئورۇققا زادىلا

مۇھتاج ئەمەس، ئازغىنە شەبنەم سۈيى ئىچسىلا بولىدۇ، چوڭ پارازىت ھەرلەر پارازىت خوجايىنىنىڭ تېنىگە ئادەتتە پەقەت بىرلا تۇخۇم تۇغىدۇ، كىچىكرەك پارازىت ھەرلەر بولسا بىرنەچچە تۇخۇم تۇغىدۇ، شۇڭا بىر ھاشارەتنىڭ تېنىدە پارازىت ھەرىنىڭ بىرقانچە ياكى خېلى كۆپ لىچىنكىسى بېتىلىدۇ. ئەمما يەنە بەزى پارازىت ھەرلەر گەرچە پارازىت خوجايىنىنىڭ تېنىگە بىرلا تۇخۇم تۇققان بىلەن، بۇ تۇخۇم ئۆز ئۆزىدىكى بۆلۈنۈپ، نۇرغۇنلىغان يېڭى مۇستەقىل بەككە تەنچە ھاسىل قىلىپ، نۇرغۇنلىغان ئەۋلات بولۇپ بېتىلىدۇ.


1. قىزىل كۆزلۈك ھەرە

قىزىل كۆزلۈك ھەرە بىئولوگىيەلىك ئۇسۇل بىلەن ئالدىنى ئېلىش - يوقىتىشقا خېلى كەڭ تۈردە پايدىلىنىلىۋاتقان، كۆرۈ-نەرلىك ئۈنۈم بېرىدىغان بىر خىل تۇخۇم پارازىت ھەرىسى. ئۇلار زىيانداش ھاشارەتلەرنى تېخى تۇخۇمدىن چىقىمىغان، زىيان يەتكۈزۈمگەن جاغدىلا يوقىتىلىدۇ، مەملىكىتىمىزدە كۆممە قوناق كېپىنىڭ، تۈكلۈك قارىغاي قۇرۇتى، شېكەر قومۇچى كېپىنىڭ، ئالىدا بولىدىغان يوپۇرماق پەرۋاسى، شال كېپىنىڭ، كېۋەزدە بولىدىغان قىزىل كۆسەك قۇرۇتى، پۇرچاق كېپىنىڭ قاتارلىق زىيانداش ھاشارەتلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى يوقىتىشقا ناھايىتى ياخشى ئۈنۈم ھاسىل قىلىندى. ئەسلىدە قىزىل كۆزلۈك ھەرىنى كىچىك دائىرىدە - ئۆيدە سۈنئى ھالدا

كۆپەيتىش ئۇسۇلى قوللىنىلىپ كەلگەن ئىدى، ئەمدىلىكتە كەڭ دائىرىدە — دالدا تېر ئاۋۇتۇشنىڭ، تارفاق تۇخۇملىتىپ ئاۋۇد تۇشنىڭ، بەلگىلەنگەن نۇقتىلارغا تۇخۇملىتىشنىڭ، تۇخۇملىرىنى خىمىيىۋى ئۇسۇل بىلەن ئاسراشنىڭ يېڭى ھۈنەر-سەنئىتى، يېڭى تېخنىكىسى بارلىققا كەلدى، نەتىجىدە، زىيانداش ھاشا-رەتلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى يوقىتىش ئۇسۇلى يېڭى سەۋىيىگە كۆتۈرۈلدى، شۇنداق قىلىپ، بۇ ئۇسۇلنى كۆپ، تېز، ياخشى، تېجەشلىك ھالدا كەڭ كۆلەمدە كېڭەيتىپ قوللىنىش مۇمكىن بولدى، ئەمما قانداق قىلىپ پارازىت خوجايىنىنىڭ تۇخۇمى بىلەن تولۇق تەمىنلەش جىددى ھەل قىلىشقا تېگىشلىك بىر مەسىلە بولۇپ تۇرماقتا. بەزى ئورۇنلار سۈنئىي تۇخۇم ياساشنى تەتقىق قىلىۋاتىدۇ، ئەگەر بۇ ئۆتكەلدىن ئۆتۈۋېلىنسا، قىزىل كۆزلۈك ھەرىدىن كەڭ كۆلەمدە پايدىلىنىشنىڭ دائىرىسى تېخىمۇ كېڭىيىدۇ.

تاشقى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى بېتىلگەنلىرىنىڭ جۇغى
بەك كىچىك، ئۇزۇنلۇقى تەخمىنەن 0.3~1.0 مىللىمېتىر بولۇپ، رەڭگى ساغۇچ قوڭۇر كىلىدۇ، پارقراپ تۇرىدۇ. قوچىغىنىڭ ۋە يېتىلگىنىنىڭ مۇرەككەپ كۆزىمۇ، ئاددىي كۆزىمۇ قىزىل بولىدۇ، شۇڭا قىزىل كۆزلۈك ھەرە دەپ ئاتىلىدۇ. قاننى سۈزۈك بولىدۇ، ئالدى قاننى چوڭ، ئارقا قاننى كىچىك، فانات تومۇرى سىرىق بولىدۇ. قاننىنىڭ چۆرىسىدە ئىنچىكە ئۇزۇن پۆيەكسىمان تۈك بولىدۇ. ئادەتتە ئۇنىڭ تۆۋەندىكى بىر قانچە خېلى كۆپ.

رەك ئۇچرايدۇ، يېتىلگەنلىرىنىڭ تاشقى كۆرۈنۈشى مۇنداق:
 كۆممە قوناق كېپىنىڭ قىزىل كۆزلۈك سېرىق ھەرىسى:
 تېنى سېرىق، دۇلىسى ۋە قوساق قىسمى قوڭۇر بولىدۇ. چىش-
 سىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 0.43~0.56 مىللىمېتىر، ئەركىنىڭ ئۇزۇنلۇقى
 0.35~0.42 مىللىمېتىر بولىدۇ. كۆممە قوناق كېپىنىڭ شال
 كېپىنىڭ ۋە ئىككى ئەۋلاتلىق كېپىنەكلەردە پارازىت ياشايدۇ
 (47-رەسىمنىڭ 4-سى).



چوڭ قىزىل كۆزلۈك ھەرە:
 كۆكرىكى ساغۇچ، قوساق قىسمى
 قوڭۇر، يول-يول سىزىق بىلەن
 چۆرىدەلگەن بولىدۇ، كەسكەك،
 كاپۇستا پەرۋانىسى، كاپۇستا
 كېپىنىڭ، پەرۋانە، كېپىنەك
 قۇرۇتى، ئالما قۇرۇتى، قاتارلىقلاردا
 پارازىت ياشايدۇ (47-رەسىمنىڭ

47-رەسىم قىزىل كۆزلۈك ھەرە

2-سى).

1. تۈكلۈك قارىغاي قۇرۇتنىڭ قىزىل كۆزلۈك ھەرىسى
2. چوڭ قىزىل كۆزلۈك ھەرە
3. شال كېپىنىڭ قىزىل كۆزلۈك ھەرىسى
4. كۆممە قوناق كېپىنىڭ قىزىل كۆزلۈك ھەرىسى

تۈكلۈك قارىغاي قۇرۇتنىڭ قىزىل كۆزلۈك ھەرىسى: رەڭگى سېرىق،
 ئۇزۇنلۇقى 0.4~0.7 مىللىمېتىر بولىدۇ.
 تۈكلۈك قارىغاي قۇرۇتى، شال كېپىنىڭ قاتارلىقلاردا پارازىت ياشايدۇ (47-رەسىمنىڭ

1-سى).

شال كېيىنىڭ قىزىل كۆزلۈك ھەرىسى: رەڭگى ئال قوڭۇر بولىدۇ. ئەركىگىنىڭ ئالدى قاننىدا رەتلىك تىزىلغان تۈك بولىدۇ، قاننىنىڭ قىرغىدا ئۇزۇن تۈكلەر بولىدۇ. شال كېيىنىگە پارازىت ياشايدۇ (47-رەسىمنىڭ 3-سى).

قولۇق پەرۋانسىنىڭ قىزىل كۆزلۈك ھەرىسى: رەڭگى سېرىق بولۇپ، ئاق تېرەكنىڭ قولۇقاسمان بەرۋانسى، قوش قۇيرۇقلۇق قولۇقاسمان پەرۋانە، تېرەكنىڭ قوڭۇر رەڭلىك كىچىك قولۇقاسمان پەرۋانسى، تېرەكتە بولىدىغان سېرىق يوپۇرماق كېيىنىڭ قاتارلىقلاردا پارازىت ياشايدۇ.

ياشاش ئادىتى قىزىل كۆزلۈك پارازىت ھەرە تۇخۇم، لىجىنكا، قوجاقتىن ئىبارەت 3 دەۋرنى پۈتۈسلەي پارازىت خوجايىنىنىڭ تۇخۇمى ئىچىدە ئۆتكۈزىدۇ. سۈسۈ يېرىمدا كونتۇرول قىلىنغان شارائىتتا، ھەر يىلى تەخمىنەن 50 ئەۋلات قالىدۇرىدۇ. شىمالىي تەرەپتە ھەر يىلى 12~15 ئەۋلات قالدۇرىدۇ، ھەر بىر ئەۋلادىنىڭ ۋاقتى 6~30 كۈن بولىدۇ. ئادەتتە قىزىل كۆزلۈك ھەرە جۈپلىشىپ كۆپىيىدۇ. لېكىن چىشى جۈپلەشمەيمۇ ئەۋلات قالدۇرالايدۇ.

شىمالىي رايونلارنىڭ تەبىئى شارائىتىدا، ئادەتتە قىزىل كۆزلۈك ھەرە پارازىت خوجايىنىنىڭ تۇخۇمى ئىچىدە تەييارلىق قوغداي ھالىتىدە قىشلىنىدۇ. كىيىنكى يىلى باھاردا بېتىلىپ چىقىپ، جۈپلىشىپ نۇخۇم تۇغىدۇ. تۇخۇملايدىغان چاغدا،

چىشى ئالدى بىلەن سەزگۈ بۇرۇتى ئارقىلىق ھاشارەت تۇخۇ-
مىنى چېكىپ، ئۇنىڭ ئەتراپىنى بىر دەم ئايلىنىپ بۇرۇپ، ئاندىن
ئۇنىڭ ئۈستىگە چىقىپ قوسغىنىڭ ئۇچىنى كۆپ قېتىم
تۇخۇم تۇغدىغاندەك قىلىپ سىناپ كۆرىدۇ، شۇنىڭدىن كېيىن
تۇخۇم تۇغىدۇ. قىزىل كۆزلۈك ھەرە تۇققانلىكى تۇخۇم باردى.
دەپ كېلىدۇ. تەخمىنەن 10 كۈندىن كېيىن بالىسى يېتىلىپ
تۇخۇمنى يېرىپ چىقىدۇ، يېتىلگىنى نۇرغا ئىنتىلىدۇ، سامالنىڭ
نەسىرىگە بەكرەك ئۇچرايدۇ. تۇخۇمنىڭ سابى شۇ ھەرلەرنىڭ
تۈرىگە قاراپ ئوخشاش بولمايدۇ، ئادەتتە 10 نەچچىدىن ئارتۇق
100 نەچچىگىچە بولىدۇ.

ئاسراش ۋە پايدىلىنىش قىزىل كۆزلۈك ھەرىنىڭ نەسى
شارائىتىكى سانى ھامان زىيانداش ھاشارەت سانىنىڭ ئۆزگىرىد-
شىگە قاراپ بۇقۇرى ئۆرلەيدۇ ياكى تۆۋەنلەيدۇ. تەبىئىي سارا-
ئىتنىڭ چەكلىمىسى تۈپەيلىدىن، زىيانداش ھاشارەتنى يوقىتىش
مەقسىدىگە يەتكىلى بولمايدۇ. شۇڭا، سۈنئىي ياردەم ئارقىلىق
قىزىل كۆزلۈك ھەرىنىڭ سانىنى زىيانداش ھاشارەت سانىدىن
بالدۇر ئاسۇرۇۋېتىش كېرەك. بۇنداق قىلىش ئۈچۈن، سۈنئىي
ھالدا كۆپەيىنىپ قوبۇپ بېرىشكە توغرا كېلىدۇ. ھازىر ئاساسەن
تۆۋەندىكى 4 خىل ئۇسۇل قوللىنىلماقتا:

(1) كۆز پەسلىدە يىغىش: كۆز پەسلىدە ئېتىزلاردىن، ئور-
مانلىقتىن، مۆبلىك دەرەختىن بارزىت خوجايىنىنىڭ تۇخۇمىنى
بىغىپ كېلىپ، ئۇنى كۆپەيىسى ئۈچۈن ئىشلىتىلىدىغان ئانا

ھەرىنىڭ باشلانغۇچ تۈرى قىلىش، ياكى پارازىت خوجايىنىنىڭ يېڭى نۇخۇمنى تۇخۇم تەۋەكىگە سېلىپ ھەرە ئەك كۆپ بولۇپ دىغان ئېتىز، مۈبلىك دەرەخ ۋە ئورمانلىققا ئېسىپ قويۇش، بەزىدە تۇخۇمنى يوپۇرماققا يېپىشىۋرۇپ، ھەرىنى پارازىتلاشقا ھەلپ قىلىش، بىرفانچە كۈندىن كېيىن، پارازىت خوجايىنىنىڭ تۇخۇمنى يىغىۋېلىش لازىم. ئۆيدە مۇشۇنداق بىرفانچە ئەولات كۆپەيتكەندە، ئۇنى ساقلاب قىشلاشقا بولىدۇ.

(2) قىشتا ساقلاش: قىزىل كۆزلۈك ھەرە ئادەتتە 10°C تىن تۆۋەن تېمپېراتۇرىدا بېتىلىشىنى توخايدۇ، لېكىنكىسى ئوتتۇرا مەزگىلدە، ئاخىرقى مەزگىلدە 4°C - 1°C لۇق شارائىتتا سوغاق ساقلانسا، ئۇنىڭ ئۈنۈمى ياخشى بولىدۇ. خېسەن ئۆلكىسىدە ئۆيىنىڭ سىرتىدىكى نەسكەي جايىنىڭ تېمپېراتۇرىسى ئادەتتە 11 - ئايىنىڭ ئوتتۇرىلىرىدىن 3 - ئايىنىڭ باسلىرىغىچە بولغان ئارىلىقتا 10°C تىن تۆۋەن بولىدۇ، شۇڭا، ھەرىنى 11 - ئايىنىڭ ئوتتۇرىلىرىغىچە كۆپەيتكىلى بولىدۇ، ھەرە تەۋەكىنى سۇلياۋ خالىتىغا قاچىلاپ، پاخال بىلەن بۆگەپ، سىرتىدىكى تەسكەي جايىدا قويۇلغان رۇجەكلىك ساندۇققا سېلىپ، 160 كۈن ساقلاپ، ئىككىنچى يىلى باھاردا يەنە كۆپەيتسە بولىدۇ. ساقلانغان ئۇرۇقلۇق ھەرىسى 1 - ئابدا بىر قېتىم كۆپەيتىۋېلىپ، يەنە داۋاملىق ساقلانمۇ بولىدۇ.

(3) ئەتىيازدا كۆپەيتىش: ئالدىنى ئالدىغان، يوقىتىدىغان ئوبېكتقا ئاساسەن، ئەتىيازدا تازا كۆپەيتىپ، ئېھتىياجلىق سان-

غىچە توپلاپ بەلگىلىك مۇددەت بويىچە قويۇپ بېرىش لازىم.

(4) يازدا قويۇپ بېرىش: ھەرە قويۇپ بېرىدىغان ۋاقىت زىيانداش ھاشارەت چىقىدىغان ۋاقىتقا قاراپ بەلگىلىنىدۇ. ئادەتتە، ئېتىزدىكى ھاشارەت نۇخۇمى كۆپىيىشكە باشلىغاندا، بىرىنچى تۈركۈم ھەرە قويۇپ بېرىلىدۇ، تۇخۇم تازا كۆپىيىشكە باشلىغان ۋاقىتتىن تارتىپ ئاھرىلىشىغا باشلىغان ۋاقىتقىچە بولغان ئارىلىقتا كۆپلەپ قويۇپ بېرىلىدۇ. قىزىل كۆزلۈك ھەرەنىڭ ھەركەتلىنىش ئىقتىدارىغا ئاساسەن، نۇقتىلاردىن ئومۇمىي دائىرىگە يۇمۇلاق شەكىلدە تارقىتىلىدۇ، ئۈنۈملۈك رادىئوسى 17 مېتىر بولغاندا، 10 مېتىر دائىرە ئىچىدە ھەرىنىڭ باراۋەتلاش نىسبىتى ئەڭ يۇقىرى بولىدۇ. شۇنداقلا ئىتىزدا ھەرىنى ئۇچ بۇرچەكلىك نۇقتا بويىچە قويۇپ بېرىش خىلى مۇۋاپىق بولىدۇ. ھەرە ھەركەتلىنىدىغان دائىرىنىڭ رادىئوسىنى 10 مېتىر دەپ ھىساپلىغاندا، ھەر بىر نۇقتىدىكى تارقىلىش كۆلىمى 314m^2 بولىدۇ. كەڭ كۆلەملىك بەرلەر بويىچە ھەرە قويۇپ بېرىشتە ھەر مو بەرگە 2.5 نۇقتا ئورۇنلاشتۇرۇلسلا بولىدۇ، ھەرە قويۇپ بېرىش سۈپىتىنى يۇقىرى كۆتىرىش ئۈچۈن، ئادەتتە ھەر مو بەرگە 4~5 نۇقتا ئورۇنلاشتۇرۇلىدۇ. بىر خىل زىيانداش ھاشارەتنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى يوقىتىش ئۈچۈن، ئادەتتە 3~5 فېتىم قويۇپ بېرىلىدۇ. ھەر بىر ۋەتتە 10,000~15,000 دانە قويۇپ بېرىلىدۇ. قويۇپ بېرىش ئۇسۇلى ھەر خىل بولىدۇ. ھەزىدە تۇخۇم نەۋىگىنى بامبۇك نەخسى ئىچىگە سېلىپ،

ئاعزىنى سۇلياۋ يىپ بىلەن جىگىپ، دەرەخ شېخىغا ياكى ياغاچقا باغلاپ قوبىسىمۇ بولىدۇ. بەزىدە نۇخۇم تەۋىكىسى ئۈزۈن پارچە فىلىپ يىرتىپ، دەرەخنىڭ باكىسى زىرائەتنىڭ بونۇرمىغا يۆگەپ، ئاندىن يىڭنە بىلەن ئىلىپ قوبىسىمۇ بولىدۇ. ھەرە قويۇپ بېرىدىغان چاغدا، قويۇپ بېرىلىدىغان رايوننىڭ 100~200 مېتىر سىرتىدا سېلىشتۇرما رايون بەرپا فىلىس باكى ئوتتۇرىدىن 50 مۇچە يەرنى قالدۇرۇپ، سېلىشتۇرما رايون قىلىش لازىم. ئادەتتە ھەرە قويۇپ بېرىلىپ 7 كۈندىن كېيىن، ھەرە قويۇپ بېرىلگەن رايون بىلەن سېلىشتۇرما رايوندا تۇخۇمنىڭ پارازىتلىنىش نىسبىتى تەكشۈرۈلۈپ، ئۈنۈمى ھىساپلاپ چىقىدۇ. (پارازىتلانغان تۇخۇمنىڭ ھەممىسى قاراغان بولىدۇ). بەزىدە، بارازىت خوجايىنىنىڭ تۇخۇمى تارقاق بولغاچقا، ئاسان تەكشۈرگىلى بولمايدۇ، بوندىق ئەھۋال ئاستىدا ھەرە قويۇپ بېرىشنىڭ نەتىجىسىنى ھەرە قويۇپ بېرىلگەن رايون بىلەن سېلىشتۇرما رايوندىكى ئاسراپ قىلىنغان مايىسنىڭ ياكى ئاسراپ قىلىنغان مۇننىڭ نىسبىتىنى شۇنىڭدەك مەھسۇلاتنىڭ مىقدارىنى سېلىشتۈرۈش ئارقىلىق مۇئەييەنلەشتۈرسىمۇ بولىدۇ.

بۇنىڭدىن باشقا، شۇنى كۆرسىتىپ ئۆتۈش كېرەككى، خىمىد-يېنى دىخانىچىلىق دورىلىرى قىزىل كۆزلۈك ھەرىسى ناھايىتى زور دەرىجىدە ئۆلتۈرىدۇ. شۇڭا، خىمىبىۋى دىخانىچىلىق دورىلىرىنى مۇۋاپىق ئىشلىتىپ، دورا چېچىش نىجىنىكىسىنى ياخشىلاپ، ھەر تەرەپلىمە ئالدىنى ئېلىش ۋە يوقىتىش ئۇسۇلىنى

فوللىسىپ. كۇسەندە ھاسارەتلەرنىڭ زەھمىلىسىدىن مۇمكىن ھەدەر ساقلىنىش لارىم.

2. كىچىك سېرىق ھەرە

كىچىك سېرىق ھەرە دەسلەپ 1955-يىلى خۇبېي ئۆلكىسىدە- سىڭ وۇھاڭ دېگەن يېرىدىن تېپىلغان. بۇ ھەرە ئارقىلىق باھادا ئىسكىلاندا مېشلايدىغان فىزىل كۆسەك قۇرۇتتىڭ ئالدىنى ئىلىش ۋە ئۇنى يوقىتىش نەھرىيىسى 1960-يىلىدىن باشلاپ پۈتۈن مەملىكەت مېقباسىدا كىمكەيتىلگەن. كىچىك سېرىق ھەرە ئارقىلىق فىزىل كۆسەك قۇرۇتتىنى يوقىتىش ۋە ئۇنىڭ ئالدىنى ئىلىش ئىشى ئېلىپ بېرىلغان داخنا ئىسكىلاتىنىڭ ئەتراپىدىكى ھايلاردا كۈز چىڭگىسك زىيانغا ئۇچرىشى %75 ئازايغان. 10 نەچچە يىلدىن بۇيان، بۇ خىل ھەرە 10 نەچچە ئۆلكە، شەھەردە ئىشقا سېلىنىپ، فىزىل كۆسەك قۇرۇتتىنى چەكلەشتە كۆرۈنەرلىك رول ئوينىدى.

تاشقى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى بېتىلگىنى كۆكۈش قارا بولىدۇ، بارقراپ بۇرىدۇ. بېنىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 2.5 مىللىمېتىر بولىدۇ. ئەركىگىنىڭ قوساق قىسمىنىڭ 1-بوغۇمى بىلەن 2-بوغۇمىنىڭ ئارىلىقى سېرىق بولىدۇ. نۇخۇمىنىڭ شەكلى پىددە-گەسىمان. رەڭگى ئاق بولىدۇ. لىھنىكىسى جىۋىس قۇرۇنى شەكلىدە، قوجى ئاچ سېرىق بولىدۇ (48-رەسىم).

باشاش ئادىتى ھەر يىلى 11~12 ئەۋلاد قالدۇرىدۇ



48-رەسەم كىچىك

سېرىق ھەرە

1. ئىسلىگىنى 2. لىجىنكىسى
 3. ئىسلىگىنىنىڭ قىزىل كۆسەك
- فۇرۇتىنىڭ لىجىنكىسىنىڭ
 ئىسلىگە نۇخۇملىشى

لىجىنكىسى، قوچىغى پاختا ئىسكىلاتى
 قاتارلىق جايلاردىكى قىزىل كۆسەك
 فۇرۇتىنىڭ غوزىگى ئىچىدە قىشلايدۇ.
 كېيىنكى يىلى 3-ئاينىڭ ئوتتۇردى-
 لىرى ۋە ئاخىرلىرىدىن 4-ئاينىڭ
 باشلىرىغىچە بولغان ئارىلىقتا قوچاققا
 ئايلىنىپ، بېتىلىپ چىقىدۇ، نۇرعا
 ئىنتىلىدۇ، سەكرىپەلەيدۇ، ئۆمىل-
 مەلەيدۇ، ئۇجالايدۇ. نۇخۇملاش-
 تىن بۇرۇن، نۇغۇت ئەزاسىنى
 ھاشارەتلىك تېنىگە سانچىپ، ئۇنى
 نەھۇت قىلىپ، شوراش نەيچىسىنى
 يېتىلدۈرۈپ، ئاندىن ئۇنىڭ تېنىدىكى
 سۇيۇقلۇقتىن ئاززاي شوراپ، فوشۇمچە
 ئوزۇنلۇق ئويلاپ، ئاندىن تۇخۇملايدۇ.
 ھەر قېتىمدا 3~5 دانە
 نۇخۇم نۇغىدۇ. داۋاملىق تۈردە 2~3
 قېتىم تۇغىدۇ. ھەر بىر
 قىزىل كۆسەك فۇرۇتىنىڭ تېنىگە
 10~30 تۇخۇم تۇغىدۇ. چىش-
 سىنىك ھەر بىرى 5~10 قىزىل كۆسەك
 قۇرۇتىنىڭ تېنىگە نۇغىدۇ.
 لىجىنكىسى تۇخۇمدىن چىققاندىن
 كېيىن قىزىل كۆسەك قۇرۇتىنىڭ
 لىجىنكىسىنىڭ سۇيۇقلۇقىنى شوراپ،
 ئۆلۈنۈپ قالىدۇ. لىجىنكىسى قېرىغاندىن
 كېيىن، قىزىل كۆسەك فۇرۇ-
 تىنىڭ تېسىدە تۇرۇپ قوچاققا
 ئايلىنىدۇ.

ئاسراش ۋە پايدىلىنىش كىچىك سېرىنى ھەرە ئارقىلىق، كېۋەزدە بولىدىغان فىزىل كۆسەك قۇرۇتىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى يوقىتىشتا كېۋەز يىغىدىغان چاغدا فىزىل كۆسەك قۇرۇ- تىنىنىڭ قىشلايدىغان عوزىگىنى كۆپلەپ يىغىۋېلىپ، ئۆبدە ساق- لاپ، ھەر يىلى 12- ئايدىن كېيىنكى يىلى 3- ئايغىچە بولغان ئارىلىقتا مۇۋاپىق تېمپېراتۇرا ئاستىدا سۈنئىي كۆپەيتىش كېرەك. ئۆينىڭ تېمپېراتۇرىسى $18-25^{\circ}\text{C}$ ، نەملىگىنى %70 قىلىپ ساقلاش كېرەك. مۇسۇنداق تېمپېراتۇرا، نەملىك شارائىتىدا، تۇخۇم مەزگىلى 4~5 كۈن، لىچىنىكا مەزگىلى 8~10 كۈن، قوچاق مەزگىلى 8~9 كۈن بولىدۇ. قوچاقنى چىققان جىشىدە- نىڭ ئۇرۇغىنى بۇقۇرسا بولىۋېرىدۇ، جىشىنىڭ ھەر بىرى 5 غوزەككە ئۇرۇق يۇقتۇرىدۇ. ھەرە قويۇپ بېرىلىدىغان ۋاقىتتا ماسلاشتۇرۇش ئۈچۈن، ھەرە ئۇرۇغى يۇقتۇرۇلغان غوزەكنى $8-5^{\circ}\text{C}$ لۇق مۇزلىتىش ئىشكاۋىدا ساقلاپ، كىچىك ھەرىنىڭ يېتىلىشىنى چەكلەش كېرەك. خېنەن ئۆلكىسىدە ئادەتتە $4-14^{\circ}\text{C}$ ئاينىڭ باشلىرىدا ۋە ئوتتۇرىلىرىدا ھاۋا تېمپېراتۇرىسى 14°C تىن ئاشقاندا، ھەرە قويۇپ بېرىلىدۇ. قويۇپ بېرىدىغان چاغدا، قوچاقنى چىققان ھەرىنى كۆتۈرۈپ ئىچىگە سېلىپ، ئاغزىنى ئېتىپ، پاختا ئىسكىلاتغا ئەكىرىپ، تاغدا ئېسىپ كۆنۈبرنىڭ ئاغزىنى ئېچىپ قويسلا بولىدۇ.

3. تەكشى قوساقلىق كىچىك ھەرە

تەكشى قوساقلىق كىچىك ھەرە، مەسىلەن، تۈكلۈك فارىغاي

فۇرۇسى، چوڭ يېنىل چىرىپاشكا، كېپىنەك، ئىمەن تەكىنى، ئابدېمىلىك تەكىنى، كامپارا تەكىنى قاتارلىق كۆپ خىل ھاشىك رەتنىڭ تۇخۇمىدا پارازىت ياشايدۇ.



گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسى بۇ ھەرە ئارقىلىق ئاپىلسۇن، لىجژ چىرىپاشكىسىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى يوقىتىشتا ياخشى ئۈنۈم ھاسىل قىلىپ، كەڭ كۆلەملىك يەرلەر بويىچە ئومۇملاش-نۇرماقتا.

49- رەسىم تەكشى قوساقلىق

كىچىك ھەرە

تاشقى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى

جىشىسىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 4 مىللىمېتىرچە، رەڭگى قارا-سۇيۇق بولۇپ، ئالدى قىسمى قېنىق ساغۇچ قوڭۇر، سۈزۈك بولىدۇ. ئوتتۇرىسىدا توغرىسىغا سۈزۈك ئەگرى سىزىق بولىدۇ. قوساق قىسمى قارا بولىدۇ، قولىغىدا ھالقىسىمان ئاق سىزىق بولىدۇ. ئەركىگىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 3 مىللىمېتىر، قاننى پۈتۈنلەي سۈزۈك بولىدۇ، قوساق قىسمىنىڭ شەكلى نەشپۈتسىمان، ئۇچى نەكشى، تۇخۇمى سوقچاق يۇمۇلاق بولىدۇ، بىر تەرىپىدە ئۇرۇن سېپى بولىدۇ، لىچىنىكىسىنىڭ رەڭگى ئاق، ئالدى نەرسىسى چوڭ بولۇپ، بارغانسېرى ئىنچىكىلەپ بارىدۇ. قوساق قىسمىنىڭ ئۇچىدا ئۇزۇن ئۇچلۇق ئاچمىسى بولىدۇ. قوچىغى سۇس قوڭۇر بولىدۇ (49-رەسىم).

ياشاش ئادىتى يېتىلگەنلىرى دالىلاردا گۈل شىرنىسى

سەن ئورۇقلىنىدۇ، تۇخۇم شاكىلىنى يېرىپ نۇخۇم ئىجدىكى ئوزۇقلۇق بىلەنمۇ ئوزۇقلىنىدۇ. چىشى 80 كۈندىن كۆپرەك ياشىلايدۇ. ئۇ تۇخۇم ھەرىسى ئىچىدە ئۆمرى ئەڭ ئۇزۇن بولغان بىر خىل ھەرە بولۇپ ھىساپلىنىدۇ. رۆجەكلىك ساندۇق ئىچىدە ھەر يىلى 8 ئەۋلاد قالدۇرالايدۇ، نەييارلىق قوچمى فىشلايدۇ. يېتىلگەنلىرى دالدىمۇ قىشلايدۇ. بۇخۇملاش مەزگىلى سىر ئاي ئەتراپىدا بولىدۇ. ھەر بىر بارازىت خوحسىنىڭ تۇخۇمىدىن ئوتتۇرا ھىساپ بىلەن بىرلا ھەرە چىقىدۇ، ئايرىملىرىدىن 2~3 لىچىنكا چىقىدۇ. ئوتتۇرا ھىساپ بىلەن 228.2 دانە تۇخۇم تۇغىدۇ. ھەر كۈنى 5.7 دانىدىن تۇخۇم تۇغىدۇ. ئەڭ بۇقۇرى بولغاندا 11.3 دانە تۇخۇم تۇغىدۇ. ئۇنىڭدا $30^{\circ}\text{C} - 25^{\circ}\text{C}$ تېمپېراتۇرا، 80% نەملىك مۇۋاپىق كېلىدۇ.

ئاسراش ۋە پايدىلىنىش قىزىل كۆزلۈك بۇخۇم ھەرىسىگە ئوخشاش.

4. پوسىلاقخورنىڭ كىچىك سېرىق ھەرىسى

پوسىلاقخورنىڭ كىچىك سېرىق ھەرىسى 8 چىشلىق بوستى-لاقخورنىڭ ۋە باشقا پوسىلاقخورلارنىڭ بىر خىل بارازىت ھەرىسى. سوۋىت ئىتتىپاقىنىڭ ماتېرىيالغا ئاساسلانغاندا، بارازىتلاش نىسبىتى 40~60 پىرسەننىڭ ھەتتا 80 پىرسەننىڭ بېقىدۇ. دۆلىتىمىزدە بۇ نېخى ئېسىقلاشنى يوقىتىدۇ.



تاشنى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى
يېتىلگىنى كىچىك، رەڭگى قارا
بولدۇ، بارقراپ تۇرىدۇ. لىچىنكىسى
ئاپپاق، چۈن قۇرۇتى شەكلىدە
بولدۇ (50-رەسىم).

50-رەسىم پوستلاقخورنىڭ

كىچىك سېرىق ھەرىسى

ياشاش ئادىنى بۇ ھەرە سوۋت
ئىتتىپاقدا يىلغا 2 ئەۋلاد قالدۇرىدۇ،
4-ئاينىڭ ئاخىرىدى باشلاپ لىچىن-
كىسى يېتىلىپ چىقىدۇ. پوستلاقخور
دەرەخ قوۋزىغىنى يەۋاتقان چاغدا،
كىچىك سېرىق ھەرە ئۇنىڭ تېنىگە


1. يېتىلگىنىنىڭ 8 حىشلىق
- بوسلاقخورغا نۇخۇم بۇغۇنى
2. 8 جىشلىق پوستلاقخوردا
- بارازى باشقان ھەرە جىقىپ
- كەتكەن تۆسۈك

بىر دانە تۇخۇم تۇغىدۇ. پارازىتلانغان پوستلاقخور ئادەتتە
دەرەخ قوۋزىغىنىڭ قېتىغا كىرىۋالىدۇ، لىچىنكا تۇخۇمدىن
چىققاندىن كېيىن، ئۇنىڭ ئېنىدىكى سۇيۇقلۇق بىلەن
ئوزۇقلىنىدۇ، تەخمىنەن بىر ئايدىن كېيىن يېتىلىپ، پوستلاق-
خورنىڭ تېنىنى تېشىپ چىقىپ كېتىدۇ. پارازىتلانغان
پوستلاقخور دەرەخنىڭ غولىدىكى يول ئىچىدە ئۆلىدۇ. پوستلاق-
خورنىڭ بېشى، كۆكرىگى گەۋدىسىدىن ئايرىلغان چاغدا،
ئۇنىڭ تېنىدە پوستلاقخور كىچىك سېرىق ھەرىسىنىڭ لىچىنكىسى
بار بولسا، پوستلاقخور پارازىتلانغان بولىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر
ۋاقىتتا، كىچىك سېرىق ھەرىنىڭ لىچىنكىسى دەرەخ غولىدىكى
يول ئارقىلىق، سىرتقا چىقىپمۇ كېتىدۇ.

ئاسراش ۋە پايدىلىنىش ئورمانلىقىنىڭ پوسلاقتۇرغۇچى بار جايلىرىدا ئالدى بىلەن تەكشۈرۈش - نەتىقى قىلىش خىزمىتى قانات يايدۇرۇپ، بۇ ھەرىنىڭ بارلىقى سېزىلگەن ھامان، سۈنئىي يول بىلەن كۆپەيتىپ قويۇپ بېرىپ ياكى چەت ئەللەردىن كىرگۈزۈپ يەرلىكلەشتۈرۈپ، ئاندىن تازا كۆپەيتىپ قويۇپ بەرسىمۇ بولىدۇ.

5. شارسىمان قاسراقلىق قۇرۇتنىڭ پارازىت ھەرىسى

شارسىمان قاسراقلىق قۇرۇتنىڭ پارازىت ھەرىسى قاسراقلىق



قۇرۇتنى يوقىتىدىغان مۇھىم كۈشەدە ھاشارەت. قىشلىغان بىر دانە چىشى ھەرىنىڭ قالدۇرغان ئەۋلادى 2 مىڭدىن ئارتۇق قاسراقلىق قۇرۇتنى يوقىتالايدۇ. پارازىتلىشى %98~86 كە يېتىدۇ. قاشقى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى

شارسىمان قاسراقلىق قۇرۇتنىڭ پارازىت ھەرىسىنىڭ تۈرى كۆپ بولۇپ، ئۇلارنىڭ ئىچىدە مۇھىمى مۇنداق ئىككى خىل: بىرى شارسىمان قاسراقلىق قۇرۇتنىڭ سەكرەتمە ھەرىسى، يەنە بىرى كىچىك سەكرەتمە ھەرىسى.

51 - رەسىم شارسىمان قاسراقلىق قۇرۇتنىڭ پارازىت ھەرىسى

1. شارسىمان قاسراقلىق قۇرۇتنىڭ كىچىك سەكرەتمە ھەرىسى 2. كىچىك سەكرەتمە ھەرىسى.

رەتمە ھەرە. بۇ ئىككى خىل ھەرنىڭ جۇغى ناھايىتى كىچىك،
رەڭگى قارامتۇل بولۇپ، پارقىراپ تۇرىدۇ (51-رەسىم).


ياشاش ۋادىتى بۇ ئىككى خىل سەكرەتمە ھەرە سوۋىتى
ئىتتىپاقىدا يىلىغا 3 ئەۋلات قالدۇرىدۇ. قېرىغان لىجىنكىسى
پارازىتلانغان چىشى فاسراقلىق قۇرۇتنىڭ قاسرىغىدا قىشلايدۇ.
كېيىنكى يىلى 5-ئاينىڭ ئاخىرىدا پارازىت ھەرنىڭ لىجىنكىسى
قىشلىغان ياش قۇرۇتنىڭ بەدىنىدە پەيدا بولىدۇ، ئۇلار
فاسراقنى يەپ تېشىپ، شۇ تۆشۈكتىن ئۆمىلەپ چىقىدۇ. بىر
چىشى فاسراقلىق قۇرۇتنىڭ تېنىدە 7 پارازىت ھەرە يېتىلىدۇ.
ئەتىيازدا پەيدا بولغان پارازىت ھەرە دەرھال قاسراقلىق
قۇرۇتتا پارازىت ياشاشقا ئاتلايدۇ. دەسلەپتە 3 ياشلىق ياش
قۇرۇتتا، كېيىن بولسا بېتىلگەن چىشى ھاشارەتتە پارازىت
ئاتىدۇ. بارازىت ھەرە تۇخۇم تۇغۇش ئورگىنىنى قاسراققا
سانچىپ كىرگۈزۈپ. قاسراقلىق قۇرۇتنىڭ تېنى ئىچىگە بىرقانچە
تۇخۇم تۇغىدۇ. تۇخۇمدىن چىققان بارازىت ھەرنىڭ كىچىك
قۇرۇتى قاسراقلىق قۇرۇتنىڭ تېنىدىكى سۇيۇقلۇق بىلەن
ئوزۇقلىنىدۇ، شۇنىڭ بىلەن فاسراقلىق قۇرۇت ئۆلىدۇ.

ئاسراش ۋە پايدىلىنىش بۇ ھەرىدىن پايدىلىنىپ قاسراق-
لىق قۇرۇتنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى يوقىتىشتا، قىتى
پەسىلدە مۇپلىك دەرەخنىڭ، مۇسسىز دەرەخنىڭ ئىچىگە
ناخلىرىدىكى فاسراقلىق قۇرۇتلارنى يىغىۋېلىپ، ھاشارەت
بېقىش فۇتسىغا سېلىپ، تەبىئىي شارائىت ئاستىدا ساقلىسا،

ھاۋا ئىسسىغان ھامان قاسراقلىق قۇرۇت بار شاخنى ئەسنەك قايچىغا سېلىپ قويۇپ، ئۇنىڭدىن چىققان پارازىت ھەرسىنى بەنە قاسراقلىق قۇرۇت پەيدا بولغان ئورمانلىققا، باققا قويۇپ بەرسە بولىدۇ.

6. ئايلانما سىزىقلىق پەرۋاننىڭ كىچىك پارازىت ھەرسى

بۇ جېڭجۇ، شۇچاڭ فاتارلىق جابلاردىكى باغلارغا تارقالغان بولۇپ. ئايلانما سىزىقلىق پەرۋانە لىچىنكىسىنىڭ تېنىدە، فوجىغدا پارازىت ياشايدۇ.



تاشقى كۆرۈنۈش ئالاھىدە.

دىئىلگى بېنىلگىسىنىڭ تېنى پارا بولىدۇ، پارقراپ تۇرىدۇ. فانستى سۈزۈك قوكۇر بولىدۇ.

قوساق فىسمى نۇخۇم شەكىلىدە 52-رەسىم ئايلانما سىزىق بولىدۇ. تېنىنىڭ ئۇزۇنلۇغى 1.4 مىللىمېتىر بولىدۇ (52-رەسىم).

پارازىت ھەرسى

ياشاش ئادىتى ھەر يىلى 4~5. 1. تىلگىنى 2. قوجىغى

ئەۋلات فالدۇرىدۇ، فوجىغى ئايلانما سىزىقلىق پەرۋاننىڭ فوجىغى ئىچىدە فىشلايدۇ. كېيىنكى يىلى باھار پەسلىدە كېيىنكى قوجاقنى چىقىپ، پارازىت باشقا باشلايدۇ. ئايلانما سىزىقلىق بوبۇرماق پەرۋاننىڭ يامراپ كېتىشى چەكلەشتە ناھايىتى


ئوبدان رول ئويلايدۇ. جېڭجۇ باغۋەنجىلىك مەيدانلىرىنىڭ كۈزىتىشىگە قارىغاندا، ئايلىما سىزىقلىق يوپۇرماق پەرۋانسى كۆپ پەيدا بولغان يىللىرى مۈنلىك دەرەخلەرگە دورا پۇر-كەلمەيدىكەن، 8-ئايىك ئوتتۇرىلىرىغا كەلگەندە، 4-ئەۋلات زىيانداش ھاشارەت پەيدا بولغان چاغدا، بۇ خىل پارازىت ھەرلەرنىڭ ھەممىسى دىگۈدەك پارازىتلايدىكەن.

ئاسراش ۋە پايدىلىنىش بۇ خىل پارازىت ھەرىدىن پايدىلىنىپ ئايلىما سىزىقلىق يوپۇرماق پەرۋانسىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى يوقىتىشتا قىش پەسلىدە دەرەخ قوۋزىغىنى قېرىش بىلەن بىرلەشتۈرگەن ھالدا، شۇ خىل پارازىت ھەرىدىنى قېزىۋېلىنغان غوزىڭنى يىغىپ، نامۇك سېۋەتكە سېلىپ، ئاسراپ قىشنى ئۆتكۈزسە بولىدۇ، ياكى بولمىسا، ئۇنى پارازىتلاش نىسبىنى تۆۋەن بولغان مۈنلىك ئاققا بۆتكەپ، كېيىنكى يىلى ئايلىما سىزىقلىق يوپۇرماق پەرۋانسى قوجاڧىس چىقىشتىن بۇرۇن ئۈستىنى داكا بىلەن يېپىپ قويسا بولىدۇ، شۇنداق قىلىنسا، پارازىت ھەرە ئۈچۈپ چىقىپ كېتىدۇ-دە، يوپۇرماق پەرۋانسى سېۋەت ئىچىدە دىسېقپ ئۆلىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا، پارازىتلاش نىسبىتى يۇقۇرى بولغان چاغدا، خىمىيىۋى دىخان-چىلىق دورىلىرىنى چاچماسلىق كېرەك.

7. تۈگۈنەك پاشىنىڭ چاققاق كىچىك ھەرىسى

بۇ خىل ھەرە خېنەن، نەنشى، خۇبېي قاتارلىق جايلارغا

تارقالغان بولۇپ، بۇعدا بولدىغان دان شورىغۇچى قۇرۇت-
 نىك، تۈگۈنەك سۆگەت پاشسىنىك نۇخۇمدا ۋە لىچىنكىسىنىك
 تېنىدە پارازىت ياشايدۇ، پارازىتلاش نىسبىتى ناھايىتى يۇقۇرى



53-رەسىم تۈگۈنەك پاشسىنىك چاققاق كىچىك ھەرىسى

1. سىنىلگىنى 2. پارازىت حوجسىنىك نۇخۇمى ئىچىگە
- نۇفغان نۇخۇمى 3. لىچىنكىسى 4. قوجىسى 5. لىچىنكا
- سىىدە پارازىت ئاساۋانغان لىچىنكا 6. سىنىلگىنىنىك
- بۇعداي بوسىغا نۇفغان نۇخۇمى

بولدىۇ. 1953~1954-يىلى نەنباكددا ئېلىپ بېرىلغان تەكشۈرۈش-
 نىس قارىغاندا، بۇعدا بولدىغان دان شورىغۇچى شۇرۇسىنىك
 80% تىن كۆپرەكى پارازىلىدىكەن.

تاشنى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى چىشىنىڭ ئورۇنلۇقى 1.7~1.2 مىللىمېتىر. قانات كېرىمىسى 2.5 مىللىمېتىر بولىدۇ. تېنىنىڭ رەڭگى قارا بولىدۇ، مېئالدىك پارقراپ تۇرىدۇ. قوساق قىسمى تۇخۇم شەكلىدە، لېچىنىكىسى چىۋىن فۇرۇتى شەكلىدە بولىدۇ (53-رەسىم).

ياشاش ئادىتى ھەر بىلى بىر ئەۋلات قالدۇرىدۇ، تۇخۇم ھالىتىدە پارازىت خوجايىنىنىڭ لېچىنىكىسى تېنىدە قىشلايدۇ، كېيىنكى يىلى 3-ئايدا ئوتتۇرىلىرىدا، ئاخىرلىرىدا لېچىنىكىسى ھەركەتلىنىشكە باشلىغان چاغدا، ئاندىن نۇخۇمدىن چىقىپ لېچىنىكا نىسبىدىكى سۇيۇقلۇق بىلەن ئوزۇقلىنىپ چۈكىدۇ. 4-ئاينىڭ باشلىرىدا، پارازىت خوجايىنى لېچىنىكىسىنىڭ يۈزى ئىچىدە قوچاققا ئايلىنىدۇ. بېتىلگەنلىرى قوچاقنى چىققاندىن كېيىن، پارازىت خوجايىنىنىڭ پوسىنى تېشىپ چىقىدۇ. ئاندىن بۇغداي ئاشىغىغا ئۇچۇپ بېرىپ، ياكى تۈگۈنەك سۆڭەك پاشىسىنىڭ قوچاقنى چىققان كونا تۆسۈكى ئىچىدە پارازىت خوجايىنىنىڭ تۇخۇمىنى تېپىپ، بىگىنىسىمان تۇخۇم تۇغۇش نەيچىسىنى ئۈستىگە سانچىپ كىرگۈزۈپ تۇخۇم تۇغىدۇ. پارازىت خوجايىنىنىڭ نۇخۇمدىن لېچىنىكا چىققاندىن كېيىن، ھەرىسىنىڭ تۇخۇمى يەنىلا پارازىت خوجايىنى لېچىنىكىسىنىڭ نىسبىدە قالىدۇ. ھەمدە شۇنىڭ ئىچىدە بازىنى ۋە قىشنى ئۆتكۈزۈپ، كېيىنكى يىلى نۇخۇمدىن لېچىنىكا ھالىتىدە چىقىدۇ.


ئاسراش ۋە پايدىلىنىش تەتقىق قىلىشقا توغرا كېلىدۇ.

8. كۆك پىتىنىڭ كىچىك غوزەك ھەرسى

بۇ خېيەن ئۆلكىسىنىڭ ھەرقايسى جايلىرىغا تارقالغان، كېۋەز پىنىنىڭ، نەسپۈت پىنىنىڭ، شاپتۇل پىتىنىڭ، كۆكناز پىتىنىڭ مۇھىم كۈشەندىسى، كۆك پىت تېنىدە پارازىت ياشايدۇ، پارازىتلاش نىسبىتى %50 تىن يۇقۇرى بولىدۇ.

تاشقى كۆرۈنۈش ئالا-

ھىدىلىگى يېتىلگىنىنىڭ تېنىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 2.5 مىللىمېتىر، رەڭگى قوڭۇر بولىدۇ. دۈلىسى تۇتۇق قوڭۇر، قاندى سۈزۈك بولىدۇ. قوساق قىسمىنىڭ ئاخىرقى ئۈچى ئىنچىكە، ئۇزۇن بولىدۇ، نۇخۇم تۇغۇش نەيچىسى يىڭىنسىمان بولىدۇ (54-رەسىم).



54-رەسىم كۆك پىتىنىڭ غوزەك ھەرسى

1. ئاھىماق قۇرۇق كۆك پىت سىگە نۇخۇم تۇغۇۋاتقان ھەرە 2. نارارس- لادىغان كۆك پىتىنىڭ سىدىن بېلىگەن ھەرە جىغقان بۆسۈك

ياشاش ئادىتى ھەر بىلى قانچە ئەۋلات قالدۇرىدىغان- لىغى ئېنىقى ئەمەس.

3-ئابىنىڭ ئوننۇرلىرىدىن باشلاپ يېتىلگەنلىرى يەيدا بولۇپ، ھەر خىل كۆك پىتلارنىڭ بېسى ئىچىگە نۇخۇم


تۇغىدۇ. لىجىنكىسى تۇخۇمدىن چىققاندىن كېيىن، كۆك يىپ تېنىدىكى ئوزۇقلۇق بىلەن ئوزۇقلىنىدۇ. كۆك يىپ قوشىقى ئاسنا-ئاستا كۆپۈپ، قوڭۇر رەڭگە كىرىپ ئۆلىدۇ. دەم ئۇنىڭ ئۆلۈكى قاتتىقلىشىپ، ئوب-چۆپ ئۇرۇمغا ئوخشاپ قالىدۇ. يېتىلگەن ھەرە قوچاقتىن چىققاندىن كېيىن، كۆك يىپنىڭ دۈمبىسىنى تېشىپ ئۇچۇپ چىقىپ كېتىدۇ. ئاسراش ۋە پايدىلىنىش تەتقىق قىلىشقا توغرا كىلىدۇ.

9. ياۋا تەكەننىڭ كىچىك غوزەك ھەرىسى

بۇ خېنەن ئۆلكىسىنىڭ ھەرقايسى جايلىرىغا نازارەتچى، ئىنتايىن ئومۇمىي بۇزۇلۇك پەيدا بولىدۇ. قوش قۇيرۇقلۇق پەرۋانە، تېرەك پەرۋانىسى، سۆڭەك پەرۋانىسى لىجىنكىلىرىنىڭ ئىچىدە پارازىت ياشايدۇ.

تاشقى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى يېتىلگەننىڭ ئۇزۇنلۇقى 2 مىللىمېتىر، قانات كېرىمىسى 3~4 مىللىمېتىر بولىدۇ. بېشى قارا، قانىتى سۈزۈك بولىدۇ، ئارقا پۇتسىڭ ئاساسى بوغۇمى قارا بولىدۇ. قوساق قىسمى مۇكا شەكلىدە، قىزغۇچ قوڭۇر بولىدۇ (55-رەسىم).

ياشاش ئادىتى ھەر يىلى قانچە ئەۋلات قالدۇرىدىغانلىقى ئېنىق ئەمەس. يېتىلگەننى پەرۋانە، ياۋا تەكەن كېيىنسىڭى قانارلىقلارنىڭ لىجىنكىسىنىڭ تېنىگە تۇخۇم تۇغىدۇ. لىجىنكىسى نۇخۇمدىن چىققاندىن كېيىن، پارازىت خوجايىنىنىڭ تېنىدىكى



سۇنۇقلۇق بىلەن ئوزۇقلىنىدۇ. بىتىد-
گەسىدى كېسىپ پارارتت حوجاسىد-
نىڭ تېنىنى تېشىپ چىقىپ، ئۇنىڭ
نىڭسىك سىرتىغا باكى يوپۇرماقغا
ئاقۇش، بوز، كاللەك سېك عورەك
ياساپ، شۇنىڭ ئىچىدە قوچاققا ئايد-
نىدۇ. بېتىلىپ فوجاقتىن چىققانىدى
كېسىپ، بەنە ھەرفايىسى جاسلاردا

55-رەسىم ياۋا نەكەنىنىڭ
كىچىك غوزەك ھەرىسى

ئۇچۇ سۇرۇپ، يېڭى بارارتت
حوجاىنىسى بېيت نۇخۇم نۇغۇب
كۆيىيدۇ. ئاۋالغى بارارتت حوجامى
بىسجە بىلەن ساح- يوپۇرماقغا
بېسىپ ھەركەت قىلالماي،

1 سىلىكىنى 2. نۇخۇمى
3 لىچىكىسى 4. عورەك ۋە
بارارتتلاغان لىچىكا
فورۇلۇپ قالىدۇ. رەكىگى ئۆرگىرىپ. ئاخىر ئۆلىدۇ. ئۇنىڭ
يوسىندا كىچىك عورەك ھەرىسى تېشىپ چىقىپ كەتكەن
نۇرغۇن تۆشۈك قالىدۇ.

ئاسراش ۋە پايدىلىنىش بىتىلگەلىرى گۈل شىرنىسىنى
ناخشى كۆرۈپ يەيدۇ. سۇغا، باغلاردا، بول، ئىرىق- ئۆسكە-
نىڭ بوسلىرىدىكى بوش نەرلەردە بىسدە، سىنەپشە گۈللىك
نۇخۇمەك ئۆسنۈرۈپ، ئۇنى گۈل شىرنىسى بىلەن سىمىنىلگامى
بولدۇ. باسقا زىيانداش ھاسارەنلەرنىڭ ئالدىنى ئالىدىغان
ۋە ئۇنى بوغىنىدىغان چاغدا، خىمىسوى دىخانىلىق دورىلىرىنى

ئىمكان قەدەر ئاز ئىشلىتىش كېرەك. كۆز پەسلىدە، ھەرە غوزىڭنى كۆپلەپ يىغىپ، سوغاق ھالەتتە ساقلاپ، ئىشلىتىدىغان چاغدا، زىيانداش ھاشارەتلەر يوقىتىلىدىغان رىراۋەتكە قويۇپ بېرىلىدۇ.

10. ياغاچ پوستلاقخورى پەرۋانسىنىڭ كىچىك غوزەك ھەرسى

بۇ خۇاڭخې دەرياسىنىڭ تاشقىن رايونىدىكى دىخانجىلىق مەيدانى فاتارلىق جايلاردىكى باغلارغا نارقالغان بولۇپ، تاغىل ياغاچ پوستلاقخورى لىجىنكىسىنىڭ تېنىدە پارازىت ياشايدۇ، پارازىت باشلىق سىبىتى ناھايىتى ئۇزۇن بولىدۇ.

تاشقى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى بېتىلگىنىڭ رەڭگى قارا بولىدۇ، چىشىنىڭ تېنى 5~6 مىللىمېتىر، ئەركىگىنىڭ تېنى 2~3 مىللىمېتىر بولىدۇ. قوساق قىسمى سۇس سېرىق بولىدۇ. دۈمبىسىدە توغرىسىغا كەتكەن 5 تال قارا سىزىق بولىدۇ. قولنۇغىدىكى توغرىا سىزىق ئۈچ بۇلۇك شەكىلدە بولىدۇ. قاننى سېرىق سۈزۈك بولىدۇ. فانتىنىڭ تومۇرى قارا بولىدۇ. ياشاش ئادىتى لىچىنكىسى تاغىل ياغاچ مىتسى بەرۋانسى لىجىنكىسىنىڭ تېنىدە قىشلايدۇ. كېيىنكى بىلى 5-ئاينىڭ ئاخىرلىرىدا لىچىنكىسى قېرىپ، پارازىت خوجاسىنىڭ تېنىدىن چىقىدۇ، زىدە بولغان شاخنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ھاشارەت يولىدا ساغۇچ كىچىك غوزەك توقۇپ قوچاققا ئايلىنىدۇ. بېتىلىپ

فوزانىسى جىمە. دىنى كىمىن، ناغىل ناغاج پوسىلاقخورى بەروا-
سىنىك بولىدىنى ئۇخۇب چىقىپ كېتىدۇ.

ئاسراش ۋە پايدىلىنىشى قىشلىق دەرمەچ چاتاش ۋاقتىدا،
كىمىنىسىلگەن شاحلاردىن كىمىك عوزەك ھەرىسى بارلىرىسى
ئۆزىگە ئىبىكىرىپ ساقلان قونۇپ، ئۇنى ئاسراپ قىلىشتىپ،
كىمىنىكى سىلى يەنە ناپفا قويۇپ بېرىش لارىم، شۇنداق قىلىنسا،
ئۇ ئۇخۇب جىغىپ بېكىمىۋاسى پارازىت ياشابدۇ.

11. قالقان قوساقلق غوزەك ھەرىسى

ئىتىلگىسىنىك تېسى 4~5 مىللىمىتىر. قاناب كىرىمىسى
6~7 مىللىمىتىر، رەككى قارا بولىدۇ. قوساق قىسمىنىك
ئالدى نەرىەتتىكى ئۇخى ساغۇچ بولىدۇ. يۇنى ساغۇچ بولىدۇ.
لەنكىسىنىك تېسى 5 مىللىمىتىر، رەككى سۇس تىسىل بولىدۇ.
غوزىكى بۇمۇلاق، سىلىندىر سەكلىدە ئاق بولىدۇ.

ياشاش ئادىتى ھەر سىلى 3 ئەۋلاد قالدۇرىدۇ، لىچىنىكىسى
ئالدىدا بولىدىغان كىمىك بوبۇرمانى نەرۋانىسى قانارلىق ھاشا-
بەلەكلىك لەنكىسىنىك نىسە قىشلىنىدۇ. كىمىكى سىلى 5-
ئانىك ئاخىرلىرىدا قوحافقا ئابلىنىدۇ ۋە قوحافتىن ھەرە بولۇپ
سىلىپ چىقىدۇ. 6-ئانىك ئونبۇرلىرىدا ۋە ئاخىرلىرىدا
سىرىجى ئەۋلادى چىقىدۇ، 7-ئانىك ئاخىرلىرىدىن 8-ئانىك
ناسىلىرىغىچە ئىككىنچى ئەۋلادى چىقىدۇ، 8-ئانىك ئاخىرلىرى-
دىن 9-ئانىك ئونبۇرلىرىغىچە بولغان ئارىلىقتا ئۇچىچى

ئەۋلادى چىقىدۇ. ئالىمدا بولىدىغان بوپۇرماق يەروانىسى فاتارلىق زىيانداش ھاشارەتلەرنىڭ نۇخۇمى ئىچىگە تۇغىدۇ. زىيانداش ھاشارەتلەرنىڭ لىچىنكىلىرى تۇخۇمدىن چىققاندىن كېيىن، پارازىت ھەرىنىڭ لىچىنكىسى پارازىت خوجايىنىنىڭ تېنىدە تۇرۇپ يېتىلىدۇ، بېتىلگەندىن كېيىن تېشىپ چىقىپ، پۇرلاشقان بوپۇرماق ئىچىدە عوزەك ھاسىل قىلىپ قوجاققا ئايلىنىدۇ. جېڭجۇ رايونىدا ئېلىپ بېرىلغان نەكشۇرۈشكە قارىغاندا پارازىتلىنىش نىسبىتى 50% ئەتراپىدا بولىدىكەن.


ئاسراش ۋە پايدىلىنىش سۈنئىي يول بىلەن كۆپەيتىپ قويۇپ بېرىلىدۇ.

12. شاڭخەي كۆك ھەرىسى

شاڭخەي كۆك ھەرىسى تىكەنلىك سىرىق بەرۋانىنىڭ غوزىگى ئىچىدە پارازىت ياشاپ، لىچىنكا تىپىدىكى سۇنۇقلۇق بىلەن ئوزۇقلىنىدۇ. خېنەن ئۆلكىسىنىڭ جىلانلىق رايونلىرىدا، ئورمانلىقلىرىدا، باغلىرىدا كۆپ ئۇچرايدۇ.

تاشقى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىگى يېنىلگەنلىرى كۆكۈش بېشىل بولىدۇ، بارقىراپ تۇرىدۇ. دۈمبىسىدە بەت 2-4 لا بوغۇم بولىدۇ، كۆپىنچىسىنىڭ قوسىسى كىرىشىپ كەتكەن بولىدۇ. باكى نەكشى بولىدۇ، قوساق قىسمى كۆكرەك قىسمىنىڭ ئاستىدا ئېگىلىپ تۇرىدۇ. لىچىنكىسى چىنوس فۇرۇنى شەكىلىدە بولىدۇ.

(56-رەسىم).



ياشاش ئادىتى ھەر يىلى
 2 ئەۋلاد قالدۇرىدۇ. لىچىدە-
 كىسى تىكەنلىك سېرىق پەر-
 ۋاسىنىڭ فىشلايدىغان غوزىڭى
 ئىچىدە فىشلايدۇ. كېيىنكى
 يىلى 4-ئاينىڭ ئاخىرلىرىدىن
 5-ئاينىڭ ئاخىرلىرىغىچە
 غوزەك ھاسىل قىلىپ قوچاققا
 ئايلىنىپ ھەمدە يېتىلىپ،
 غورەكىنىڭ قېپىنى يېرىپ
 ئۇخۇب چىقىدۇ. ئاز ساندا-
 كىلىرى پارازىت خوجايىنىنىڭ
 غوزىڭىنى تېشىپ چىقالماي
 غوزەك ئىچىدە ئۆلىدۇ.

56-رەسىم شاڭخەي كۆك ھەرىسى
 1. نىسلىگىنى 2. نېسلىگىنىنىڭ ۋە
 قارا كىچىك ھەرىسىنىڭ تىكەنلىك
 سىزىق سەرۋانە غوزىڭىگە تۇخۇم
 نۇغۇۋانغانلىقى (غوزەك ئۈستىدىكىسى
 قارا كىچىك ھەرە، غورەكىنىڭ سول
 تەرىپىگە تۇخۇم تۇغۇسى كۆنۈپ
 نۇرغىنى شاڭخەي كۆك ھەرىسى)

چىشى نۇخۇم تۇغىدۇ-
 غان چاغدا ئالدى بىلەن
 تىكەنلىك سېرىق پەرۋانە
 غوزىڭىنىڭ ئۇچىدىن كىچىك

نۆشۈك ئېچىپ، تۇغۇش نەبەسىنى غوزەكىنىڭ ئىچىگە كىرگۈ-
 زۇپ، تىكەنلىك سېرىق پەرۋانە لىچىنىڭ تېشىگە بىر نۇخۇم
 نۇغۇدۇ. نۇغۇپ بولغاندىن كېيىن، تۇغۇش تۇشۇڭىنى يېكەتۈش-
 نىن ئېتىۋېتىدۇ. لىچىنىڭ تۇخۇمىدىن چىقىۋاتقاندىن كېيىن،

تەكەنلىك سېرىق پەرۋانە لىچىنكىسىنىڭ تېنىگە تېشىپ كىرىپ،
ئۇنىڭ سۇيۇقلۇقى بىلەن ئوزۇقلىنىدۇ. ئاخىردا تەكەنلىك سېرىق
پەرۋانە لىچىنكىسى ئۆلىدۇ.

بۇنىڭدىن باشقا، يەنە بىر خىل قارا كىچىك ھەرە بار
(56-رەسىمنىڭ 2-سى). ئۇنىڭ چىشى شىشە كۆك
ھەرىسى تۇخۇم تۇققان تەكەنلىك سېرىق پەرۋانە غوزىگىنىڭ
تۆشۈكىدىن غوزەك ئىچىگە تۇخۇم تۇغدۇ، لىچىنكىسى تۇخۇم-
دىن چىققاندىن كېيىن، تەكەنلىك سېرىق پەرۋانە لىچىنكىسىنىڭ
ياكى شىشە كۆك ھەرىسى لىچىنكىسىنىڭ تېنىدىكى سۇيۇقلۇق
بىلەن ئوزۇقلىنىدۇ. شۇڭا، بۇ خىل ھەرە ھەم پايىدلىق ھاشا-
رەت، ھەم زىيانداقلىق ھاشارەت ھىساپلىنىدۇ.

ئاسراش ۋە پايىدلىنىش شىشە كۆك ھەرىسىنى ئاسراش
ۋە ئۇنىڭدىن پايىدلىنىش ئۈچۈن، قىش پەسلىدە ياكى باش
باھاردا تەكەنلىك سېرىق پەرۋانىنىڭ غوزىگىنى كۆپلەپ يىغىپ،
ھاشارەت قەپىزىگە باكى سېۋەتكە سېلىپ، ئاغزىنى داكا بىلەن
ئېتىپ قويۇش لازىم، تەكەنلىك سېرىق پەرۋانە قۇچاقتىن
چىققاندىن كېيىن ئۇچۇپ چىقىپ كېتەلمەي، شۇنىڭ ئىچىدە
ئۆلىدۇ، پارازىت ھەرە داكىنىڭ تۆشۈكىدىن ئۆكۈشۈك ئۇچۇپ
چىقىپ تىكۈشتىن پارازىت باشايدۇ.

13. توقال ھەرەلەر

بۇ خىل ھەرە ئومۇمىي يۈزلۈك ئارقالىغان، تۈرى خېلى

كۆپ بولۇپ، كۈن كېيىنكى، بەرۋانە، ھەرە تۈرىدىكىلەرنىڭ لىھىنىكىسى، قوجىنى ئىچىدە بارازىت ئاشادۇ.

تاشقى كۆرۈش ئالاھىدىلىكى بېتىلگەنلىرىدىن بەزىلىرىنىڭ جۇغى ئويمان، بەزىلىرىنىڭ جۇغى كىچىك بولىدۇ، ئىنچىكە، ئۇزۇن بولىدۇ. سەزگۈ نۇرۇتى بېسىمان، كۆپ بۇغۇملۇق بولىدۇ. دۈلىسىنىڭ ئىككى تان بەرپى سوزۇلۇپ دۈلىسى بىلەن ئۇنىسىپ بۇرىدۇ. ئالدىنقى قانتىدا ئوچۇق كۆرۈنىدىغان مەك بولىدۇ. قانتىنىڭ ئۇچىدىكى ئىككىنچى قانات قېرىنچىسىنىڭ ئارىلىقى بەك كىچىك بولىدۇ، بۇ تۆت بۇرجەكلىك باكى بەش بۇرجەكلىك بۇلۇڭ شەكىلدە بولۇپ، كىچىك قانات قېرىنچىسى دەپ ئاتىلىدۇ، ئۇنىڭ ئاستىدا تۇتىشىپ تۇرىدىغان بىر ئال بومۇر ئىككىنچى ئەگمەچ تومۇر دەپ ئاتىلىدۇ. كىچىك قانات قېرىنچىسى بىلەن ئىككىنچى ئەگمەچ بومۇر توقال ھەرنىڭ مۇھىم ئالاھىدىلىكى. قوساق قىسمى ئىنچىكە، ئۇزۇن بولۇپ، ئادەنە ناس، كۆكرەك ئۇزۇنلۇقىدا 2~3 ھەسسە كېلىدۇ. چىشىنىڭ قوساق قىسمىنىڭ ئاخىرى ئۇچى ئۇزۇنغا بىرىلغان بولۇپ، تۇخۇم تۇغۇش ئەزاسى شۇنىڭ ئىچىدىن سوزۇلۇپ چىقىدۇ. توقال ھەرنىڭ تۆۋەندىكى خىللىرى كۆپرەك ئۇچى-رادى، يېتىلگەنلىرىنىڭ تاشقى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى مۇنداق:

ئۇزۇن بۇرۇتلۇق قوڭغۇزنىڭ توقال ھەرنىسى: بېنىلگىنىنىڭ رەڭگى قارا، ئۇزۇنلۇقى 23 مىللىمېتىر بولىدۇ. قانتى سۈرۈك،

ئالدىنقى قوساق بوغۇمىنىڭ چىڭ ئوتۇرىسىدا ئۇزۇنلۇقىغا كەتكەن ئىككى تال قىزىق سىزىق بولىدۇ بۇخۇم نۇغۇمى ئەزاسى ناھايىتى ئۇزۇن، 31 مىللىمېتىر ئۆلچەمىدە بولىدۇ (57-رەسىمنىڭ 1-سى).


سۇمۇرۇغ كېيىنەكسىك توقال ھەرىسى: يېتىلگەنلىرىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 14 مىللىمېتىر، رەڭگى قارا بولىدۇ. كىچىك قالقار-سىمان پىلاستىكىسى ۋە قوساق قىسمىنىڭ ئاخىرقى بوغۇمى سېرىق بولىدۇ. 2-قوساق بوغۇمى بىلەن 3-قوساق بوغۇمىنىڭ ئاخىرقى گىرۋىكى قىزغۇچ سېرىق بولىدۇ (57-رەسىمنىڭ 2-سى).

قارا سۆڭەكلىك توقال ھەرە: يېتىلگەنلىرىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 10 مىللىمېتىر، رەڭگى سېرىق، دۈلىسىدا پارامىتۇل داغ بولىدۇ (57-رەسىمنىڭ 3-سى).

ئىككى داغلىق توقال ھەرە: يېتىلگەنلىرىنىڭ تېنى ئىنجىكە، ئۇزۇن بولۇپ، 9 مىللىمېتىر كېلىدۇ. پۈتۈن تېنى قىزغۇچ سېرىق بولىدۇ (57-رەسىمنىڭ 4-سى).

ياشاش ئادىتى يېتىلگەنلىرى، كۆپىنچە، پەرۋانە، كۈن كېيىنكى، ھەرە ۋە ئۇزۇن بۇرۇتلۇق قوڭغۇز قاتارلىق ھاشارەت-لەرنىڭ لىچىنىكىسى ۋە قوچىغىسىك ئىچىگە نۇخۇم نۇغۇمى لىچىنىكىسى بۇخۇمدىن چىققاندىن كېيىن، شۇنىڭدىكى سۇيۇق-لۇق بىلەن ئوزۇقلىنىپ پارازىت خوجايىنىنى ئۆلتۈرىدۇ. لىچى-كىسى قېرىغاندىن كېيىن پارازىت خوجايىنىنىڭ تېىدە فوجاققا

ئابلنىدىۇ. قوجاقتىن چىققاندىن كىيىن پارازىت خوجايىنىنىڭ قوچىغىنى عاجاپ تېشىپ چىقىپ كېتىدۇ.



ئۇزۇن بۇرۇتلۇق قوڭغۇزنىڭ توقال ھەرىسى تۇخۇم تۇغىدىغان چاغدا، ئالدى بىلەن سەزگۈ بۇرۇتى ئارقىلىق دەرىھ غولىنىڭ سىرتىنى چارلاپ ئۇزۇن بۇرۇتلۇق قوڭغۇز لىچىنىكىسى بار ئورۇننى ئىزلەيدۇ، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، ئۇزۇن بۇرۇتلۇق قوڭغۇزنىڭ ئورنىنى تېپىپ، ئاسدىن تۇخۇم تۇغۇش ئەزاسىنى دەرىھنىڭ غولىغا سانچىپ كىرگۈزىدۇ، بەزىدە 10 سانتىمېتىرچە كىرگۈزۈپ، ئۇزۇن بۇرۇتلۇق

57-رەسىم توقال ھەرىلەر
 1. ئۇزۇن بۇرۇتلۇق قوڭغۇز -
 نىڭ توقال ھەرىسى 2. سۈم -
 رۇغ كىيىنەكنىڭ توقال
 ھەرىسى 3. قارا سۆگەللىك
 توقال ھەرى 4. ئىككى
 داغلىق توقال ھەرى

قوڭغۇز لىچىنىكىسىنىڭ تېنى ئىچىگە تۇخۇم تۇغىدۇ. لىچىنىكىسى نۇخۇمدىن چىققاندىن كىيىن، ئۇزۇن بۇرۇتلۇق قوڭغۇز لىچىنىكىسىنىڭ تېنىدىكى سۇبۇقلۇق بىلەن ئوزۇقلىنىپ، ئۇنى ئۆلتۈرىدۇ. تېرەككە زىيان يەتكۈزىدىغان يالىڭاچ غوللۇق ئۇزۇن بۇرۇتلۇق قوڭغۇزنىڭ لىچىنىكىسى ھەمىشە بۇ ھەرى تەرىپىدىن پارازىتلىنىدۇ.

ئاسراش ۋە پايدىلىنىش توقال ھەرىدىن پايدىلىنىپ، زىيانداش ھاشارەتلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى يوقىتىش بىر نەزەپتىن، چەتئەللەردىن ياكى مەملىكىتىمىز ئىچىدىكى باشقا جايلاردىن كەلتۈرۈپ كۆپەيتىشكە توغرا كېلىدۇ. ئىككىنچى تەرەپتىن، ئۆيدە نازا كۆپەيتىپ، ئاددىن ئېتىزلارغا، باغلارغا، ئورمانلىققا قويۇپ بەرسىمۇ بولىدۇ، بۇنىڭ ئۈچۈن، پارازىت خوجايىنىنى تازا كۆپەيتىشكە توغرا كېلىدۇ. يېقىنقى بىر قانچە يىلدىن بۇيان، چەتئەللەر سۈنئىي ئوزۇقلاندۇرۇپ كۆپەيتىشتە مۇۋەپپەقىيەت قازىنىپ، توقال ھەرىنى تازا كۆپەيتىشنىڭ يېڭى يولىنى ئاچتى، چەتئەللەرنىڭ خەۋەرلىرىگە قارىغاندا، سۈنئىي يول بىلەن ئوزۇقلاندۇرغاندا، توقال ھەرىلەرنىڭ بەزىلىرىنى بىۋاسىتە ھالدا سۈنئىي ئوزۇقلۇق ئۈستىگە تۇخۇم تۇغۇشقا جەلپ قىلغىلىمۇ بولىدىكەن. يەنە بەزى توقال ھەرىلەرنى ھەسەل ھەرىسىنىڭ ئۇۋىسىغا تۇخۇم تۇغۇشقا جەلپ قىلغىلى بولىدىكەن، لېچىنكىسى تۇخۇمدىن چىققاندىن كېيىن، ھەسەل ھەرىسىنىڭ لېچىنكىسى بىلەن ئوزۇقلىنىدىكەن.

2. پارازىت چىۋىنىلەر

پارازىت چىۋىن ئادەتتىكى چىۋىنىگە ئوخشايدۇ، لېكىن تىنى نوم، كىرىپىكىسىمان نۇرغۇنلىغان تۈكىسى بولىدۇ. رەڭگى بوز قوڭۇر، قوڭۇر، ياكى قارا قوڭۇر بولىدۇ. بەزىلىرىنىڭ

سۇس دېغى بولىدۇ. كۆپىنچە ئۆسۈملۈكنىڭ يوپۇرغىدا، گۈلى ئىچىدە ياكى كۈن كېيىنىڭى، پەرۋانە فانتارلىقلارنىڭ لىجىنىكىسىنىڭ تېنىدە باشايدۇ. يېتىلگەنلىرىنىڭ جىنىسى بەزى پىتسىپ يېتىلىدىغان مەزگىلدە ئومۇمەن قوشۇمچە ئوزۇقلىنىشقا مۇھتاج بولىدۇ، ئاساسەن گۈل شىرنىسى بىلەن ئوزۇقلىنىدۇ، تۇخۇمى يېپىشقاق بولىدۇ، ئادەتتە باشقا ھاشارەتلەرنىڭ لىجىنىكىسىنىڭ تېنىگە ياكى قوچىغىغا تۇخۇم تۇغىدۇ. لىجىنىكىسى نۇخۇمدىن چىققاندىن كېيىن، ئۇنىڭ تېنىگە تېشىپ كىرىپ، بەدەن سۇيۇقلۇغىنى شورىدۇ. پارازىت خوجايىنىنىڭ تېرىسىدىن ياكى نەپەسلىنىش نەيچىسىدىن تۆشۈك ئىچىپ، نەپەس ئالىدۇ. بەزىلىرى ئۆسۈملۈك يوپۇرغىغا نۇخۇملايدۇ، ھاشارەتنىڭ ئوزۇقلىنىشى ئارقىلىق ئۇنىڭ ئاشقازىنىغا، ئۈچىگە كىرىپ پارازىت ياشايدۇ. بەزىلىرى بىۋاسىتە زىيانداش ھاشارەتنىڭ نىنىگە تۇخۇم تۇغىدۇ، لىجىنىكىسى تۇخۇمدىن چىققاندىن كېيىن، زىيانداش ھاشارەتنىڭ پوستىنى تېشىپ كىرىدىغانلىرىمۇ بولىدۇ. لىجىنىكىلىرىنىڭ بەزىلىرى توپىنىڭ ئۈستىدە ياكى يوپۇرماقنىڭ يۈزىدە باشاپ، پورسەن نايىسلا زىيانداش ھاشارەتنىڭ تېنىگە تېشىپ كىرىپ ئوزۇقلىنىدۇ، زىيانداش ھاشارەت ئۆلۈشتىن نۇرۇن، لىجىنىكىسى يېنىلىپ، ئۇنىڭ تېنىنى يېرىپ چىقىپ. پارازىت خوجايىنىنىڭ نېپىسىنىڭ سىرنىدا تۇرۇپ باقى تۇپراققا كىرىپ قوچاققا ئايلىنىدۇ. لىجىنىكىسى جۈشۈن قۇرۇتى شەكلىدە بولىدۇ، تېنىنىڭ بوغۇملىرى، ئىنى بولىدۇ، ئۈچى كەسمە شەكلىدە

بولدۇ.

پارازىت جىۋىنىڭ كۆپىيىش ئىقتىدارى ناھايىتى كۈچلۈك بولدى، پۈتۈن ھاياتىدا 50 تىن 5 مىڭغىچە تۇخۇم ياكى لىجىنكا تۇغىدۇ. بەزى دۆلەتلەر بىئولوگىيىلىك ئۇسۇل بىلەن ئالدىنى ئېلىش ۋە يوقىتىشتا، ئۇنىڭدىن پايدىلاندى. گۇاڭدۇڭ ئۆلكىسىدىكى خۇانەن يىزا ئىگىلىك ئىنستىتۇتى قالدانسىمان پارازىت جىۋىنىنى ئوزۇقلاندۇرۇپ ئۆستۈرۈشتە نۇرغۇن نەجىرىيە توبىلىدى. بەزى يەن تەنقىقاتى ئورۇنلىرى بۇ جەھەتتىكى نەتىقىيات خىزمىتىنى قانات يايدۇرۇۋاتىدۇ.

خىنەن ئۆلكىسىدە پارازىت جىۋىنىنىڭ تۆۋەندىكى تۈرلىرى كۆپ ئۇچرايدۇ:


1. قالدانسىمان پارازىت جىۋىنى

بۇ خىل جىۋىنى تۈكلۈك قارىغاي قۇرۇتى، ياۋا تەكەن كېيىنىڭى، جىراف پەرۋانىسى، ئۆي نەكىنى فاتارلىق كېيىنەك، پەرۋانە تۈركۈمىدىكى ھانارەتلەرنىڭ لىجىنكىلىرىنىڭ تېنىدە پارازىت باشىدۇ.

تاشقى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى يېتىلگەنلىرىنىڭ تېنىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 6~11 مىللىمېتىر بولىدۇ. بېشىنى ئاقۇش بوز رەڭلىك بوزۇندا قاپلاپ تۇرىدۇ. كۆكرىگى قارا بولۇپ، بوز ساغۇچ بوزۇندا بىلەن قاپلىنىپ تۇرىدۇ، دۈمىسىدە ئۇزۇتقا كەتكەن 5 ئال قارا سىرىق بولىدۇ، ئۇنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى بىر تېلى

قىسقا بولىدۇ. قوساق قىسمى قارا، 3-دۈمبە بۇغۇمىنىڭ ئىككى يان تەرىپىدە ئۈچە ئىنىسۇ، كۆرۈنمەيدىغان ساغۇچ فوكۇ، داغ بولىدۇ، 3-5-دۈمبە بۇغۇمىنىڭ ئاساسىدىكى قىسمىنى بوز ساغۇچ نوزۇندا قاپلاپ تۇرىدۇ. ئاخىرقى قىسمىنى قارا بولىدۇ. بارفراپ تۇرىدۇ، 3-ۋە 4-دۈمبە بۇغۇمىدىكى نوزۇندا دۈمبەنىڭ ئوتتۇرا سىزىغىنى بويلاپ ئاخىرىغا بارغانسېرى كەڭلىكى بولۇپ، ھەرقايسى تۇخ بۇلۇكلۇق چىسىمىنىڭ ئاساسى بولىدۇ.

تۇخۇمى ئاي، سۇفۇچاق شەكىلدە بولىدۇ. لىجىنىكىسى ئاي، چىۋىن قۇرۇتى شەكىلدە بولىدۇ. قوچىغى قىزغۇچ قارا، ئۇزۇنچىلىقى بولىدۇ (58-رەسىم).



ياشاش ئادىتى گۇاكدۇڭ ئۆلكىسىدە بىلىمغا 12~13 ئەۋلاد قالدۇرىدۇ. قوچىغى نوپا ئارىسىدا قىشلايدۇ. كىيىنكى يىلى 2-ئايلىق ئاخىرلىرىدىكى 3-ئاينىڭ باشلىرىغىچە. يېنىلىشىنى قوچاقتىن چىقىدۇ، قوچاقتىن چىقىپ، ئىككىنچى كۈنىلا

58-رەسىم قالدۇرغۇچ قارا بۇغۇمىنىڭ ئىككى يان تەرىپىدە ئۈچە ئىنىسۇ، كۆرۈنمەيدىغان ساغۇچ فوكۇ، داغ بولىدۇ، 3-5-دۈمبە بۇغۇمىنىڭ ئاساسىدىكى قىسمىنى بوز ساغۇچ نوزۇندا قاپلاپ تۇرىدۇ. ئاخىرقى قىسمىنى قارا بولىدۇ. بارفراپ تۇرىدۇ، 3-ۋە 4-دۈمبە بۇغۇمىدىكى نوزۇندا دۈمبەنىڭ ئوتتۇرا سىزىغىنى بويلاپ ئاخىرىغا بارغانسېرى كەڭلىكى بولۇپ، ھەرقايسى تۇخ بۇلۇكلۇق چىسىمىنىڭ ئاساسى بولىدۇ.

مەنبە:

1. ئەركىنلىك بىلىمىنى 2. تۇخۇم
3. لىجىنىكىسى 4. قوچىغى 5. لىجىنىكى
- سىمىك كۆكسەك بۇغۇمىدىكى چىسىمىنى بۇغۇمى

ھۇبىلىشىپ، ئۈچىنچى كۈندىن باشلاپ تۇخۇم تۇغىدۇ. تۇخۇملاش مەزگىلى ناھار پەسلىدە 4 كۈن ياز پەسلىدە 3 كۈن بولىدۇ. لىجىنكىسى تۇخۇمدىن چىقىپ قوياققا ئايالانغىچە 7~8 كۈنلا ۋاقىت كېتىدۇ. قوچاق مەزگىلى 10~12 كۈن بولىدۇ. ئاز ساندىكىلىرىنىڭ 20 كۈنگە يېتىدۇ. 10 كۈنلۈك ئوتتۇرىچە تېمپېراتۇرا 26°C قا چىققاندا، بىر ئەۋلادىنى 20~23 كۈن ئىچىدە بېسىدۇرۇپ بولىدۇ.

بىلىگەنلىرى كۆپىنچە ئەتىگەنلىكى. كەچقۇرۇنلۇغى ھەركەت قىلىدۇ، گۈل شىرنىسى ۋە كۆك پىت شىرنىسى يەيدۇ. 6 كۈن ئۆمۈر كۆرىدۇ. كۈن كېيىنكى، پەرۋانە تۈرىدىكىلەرنىڭ لىجىنكىسىنىڭ تېنىگە، بولۇپمۇ كۆكرەك پۈتتىكى يېنىغا تۇخۇم تۇغىدۇ. ھەر بىر پارازىت خوجايىنىغا 2 دىن تۇخۇم تۇغىدۇ. چىشىنىڭ ھەر بىرى 80 ئەتراپىدا تۇخۇم تۇغىدۇ. تۇخۇمى يېپىشقاق سۇنۇقلۇق ئارقىلىق لىجىنكىسىنىڭ تېنىگە مەھكەم چاپلىشالايدۇ. بەزى چاغلاردا سېۋەتكە ھەم بارچىسىگىمۇ تۇغۇپ قويىدۇ. 3~4 كۈندىن كېيىن تۇخۇمدىن لىجىنكىسى چىقىپ ھاشارەت تېنىگە تېشىپ كىرىدۇ. تېشىپ كىرگەن ئورۇندا كىچىك فارا داغ شەكىللىنىدۇ. لىجىنكا ئارقا ھاۋا تۆشۈگىنى كىرىش تۆشۈگىگە توغرىلاپ مۇقىملاشتۇرۇپ نەپەسلىنىدۇ، ئوزۇقلۇغى تۈگەپ كەتسە، ھاشارەت تېنىنى زىدە قىلىپ يۆتكەپ بۇرۇپ يىپ، ئاخىر ئۇنى ئۆلتۈرىدۇ. ئادەتتە تەبىئىيلىق قوچاق مەزگىلىدە ئۆلتۈرىدۇ. بىر پارازىت خوجايىنىنىڭ تېنىدە

ئۈنۈر ھىساب بىلەن 2 لىھىنكا، ئەك كۆپ بولغاندا 5 لىھىنكا پارازىت باشايدۇ. لىھىنكا بېنىلگەندى كېيىن، پارازىت ھوجايە-مىنىك سىندى جىقچى تۇپراققا كىرىپ قوجاققا ئايلىنىدۇ. ئاسراش ۋە پايدىلىنىش زىيانداش ھاشارەنىنىڭ ئالدىنى ئالدىنى ۋە ئۇنى بوغىتىش ئۈچۈن، سۈنئىي ئورۇقلاندۇرۇپ كۆپەيتىپ ئالدىنى بوغۇپ بەرسە بولىدۇ.

2. تۈكلۈك قۇرۇت پارازىت چىۋىنى

خىنەن ئۆلكىسىنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدا ئېلىپ بېرىلغان نەكشۈرۈستىس قارىغاندا، بۇ پارازىت چىۋىنى ئاق تېرەك پەروانىسى، زەھەرلىك سۆگەت كېيىنىكى، سۆگەت پەروانىسى، قوش قۇرۇقلۇق پەروانى، ئۇسشاق فوكۇر تېرەك پەروانىسى، رەھەرلىك كېيىنەك قاتارلىقلارنىڭ لىھىنكىسىنىڭ تېنىدە ياكى قوچىغىدا پارازىت باشايدۇ، بۇ ئاشۇنداق زىيانداش ھاشارەندە-لەرنىڭ مۇھىم كۈنەندىسى بولۇپ، ئۇلارنىڭ كۆپلەپ پەيدا بولۇشىنى خەتەرلىك ھالەتكە ئەلگىلىك رول ئوبىدۇ

قاشى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى بېنىلگىسىنىڭ تىنىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 8~13 مىللىمېتىر بولىدۇ. بېشى ئوق كۈلرەك تۈزۈندە بىلەن قاپلانغان بولىدۇ. جىسىمىنىڭ غولى قارا، ئىنى كۆرۈنۈپ تۇرىدىغان ئۇزۇنغا كەتكەن 4 تال قارامتۇل سىزىغى بولىدۇ. كىچىك بىلاستىنىكىسى فىزغۇچ قوڭۇر بولىدۇ. قوسا قىسمى كۆكۈس قارامتۇل، ئىككى بار نەرىپىدە ئېنىق كۆرۈد.

مەيدىغان تۇنۇق ساغۇچ داغ بولىدۇ. دۈمبىسى ئاقۇش كۈلرەك نۇرۇندا بىلەن چاپلانغان بولىدۇ، ھەرقايسى بوغۇمىنىڭ دۈمبە تەرەپتىكى فىرعاقلرىدا توغرىسىغا كەتكەن بىر تالدىن قارا سېرىق داغ سەكىللەنگەن بولىدۇ. نوزۇدا قەۋەت 3، 4-دۈمبە



بوغۇمىنىڭ ئوتسۇرا سىزىغىسى بويلاپ ئارقا بەرەبىكە بۆرتۈپ چىققان بولىدۇ، ھەرقايسىسى بىردىن ئۈچ بۆلۈك شەكىلدىكى ئۆتكۈر چىشىنى شەكىللەندۈرىدۇ. سۇكا توغرىسىغا كەتكەن

قارا داغ "M" شەكىللىك داغغا ئوخشاش. 59-رەسىم تۈكلۈك قۇرۇت شايىدۇ (59-رەسىم).

ياشاش ئادىتى بىر بىلىدا قالدۇرىدىغان ئەۋلادىنىڭ سانى ئىسسىق ئەمەس. بىر ئەۋلادىسى بېتىشسۇرۇش ئۈچۈن ياز پەسلىدە 16~18 كۈن كېتىدۇ. يېتىلگىنى كۆپىنچە چۈشتىن بۇرۇن قوچاقنىڭ چىقىپ، پارازىت خوجايىنى تېنىنىڭ يان تەرىپىگە بىر نۇخۇم نۇغۇپ، تۇخۇمنى پارازىت خوجايىنى بوستىغا يېپىش-نۇرۇت قويدۇ. نۇغۇپ بولغاندىن كېيىن كېتىپ قالىدۇ ياكى ئۇدا بىر قاسىچە قېتىم تۇغىدۇ، تۇخۇمنى 5 ياشتىن ئاشقان لىجىنىكا ئەك ئاسان بېيىشسۇرىدۇ. نۇخۇمى ئاق، سوقچاق بولىدۇ. كېيىن سېرىق بولۇپ قالىدۇ. تۇخۇم مەزگىلى 4~5 كۈن بولىدۇ. لىجىنىكا تۇخۇمدىن چىققاندىن كېيىن ئادەتتە ساكالىدى ئايرىلىپ كەتمەيدۇ. ئاغزى ئارقىلىق پارازىت خوجايىنى

تىنىدىن كىچىك بىر تۆشۈك ئىچىۋېلىپ، ئاندىن ئاستا-ئاستا ئىچكىرىلەپ كىرىدۇ. لىجىنكا مەزگىلى 4~5 كۈن بولىدۇ، ئىككى قېتىم تۈلەپ يېتىلىپ بولىدۇ. لىجىنكىلىرى بىر بىرىنى ئۆلۈر-مەيدۇ، ئوخشاش بىر پارازىت خوجايىسى بىندە بۇرغۇلىغان بەككە نەن بىر ۋاقىتتا پارازىت باشايدۇ. لىجىنكا بېسىپ بولۇشقا بىر قانچە سائەت قالغاندا، پارازىت خوجايىسى ئۆلۈرۈپ، ئۇنىڭ تىنىدىكى توقۇلمىلارنى پۈتۈنلەي يەپ بۈگۈنىدۇ ياكى كۆپ قىسمىنى يەپ بولىدۇ. چۈنكى قۇرۇتسىك كۆپ قىسمىنى يېتىلىپ بولۇش ۋاقتى پارازىت خوجايىسىنىڭ قۇرۇق دەۋرىگە توغرا كېلىدۇ، ئاز ساندىكىلىرىنىڭ بېسىپ بولۇش ۋاقتى پارازىت خوجايىسىنىڭ لىجىنكا مەزگىلىگە توغرا كېلىدۇ. چۈنكى قۇرۇق بولغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ كۆپ ساندىكىلىرى پارازىت خوجايىسىنى تېشىپ چىقىپ 1~5 سائەتتىن چوڭقۇر بويىنىڭ ئارىسىغا كىرىپ قۇرۇققا ئايلىنىدۇ. ئاز ساندىكىلىرى پارازىت خوجايىسى تېنىدە قېلىپ، بۇ ئارىسىغا قۇرۇققا ئايلىنىدۇ. قۇرۇق مەزگىلى 8~9 كۈن بولىدۇ.

ئاسراش ۋە پايدىلىنىش قانداق بولسا پارازىت چۈشۈش بىلەن ئوخشاش.

3. پارازىت ياشايدىغان باشقا چىمۋىلەر

1. يېپىشقاق قۇرۇتتىكى پارازىت چىمۋىسى بېسىلگىنى ئوتتۇرا ھال چوڭلۇقتا، رەڭگى بوز قوڭۇر بولىدۇ، بېسىك

ئۇزۇنلۇغى 15 مىللىمېتىر ئەتراپىدا بولىدۇ. غولىدا ئاقۇش كۈلرەڭ تۈزۈندا بولىدۇ. ئۇزۇتغا كەتكەن 4 تال قارا سىزغۇ بولىدۇ. كىچىك قالقانسىمان پىلاستىنكىسى قىزغۇچ قوڭۇر بولىدۇ، قوساق فسىمىدا ئاقۇش كۈلرەڭ تۈزۈندا بولىدۇ. دۈمبىسىنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئۇزۇتغا كەتكەن فارامتۇل داغ بولىدۇ، ئىككى يان تەرىپى قىزغۇچ قوڭۇر بولىدۇ (60-رەسىم). بۇ خىل چىۋىن يېپىشقا قۇرۇت، موچى قۇرۇت فاتارلىق كۈن كېپىنىڭ، پەرۋانە تۈرىدىكى ھاشارەتلەرنىڭ لىجىنكىسىنىڭ تېنىدە ۋە قوچىغىنىڭ ئىچىدە پارازىت ياشايدۇ. 1965-يىلى 4-ئاينىڭ 12-كۈنى خېنەن ئۆلكىسى شىنچېڭ ناھىيىسىنىڭ



60-رەسىم يېپىشقا قۇرۇتنىڭ پارازىت ھەرىسى

61-رەسىم ئۆي تەككىنىڭ پارازىت چىۋىنى

چىلانلىق رايونىدا ئېلىپ بېرىلغان تەكشۈرۈشتە، چىلاندا بولىدىغان موچى قۇرۇتنىڭ قوچىغى ئىچىدە بۇ خىل چىۋىنلەرنىڭ يېتىلگەنلىكى مەلۇم بولغان.

2. ئۆي تەككىنىڭ پارازىت چىۋىنى يېتىلگىنىنىڭ جۇغى

ئوتتۇراھال، رەڭگى بوز ساغۇچ بولىدۇ، تېنىنىڭ ئۇزۇنلۇغى 9~14 مىللىمېتىر بولىدۇ. غولىدا ئۇزۇتسىغا كەتكەن 4 تال سىزىق بولىدۇ. قوساق قىسمىنىڭ ئىككى يان تەرىپى قىزغۇچ قوڭۇر بولىدۇ. دۈمبىسىنىڭ ئوتتۇرىسىدا قارا سىزىق بولىدۇ (61-رەسىم).

بۇ خىل چىۋىن كۈن كېيىنىكى، پەرۋانە تۈرىدىكى ھاشا-رەتلەرنىڭ لېچىنىكىسىنىڭ تېنىدە پارازىت ياشايدۇ. لېچىنىكىسى پارازىت خوجايىنى تېنىدىكى سۇيۇقلۇق بىلەن ئوزۇقلىنىدۇ.

3. تۈكلۈك قارىغاي قۇرۇتىنىڭ تار پىشانە پارازىت چىۋىنى يېتىلگىنىنىڭ تېنى 6.5~9 مىللىمېتىر، بېشى قىسقا ھەم كەڭ بولىدۇ، پىشانىسى بەك تار بولىدۇ، سەزگۈ بۇرۇتى قارا بولىدۇ. كۆكرەك قىسمى قارا، ئاقۇش بوز تۈزۈندە بىلەن قاپلانغان بولىدۇ، دۈمبىسىدە ئۇزۇتسىغا كەتكەن 3 تال قارا سىرىق بولىدۇ، قوساق قىسمى قارا، 2~4-دۈمبە بوغۇمىنىڭ ئىككى يان نەرىپىدە سېرىق داغ بولىدۇ (62-رەسىم).


4. ئۇزۇن پۇتلۇق پارازىت چىۋىنى يېتىلگىنىنىڭ حۇغى ئوتتۇراھال، رەڭگى بوز بولىدۇ. پۇتى، تۇمشۇغى ئالاھىدە ئۇزۇن بولىدۇ، پۇتى تۇمشۇغىدىن 1.5 ھەسسىدىن كۆپرەك ئۇزۇن بولىدۇ. يۈتۈن بەدىنىنى ئاق تۈزۈندە قېلىن قاپلىغان، دۈمبىسى ئاقۇش بوز، قىزغۇچ قوڭۇر بولىدۇ، دۈمبىسىنىڭ جىك ئوتتۇرىسىدا ئۇزۇتسىغا كەتكەن قارا سىزىق بولىدۇ. ئىككى بان نەرىپى سۇس سېرىق بولىدۇ. تېنىنىڭ ئاخىرىسى قارا بولىدۇ

(63-رەسىم).

كۈن كېيىنكى، پەرۋانە تۈرىدىكى ھاشارەتلەرنىڭ لېجىنىكىسىنىڭ سىنىك ۋە ماي قوڭغۇزى لېجىنىكىسىنىڭ بېنىدە پارازىت ياشايدۇ.



62-رەسىم تۈكلۈك قارىغاي
فۇرۇتىنىڭ تار پىشانە
پارازىت چىۋىنى



63-رەسىم ئۇزۇن پۇتلۇق
پارازىت چىۋىن

5. قوڭغۇر قۇيرۇقلۇق كىچىك كەندىر چىۋىنى بېتىلىگەندە، لىرىنىڭ جۇغى ئوتتۇراھال، رەڭگى بوز بولىدۇ، پارقىرىمايدۇ. تېنىنىڭ ئۇزۇنلۇغى 10~12 مىللىمېتىر بولىدۇ. غولدا ئاقۇچ بوز تۈزۈندە قەۋىتى بولىدۇ، ئۇزۇنغا كەتكەن ئېنىق كۆرۈنىدە. دىغان ئۇچ تال قارا سىزىق بولىدۇ. قوساق قىسمى ئىنچىگە ئۇزۇن بولىدۇ، دۈمبىسىدە رەتسىز جايلاشقان قارا داغلار بولىدۇ.

(64-رەسىم).

بۇ خىل چىۋىن كۈن كېيىنكى، پەرۋانە تۈرىدىكىلەرنىڭ لېجىنىكىسىنىڭ تېنىدە پارازىت ياشايدۇ.

6. ئاجىماق تۇمشۇق كۆكۈيۈن بېتىلگەنلىرىدىكى جۇغى ئونسۇراھال، رەككى قارا، پۈتۈن تېنىدە قويۇق ئۆسكەن سۈس سېرىق، ئىنچىكە، ئۇزۇن تۈك بولىدۇ. نۇمشۇغى ئۇزۇن بولۇپ، ئالدى نەرەپكە چىقىپ تۇرىدۇ. ئۇزۇنلۇغى ئۆزىدىكى نۇرۇنلۇغىدىكى 3 تىن 1 قىسىمغا تەڭ كېلىدۇ. ئالدىنقى قاننى بار، ئۇرۇن، قاننىڭ ئالدى قىرغىقى پارامىتۇل قوكۇر بولىدۇ. ئوتتۇرا قىسمى دولقۇنسىمان بولىدۇ. قوساق قىسمى دىخماق، قويۇق ئۆسكەن ساغۇچ ئىنچىكە ئۇزۇن تۈكلەر بىلەن قاپلانغان بولىدۇ. نىسبەت ئۇزۇنلۇغى 7~11 مىللىمېتىر كېلىدۇ (65-رەسىم).



64-رەسىم فوگۇر قۇيرۇقلۇق كىچىك كەندىر چىۋىنى

65-رەسىم ئاچىماق تۇمشۇق كۆكۈيۈن

بېتىلگەنلىرى كۆك پىت، يوبۇرماق نومۇز قۇرۇنى قاتارلىق بۇمشاق تەنلىك زىيانداش ھاشارەنلەرنىڭ نىسبەتتىكى سۇبۇقلۇقى سەن ئوزۇنلىنىدۇ.

7. ئۇزۇن تۇمشۇق كۆكۈيۈن بېتىلگەنلىرىدىكى تېشى

9~11 مىللىمېتىر، رەڭگى قارا، ئاق بولىدۇ، ئىنچىكە ئۇزۇن تۈكى بولىدۇ. دۈمبىسىنىڭ بوغۇملىرى قارا، قولتۇغى سۈيى



66-رەسىم ئۇزۇن تۇمشۇق كۆكۈيۈن


سېرىق بولىدۇ، ئۇزۇن تىكەسىمان تۈكى بولىدۇ. قوساق قىسمىدا ئاق تۈك بولىدۇ، تۇمشۇغى ئىنچىكە، ئۇزۇن بولىدۇ (66-رەسىم).

پارازىت ياشاش ئادىتى يۇقۇ-رىدا ئېيتىلغان تۈرنىڭكىگە ئوخشاش.

3. تاغىل تىۋىتلىق قالىقانلىق قوڭغۇز

تاغىل تىۋىتلىق قالىقانلىق قوڭغۇز يالىكاج عومالۇق ئۇزۇن بۇرۇنلۇق قوڭغۇزنىڭ لىچىنىكىسىدا باشابدىغان مۇھىم كۈشەندە ھاشارەت. پارازىت خوجايسى مەخسۇس بولىدۇ. خۇبېي ئۆلكەسىنىڭ تېنمېن رايونىدا ئېلىپ بېرىلغان تەكشۈرۈشكە ئاساسلانغاندا، بىر تۈپ دەرەخنى پارازىت ئاشاش نىسبىتى ئەڭ يۇقىرى بولغاندا 70% تىن ئارتۇق بولىدىكەن. خېنەن ئۆلكىسىدە تېخى تەكشۈرۈپ چىقىلمىدى.

تاشقى كۆرۈنۈش ئالاھىدىلىكى يېتىلگىنىنىڭ تېنىنىڭ ئۇزۇنلۇغى 5~10 مىللىمېتىر، رەڭگى پارامتۇل قوڭۇر بولىدۇ. قاتتىق قانتىنىڭ يۈزىدە قوڭۇر ياكى بوز قوڭۇر بەككىچە



داغلار بولسدۇ ھەمدە چېكىت ۋە ئوچۇق كۆرۈنىدىغان 4 تال چوڭقۇر ئېرىقچە بولسدۇ. تۇخۇمى ئاق، ئۇزۇنچاق بولسدۇ. لىچىنكىسىنىڭ ئۇزۇنلۇغى 10~15 مىللىمېتىر، ئاق، چىۋىن قۇرۇتى شەكلىدە بولسدۇ (67-رەسىم).

ياشاش ئادىتى قالدۇرىدىغان 67-رەسىم تاغىل تىۋىتلىق

قالقانلىق قوڭغۇز

1. بېتىلگىنى ؟ قوجاقتا
- پارازىت ياشاش ئەھۋالى.
3. لىچىنكىسى

ئەۋلادىنىڭ سانى ئېنىق ئەمەس، يېتىلگەنلىرى دەرەخ قوۋزىغىنىڭ يېرىقلىرىدا، ئۇزۇن بۇرۇتلۇق قوڭغۇز تەرىپىدىن چىرىتىلگەن

تۆشۈكلەردە ۋە دەرەخنىڭ كامارلىرىدا قىشلايدۇ، كىيىنكى بىلى 2-ئايدا يېتىلىپ ھەركەتلىنىشكە باشلاپ، پارازىت خوجايىنى تېپىپ، ئۇنىڭ تېنىگە تۇخۇم تۇغىدۇ. 4-ئاينىڭ باشلىرى ئۇنىڭ تازا تۇغىدىغان مەزگىلى بولدى. بىر دانە ئۇزۇن بۇرۇتلۇق قوڭغۇز لىچىنكىسىنىڭ تېنىدە تاغىل تىۋىتلىق قالقانلىق قوڭغۇز لىچىنكىسىدىن 1~27سى ياشايدۇ ھەمدە ئۇ ئۇزۇن بۇرۇتلۇق قوڭغۇز لىچىنكىسىنىڭ يېتىلىشىگە ئەگىشىپ نەدرىجى يېتىلىدۇ. ئۇزۇن بۇرۇتلۇق قوڭغۇز لىچىنكىسى فېرپ، ئوۋا ياساب قوجاقتا ئايلىنىشقا باشلىغاندا، بالدۇرراق يېتىلگەن تىۋىتلىق تاغىل قالقانلىق قوڭغۇز لىچىنكىسى ئۇنىڭ لىچىنكىسىنىڭ پوسىنى نېشىپ

جىغىپ كىندۇ. ناغىل تىۋىنلىق قالغانلىقى فوڭغۇزنىڭ لېيىتىسى ئاستا ھەركەتلىنىدۇ، يۇمران شاخنىڭ پوستىدى ئورۇقلاندى. لېكىن ئوزۇقلىنىش مىقدارى ناھايىتى ئاز بولدى. كۈچلۈك نۇردىن قورقۇدۇ، كۈندۈزى دەرەخ قوۋزىغىنىڭ بىرىقلىرىدا ۋە دەرەخنىڭ كامارلىرىدا يوشۇرۇنۇپ تۇرىدۇ. ئاخشىمى ۋە كېچىسى ھەركەتلىنىپ پارازىت خوجايىنىنى تېپىپ، ئۇنىڭ تېنىگە تۇخۇم تۇغۇپ پارازىت ياشايدۇ. ئۆلگەن بولۇپ بېسىۋېلىشنى سىلىدۇ، ئۇچۇش ئىقتىدارى ئاجىز، بىر بىرىنى ئۆلتۈرىدۇ.

ئاسراش ۋە پايدىلىنىش ناغىل تىۋىنلىقى قالغانلىقى فوڭغۇز يالاكەتلىك بولىدۇ، شۇڭا ئۇنى سۈنئىي يول بىلەن ئاسراشقا، بۇنىڭ قۇيۇشقا توغرا كېلىدۇ. ئادەتتە ئۇ كۆپرەك پەيدا بولغان دەرەخقە ئوت-چۆپتى بەلباغ باغلاپ قوبۇلسا، ئوت-چۆپ ئىچىگە كىرىپ يوشۇرۇنىدۇ، كېيىن ئۇنى يېشىپ ئۇزۇن مۇددەتلىق فوڭغۇز لىجىنىكىسى بار دەرەخكە باغلاپ قويسا، ئۇ پارازىت ياشاش ئىمكانىيىتىگە ئىگە بولىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا، دەرەخنىڭ شېھىدا باقى كامارلىرىدا تاغىل تىۋىنلىقى قالغانلىقى فوڭغۇز بارلىقى سېزىلگەندىمۇ، ئۇنى مۇۋاپىق ئاسراپ، ئۆز ۋاقتىدا پارازىت خوجايىنىنى ئار جايغا يۆتكەپ قويۇش كېرەك.

ئۈچىنچى باب

كۈشەندە ھاشارەتلەرنىڭ نۇسخىلىرىنى يىغىش ۋە ساقلاش

كۈشەندە ھاشارەتلەرنىڭ تۈرىنى، تارقىلىشىنى ۋە نىسبىتىنى بىلىش كۈشەندە ھاشارەتلەردىن پايدىلىنىپ، زىيانداش ھاشارەتلەرنى تىزگىنلەشنىڭ ئالدىنقى شەرتى. شۇنىڭ ئۈچۈن، ئۇنىڭ نۇسخىلىرىنى بىلىش، ساقلاش ئىنتايىن مۇھىم.

كۈشەندە ھاشارەتلەرنىڭ تۈرى ناھايىتى كۆپ، يوشۇرۇن-دىغان ماكانى ۋە باشلىق ئۇسۇلى بىر بىرىنىڭكىگە ئوخشىمايدۇ، بىلىش، ساقلاش ئۇسۇلىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ، ھازىر كۈشەندە ھاشارەتلەرنىڭ ئوخشاش بولمىغان بېتىلىش مەزگىلى ۋە باشلىق ئالاھىدىلىكىنى تۆۋەندە چىقىرىپ تونۇشتۇرىمىز.

1. تۇخۇم ئىچىدە پارازىت ياشايدىغان

ھاشارەتلەرنىڭ نۇسخىلىرىنى

يىغىش ۋە ساقلاش

قىزىل كۆرلۈك ھەرە، چاققاق كىچىك ھەرە قاتارلىق بەزى پارازىت ھەرەلەر زىيانداش ھاشارەتلەرنىڭ تۇخۇمى ئىچىدىلا



پارازىت ياشايدۇ. بۇ پارازىت ھەرلەرنىڭ تۇرىسىنى تارقىتىش ئەھۋالىنى ۋە پارازىت ياشاش نىسبىتىنى بىلىش ئۈچۈن ئالدى بىلەن رىبانداس ھاشارەتلەر تۇخۇم تۇمىدىغان مەزگىل ۋە ماكاننى شۇنىڭدەك تۇخۇمنىڭ شەكلىنى، چوڭ-كىچىكلىكىنى، رەڭگىنى، تىزىلىش شەكلىنى بىلىش لازىم. تۇخۇمنى تاپقاندىن كېيىن، ئۇنى يېپىشقان نەرسىلەر بىلەن فوشۇپ ئاستا ئېلىپ، ئايرىم-ئايرىم ئەينەك نەيچىگە سېلىپ، ئاغزىنى سۇلباۋ پەردە بىلەن ئېنىپ، ئۇنىڭ پارازىتلىنىش نىسبىتىنى تەپسىلى تەكشۈرۈش لازىم. فارىدىغانلىكى تۇخۇمنىڭ كۆپىنچىسى پارازىتلىغان بولىدۇ. ئەينەك قۇتىنىڭ تېگىگە ئازراق سۇ شۇمۇرىدىغان فەسەز ياكى دېزىنفىكسىيە قىلىنغان باخنا فويۇلۇشى كېرەك. ئەگەر ھاۋا بەك قۇرغاق بولۇپ كەتسە، ئەسەك قۇتىنى قابىلى سۇغا چىلانغان باخنا كالىلىگى بىلەن بوشراق نەملەپ قويسا بولىدۇ. ئەينەك قۇتىنىڭ ئاغزىنى كۈن بۇرى حۈسكەن تەردىگە قارىتىپ قويسا، يېتىلگەن ھەرە چىققاندىن كېيىنلا ئۇچۇپ كېلىپ ئەينەك قۇتىنىڭ ئاغزىغا توپلىشىدۇ. ئاندىن كېيىن ھەرنى پارازىت خوجانىنىڭ تۇخۇمى بىلەن قوشۇپ %70 لىك ئىسپىرتقا چىلاپ قويۇش لازىم، ئاندىن كېيىن كىچىك ئەينەك قۇتىنى چوڭ قۇتىنىڭ ئىچىدىكى ئىسپىرتقا سېلىپ ساقلىسا بولىدۇ. ئەگەر دەرھال تەكشۈرۈشكە توغرا كەلسە، تىرىك ھەرلەرنى تەجرىبە نەيچىسىگە سېلىپ، $40^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ لۇق ئىسسىق سۇ قۇبۇپ چالغۇد-دۇرۇپ، ھەرلەرنى كۆيدۈرۈپ ئۆلتۈرۈش، ئاندىن كېيىن

70% لىك ئىسىمىزىغا 30~60 مىنۇت جىلاب قوبۇش لازىم، سۇنىڭدىن كېيىن، نېسى بۇزۇلۇپ كەتمىگەن ئەركەك، چىش-لىرىنى تاللاپ ئەبەككە ئېلىپ، قوش كۆزلۈك ئوپىراتسىيە مىكروسكوپى ئاستىغا قوبۇپ، تۈزەشتۈرۈپ ۋە ئۈستىگە يىلىم تېمىتىپ، ئەينەك بىلەن بېپىپ، كۈن نەگمە بىدەن ئورۇندا قۇرۇتقاندىن كېيىن كۈزەتسە بولىدۇ. ئەگەر قۇرۇپ كەتكەن ئۆلۈك ھەرىدى بۇسقا ئېلىشقا توغرا كەلسە، ئاۋال ھەرىنى 5% لىك ئويغۇچى باتىرى سۇيۇقلۇغىغا جىلاب يۇمشىغۇچە قىزدىتىش، ئاندىن كېيىن يۇفۇرىدىكى ئۇسۇل بىلەن بۇسقا ئېلىش لازىم. ئەگەر ئەركەك ھەرىدىكە ئاشقى جىنىسى ئەزاسىنى كۈرتىشكە توغرا كەلسە، ھەرىنى ئەبەككى ئۈستىگە قويۇپ، فوسغىنى ئاسمانغا فىلىپ، تۆۋەن ھەسسىلىك (100 ھەسسىلىك) مىكروسكوپ ئاستىدا تاشقى جىنىسى ئەزاسىنى تەكشۈر-گەندىن كېيىن، ئاندىن فوتس كۆزلۈك ئوپىراتسىيە مىكروسكوپى ئاستىغا قويۇپ، ئىنچىكە ئوپىراتسىيە بىكىنىسى ئارقىلىق تاشقى جىنىسى ئەزاسىنى چىقىرىۋېلىپ، باشقا توقۇلمىلىرىنى تازىلاپ چىقىرىۋېتىپ، ئۈستىگە يىلىم تېمىتىپ، ئەينەك بىلەن بېپىپ قوبۇش لازىم، بۇ چاغدا ئۇ ئىشلىتىشكە تەييارلانغان بولىدۇ. يۇقۇرىدىكى ئىشى ئىشلىگەن چاغدا، تۇخۇمنىڭ يارازىتىلىش نىسبىتىنى، سانىنى تۈنۈككە ئۇنىڭ فايىسى خىل بارازىت خوجايىنىنىڭ تۇخۇمى ئىكەنلىكىنى خاتىرىلەش لازىم. زۆرۈر تېپىلغاندا، پارازىت خوجايىنىنىڭ نۇخۇمىنى سۈنمى ئۇسۇل

سەلەن بېغىپ يېتىشتۈرۈلگەن ھاسارەتكە تايلاندىۋرۇسقا بوغرا كېلىدۇ.

2. لىچىنىكىدا پارازىت ياشايدىغان ھاسارەتلەرنىڭ نۇسخىلىرىنى يىغىش ۋە ساقلاش

زىيانداش ھاسارەتلەرنىڭ لىچىنىكىسىنى كۈزەتكەندە مۇنداق ئەھۋالى بايقاش مۇمكىن، يەنى ئۆسۈپ يېتىلىشى ناچار، ھەر-كىمى غەيرى نورمال بولغانلىقى ھاسارەتلەرنىڭ تېنى بارازىت-لاغان بولۇشى مۇمكىن، بۇنداق ئەھۋال ئاستىدا، ئۇنى يىغى-ۋىلىپ سۈننى يوسۇندا بېقىشقا بوغرا كېلىدۇ. بېقىش جەريانىدا، بەرى ھاسارەت لىچىنىكىسى پالەچ بولۇپ، كېيىن قېتىپ قالغان بولسا، بۇ ھال پارازىتلانغانلىغىنىڭ ئاقىۋىتى بولۇشى مۇمكىن. ئەگەر لىچىنىكا تېنىدىكى كىچىك ھەرە ئۇچۇپ چىقسا ياكى نېنىنىڭ سىرتىدا بېلىق غوزەك ھاسىل بولغان بولسا، ئۇنىڭدا كىچىك غوزەك ھەرىسى پارازىت ياشىغان بولۇشى مۇمكىن. بۇ چاغدا، كىچىك غوزەكنى ياكى لىچىنىكىنى ئەينەك نەيچىنىڭ ئىچىگە سېلىپ، نەملىگىنى ساقلاش، يېتىلگەن ھەرە چىققاندىن كېيىن %70 لىك ئىسپىرت ئىچىدە ساقلاش لازىم. بەزى چاغ-لاردا زىرائەتلىك ياكى ئورمان. مۇسلىك دەرەخنىڭ شاخ،

يۈپۈرماقلىرىدىمۇ بارارنىلاشغان ھاسارەت ئۇچرات تۇرىدۇ، ئۇنىڭ تېنىدە ياكى ئەتراپىدا نۇرغۇن ھاسارەت بىمىسى بولسا ھەمدە ئاق ياكى ساقۇچ كىچىك غوزەك بولسا، بۇلارمۇ كىچىك غوزەك ھەرىسى نەرىپىدىن پارازىتلانغانلىقىنىڭ بەلگىسى بولىدۇ. بۇ چاغدا ھاسارەتسى يىمپىلىق غوزەك بىلەن قوشۇپ يىمىپ ئېلىپ كېىپ، ئۇنىڭدىكى ھەرە چىقىرىۋېتىلسە بولىدۇ.

3. قوچاق ئىچىدە پارازىت ياشايدىغان ھاسارەتلەرنىڭ نۇسخىلىرىنى يىمىش ۋە ساقلاش

ھاسارەت قوچىسىنىڭ پارازىتلىنىشى ئەھۋالىنى ئادەتتە پارازىت خوجايىنى قوچىغىنىڭ ھەرىكىتىگە قاراپ بايقاش مۇمكىن. پارازىت-لايغانلىقى قوچاق قىتىپ قالغان بولىدۇ، قوسىنى نۇفۇز قوبسا، مىدىرلىماندۇ، ساغلام قوچاق بولسا مىدىرلايدۇ. بۇنداق قوچاقنى ھاسارەت بىقىسى ھەپتىدە ياكى تۇپراققا بىقىپ، ھەرە چىققا-دىن كېىن %70 لىك ئىسپىرتقا سىلىپ ساقلىسا بولىدۇ. بەزى نۇفال ھەرىسلەر رىئەتداش ھاسارەتنىڭ لىجىنىكىسى نىسىگە تۇخۇم تۇغىدۇ، پارازىت خوجاىنىڭ قوچاققا ئايلىنىشى بىلەن، ئۇمۇ قوچاقنىڭ ئىچىدە بىتىلىدۇ ۋە رەسىمى بىسىلگەندىن كېىن قوچاقنى تېىپ چىقىدۇ. شۇڭا بۇنداق ھەرىسى دۇررىد.

خوجايىسى لىچىنكىسى بىلەن باققاندىلا، ئاندىن يېتىلدۈرگىلى بولىدۇ.

فېشلىق قوچاڧىك ئىككىنچى بىلى ناھارەتچە ساق تۇرۇشقا كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن، ئۇنى قەپەزگە سېلىپ، ئۈستىنى سىم نور بىلەن، نېگىنى داتلاشمايدىغان تور بىلەن ئېتىپ، مېئال نەھسىگە قويۇپ، تەھسىنىك ئىچىگە نونىقىچە پاكىز سۇ قۇيۇش، ئۇنى قۇرۇتۇۋەنمەسلىك لازىم. قوچاڧى قەپەز تېگەدىكى بىلىنر قەھسىزى ئۈستىگە ياكى فەغەز سىلىندىرنىڭ ئىچىگە سېلىپ قويۇش، ئۇنى نەھسىدىكى سۇغا چىلىشىپ فالمايەدىغان قىلىش كىرەك. بۇپراقنا فېشلىغان قوچاڧى ساپال نەھسەككە سېلىپ، سىرتىسى دانلاسمابىدىغان نور بىلەن بۆگەپ بۇپراقنا كۆمۈپ قوبۇس لازىم. قوچاڧىك كۆمۈلۈش چوڭقۇر-لۇغى نەھسى ئەھوال بىلەن ئوخشاش بولۇشى لازىم.

4. يېتىلگەن كۈشەندە ھاشارەتلەرنىڭ نۇسخىلىرىنى يېغىش ۋە ساقلاش

خانىقىز، ئالبۇن كۆر، ھەرە، چىرىپاسكا، ماخدامى قوڭغۇز قاتارلىق كۈشەندە ھاشارەتلەرنىڭ يېتىلگەنلىرى ھاشارەت نۇنۇس نورى ياكى قىسقىچ قاتارلىق ئەسۋاپلار ئارقىلىق تۇتۇپ كىلىنىدۇ كىمىن. رەھەرسىك قۇتىغا سېلىپ ئۆلتۈرۈلىدۇ. پاخنا كالىگىنى DDW غا چىلاپ قۇتىنىڭ تېگىگە قوبۇپ،

ئۈستىنى فانتىنى قەغەز پارچىسى بىلەن يېپىپ قوبىسلا بولىدۇ. ئۈستىگە ئىچىگە سېلىنغان ھاشارە زەھەرلىنىپ ئۆلىدۇ-دە. ئاندىن ئۇنى ئېلىپ، يىكەنە بىلەن ساقچىپ قوبۇي ياكى قۇرۇ-بۇپ ساقلىسا بولىدۇ.

بۇ خىل كۈشەندە ھاشارەتلەرنىڭ لىجىنىكىلىرى (بالىلىرى) باكى قوچمىنى شۇ پېتىلا %70 لىك ئىسپىرتقا سېلىپ ساقلىسا بولىدۇ.

5. كۆك پىت، قاسراقلىق قۇرۇتنىڭ كۈشەندىلىرىنى يىغىش ۋە ساقلاش

كۆك پىت، قاسراقلىق قۇرۇت فاتارلىق ھاشارەتلەرنىڭ كىچىك بارازىت ھەرلىرىنى يىغىش ئۈچۈن، ئۇلارنى جۈمۈلە ۋە خانقىز بۇرىدىغان جايلاردىن ئىزلەشكە توغرا كېلىدۇ، چۈنكى ئۇلار ھەمىشە ئورتاق ياشايدۇ. بارازىتلانغان كۆك پىتنىڭ فوسىغى كۆپۈپ قالىدۇ، ھەركەت قىلىش ئىقتىدارىنى يوقىتىدۇ، سۇس سېرىق باكى قارا بولۇپ قالىدۇ، پوستى قېتىپ قالىدۇ. قاسراقلىق قۇرۇت توپى ئارىسىدىن قاسرىغىدا بېتىلگەن ھەرە جىققان تۆشۈگى بارلىرى مەلۇم بولسا، ئۇنى بارازىت ھەرە نەزىرىدىن پارازىتلانغان دېيىشكە بولىدۇ. كۆك پىت ياكى

قاسراقلىق قۇرۇت ياشىغان شاخنى سۇ قاچىلايدىغان ئەينەك قۇتقا سېلىپ، ئاغزىنى پاختا بىلەن ئېتىپ قويسا، كۆك پىت ياكى فاسراقلىق قۇرۇتتىكى تېنىدىن پارازىت ھەرىسلەر كەينى-كەينىدىن چىقىدۇ، شۇنىڭدىن كېيىن ئۇنى %70 لىك ئىسپىرتقا چىلاپ ساقلىسا بولىدۇ.

قوشۇمچە: كۈشەندە ھاشارەتلەرنىڭ خەنزۇچە نامى ۋە ئىلمىي نامى بىلەن ئۇيغۇرچە ئاتىلىشىنىڭ سېلىشتۇرۇلمىسى

七星瓢虫	يەتتە داغلىق خانقىز
<i>Coccinella septempunctata</i> L.	
黑缘红瓢虫	فارا حسەكلىك قىزىل خانقىز
<i>Chilocorus rubidus</i> Hope	
二星瓢虫	ئىككى داغلىق خانقىز
<i>Adonia bipunctata</i> L.	
四斑月瓢虫	تۆت داغلىق خانقىز
<i>Chilomenes quadriplagiata</i> Swartz	
深点食蚜瓢虫	سالجا بەددىغان فارا خانقىز
<i>Stethorus punctillum</i> Weise	
龟蚊瓢虫	تاغىل خانقىز
<i>Propylaea japonica</i> Thunberg	
红点唇瓢虫	قىزىل داغلىق خانقىز
<i>Chilocorus kuwanae</i> Silvestri	
多异瓢虫	ئۆزگىرىشچان خانقىز
<i>Adonia variegata</i> Goeze	
异色瓢虫	عەيرى تۈسلۈك خانقىز
<i>Leise axyridis</i> (Pallas)	

大草蛉	چوك ئالتۇن كۆز
<i>Chrysopa septempunctata</i> Wesmael	
丽草蛉	چىپار ئالتۇن كۆز
<i>Chrysopa formosa</i> Brauer	
中华草蛉	جۇڭخۇا ئالتۇن كۆزى
<i>Chrysopa sinica</i> Tjeder	
叶色草蛉	يېشىل ئالتۇن كۆز
<i>Chrysopa phyllocoroma</i> Brauer	
长脚胡蜂	ئۇزۇن يۇتلۇق سېرىق ھەرە
<i>Polistes yokohame</i> (Radoszkowski)	
蚊胡蜂	تاغىل سېرىق ھەرە
<i>Vespa crabroniformis</i> Smith	
黄唇蜾蠃蜂	سېرىق تۇمشۇق ھەرە
<i>Rhynchium brunneum</i> Fabricius	
蜾蠃蜂	بوغماق ھەرە
<i>Eumenes</i> sp.	
红腰泥蜂	قىزىل بەل لاي ھەرسى
<i>Amnophila aenulans</i> Kohl.	
带蚊土蜂	تاغىل تويا ھەرسى
<i>Campsomeris</i> sp.	
刺胸金蜂	تىكەنلىك سېرىق ھەرە
<i>Chrysis</i> sp.	

强力蛛蜂	قزىل قانلىق ھەرە
<i>Batozonellus lacerticida</i> Pallas	
日本砂蜂	باپونىبە ھەرسى
<i>Bembicinus japonicus</i> Sonan	
二点螳螂	ئىككى داغلىق ياچىۋەك
<i>Hierodula saussurei</i> Kirby	
螳蛉	ياچىۋەك باشلى ئالتۇن كۆز
<i>Mantispa japonica</i> Mac Lachlan	
尖头长角蛉	ئۇزۇن بۇرۇتلۇق ئالتۇن كۆز
<i>Hybris subjacens</i> Walker	
粉蛉	توزاك قاناتلىق ئالتۇن كۆز
<i>Coniopteryx</i> sp.	
金星步甲	چىپار ماگدامجى قوڭغۇر
<i>Calosoma maderae</i> Fabricius	
	مامازشام ماگدام قوڭغۇزى
<i>Pheropsophus jessoensis</i> Morawitz	
砂地虎甲	فۇملۇقتا ياشايدىغان تاغلى قوڭغۇر
<i>Cicindela eilsae</i> Mats.	
中华虎甲	خۇڭخۇا تاغلى فوڭغۇزى
<i>Cicindela chinensis</i> Degeer	
大蜻蜓	خوك يىكناغۇخ
<i>Anax parthenope</i> Selys	

蚊虎蜻蜓

Gynacantha hyalina Selys

蠹螋

Labidura sp.

突目隱翅虫

Stenus sp.

阎魔虫

Hister simplicisternus Lewis

郭安虫

Trichodes sinae Chevr.

露尾虫

Scaphidium reitteri Lewis

华野姬猎蝽

Nabis sinoferus Hsiao

广腹食虫蝽象

Reduviolus apterus F.

猎蝽

Raduvdus sp.

长红猎蝽

Rhodnius prolixus

茶翅蝽象

Halyomorpha picus Fabr.

تاغل يىڭناغۇچ

ئىلمەك قۇرۇت

تومپاق كۆزلۈك يوشۇرۇن فاناتلىق قوڭغۇز

شەيتان قوڭغۇز

ئالا قوڭغۇز

دوغداق قوڭغۇز

دالا ئوۋ چىرىپاشكىسى

ھاشارەت يەيدىغان يوغان قوساق چىرىپاشكا

ئوۋچى چىرىپاشكا

ئۇزۇنچاق قىزىل ئوۋچى چىرىپاشكا

قوڭۇر فاناتلىق چىرىپاشكا

- 花蝽 گۈللۈك حىراسكا
Orius insidiosus Poppius
- 黑肩绿盲蝽 فارا عوللۇق يېشىل فارغۇ چىرپاشكا
Cyrtorrhinus lividipennis Reuter
- 黑食蚜盲蝽 كۆك پىت يەيدىغان فارا قارغۇ چىرپاشكا
Deraeocoris punctulatus Fall.
- 大眼蝉长蝽 يوغان كۆزلۈك ياپىلاق چىرپاشكا
Geocoris sp.
- 食蚜瘿蚊 كۆك پىت يەيدىغان تۈگۈنەك ياشا
Aphidoletes meridionalis Felt
- 六点蓟马 ئالە داغلىق تىرىمىس
Scolothrips sexmaculatus Pergande
- 带纹蓟马 ناعىل تىرىمىس
Acolothrips fasciatus (L.)
- 长扁食蚜蝇 كۆك پىت يەيدىغان ئۇزۇنچاق چىۋىن
Sphaerophoria sp
- 大灰食蚜蝇 كۆك پىت يەيدىغان چوك كۈلرەك چىۋىن
Metasyrphus corollae Fabr
- 大绿食蚜蝇 كۆك پىت يەيدىغان چوك يېشىل چىۋىن
Lasiopticus pyrastris L.
- 刺腿食蚜蝇 كۆك پىت يەيدىغان تىكەن ئاباقلۇق چىۋىن
Ishiodon scutellaris Fabr.

- 黑帶食蚜蠅 كۆك پىت يەيدىغان قارا بالداق چىۋىن
Syrphus balteatus De Geer
 盐尼食虫虻 ھاشارەت يەيدىغان جاڭگال كۆكۈيۈنى
Promachus yesonicus Bigot
 中国食虫虻 ھاشارەت يەيدىغان جۇڭگو كۆكۈيۈنى
Ommatius chinensis Fabr.
 盲走螨 قارغۇ سالجا
Typhlodromus sp.
 钝绥螨 دېخماق سالجا
Ambeyseius sp.
 智利小植绥螨 چىلى كىچىك ئۆسۈملۈك سالجىسى
Phytoseiulus persimilis
 草间小黑蛛 كىچىك قارا ئۆسۈملۈك ئۆمۈچۈكى
Erigonidium graminicolum (Sundevall)
 八点球腹蛛 8 داغلىق يوغان قوساق ئۆمۈچۈك
Theridion octomaculatum Boes et Str.
 圆腹长脚蛛 ئۇزۇن پۇتلۇق پىلتە قوساق ئۆمۈچۈك
Tetrannatha shrikokiana Yagimumo
 螟黄赤眼蜂 كۆمىمە قوناق كېپىنىڭ قىزىل كۆزلۈك سېرىق
Trichogramma chilonis Tshii ھەرىسى
 广赤眼蜂 چوك قىزىل كۆزلۈك ھەرە
Trichogramma evanescens Westw.

- 松毛虫赤眼蜂 تۈكلۈك فارىغاي قۇرۇتىنىڭ قىزىل كۆزلۈك
Trichogramma dendrolimi Mats. ھەرسى
 稻螟赤眼蜂 شال كېپىنىڭنىڭ قىزىل كۆزلۈك ھەرسى
Trichogramma japonicnm Ashmead
 舟蛾赤眼蜂 فولۋاق پەرۋانىسىنىڭ قىزىل كۆزلۈك ھەرسى
Trichogramma closterae Pang et. Chen
 金小蜂 كىچىك سېرىق ھەرە
Dibrachys cavns (Wlk.)
 平腹小蜂 نەكسى قوساقلىق كىچىك ھەرە
Anastatus sp.
 小蠹虫金小蜂 پوسىلاقخورنىڭ كىچىك سېرىق ھەرسى
Tomicobia seitneri Rusch.
 杏球蚧跳小蜂 شارسىمان قاسراقلىق قۇرۇتىنىڭ كىچىك
Encyrtus masi Silv. سەكرەتمە ھەرسى
 跳小蜂 كىچىك سەكرەتمە ھەرە
Phaenodiscus aeneus Dalm.
 长盾金小蜂 ئۇزۇن قالغانلىق كىچىك سېرىق ھەرە
Anysis sp.
 旋蚊潜蛾小蜂 ئايلانا سىزىقلىق يەرۋانىنىڭ كىچىك پارازىت
Pleurotropis sp ھەرسى
 瘦蚊嘴小蜂 تۈگۈنەك پاشىك كىچىك چاقىق ھەرسى
Tetrastichus sp.

瘦蚊广腹细蜂

تۈگۈنەك پاشنىڭ يوغان قوساق ھەرسى

Platygaster error Fitch

蚜茧蜂

كۆك پىتىنىڭ غوزەك ھەرسى

Aphidius spp.

天蛾小茧蜂

ياۋا تەكەننىڭ كىچىك غوزەك ھەرسى

Apanteles sp.

甲腹茧蜂

قالقان قوساقلىق غوزەك ھەرسى

Apanteles sp.

木蠹蛾小茧蜂

پوستلاقخور پەرۋاننىڭ كىچىك غوزەك ھەرسى

Bracon sp.

上海青蜂

شاڭخەي كۆك ھەرسى

Chrysis shanghaiensis Smith

天牛姬蜂

ئۈزۈن بۇرۇتلۇق قوڭغۇزنىڭ توقال ھەرسى

Ephialtes sp.

凤蝶姬蜂

سۈمرۈع كېپىنەكىنىڭ توقال ھەرسى

Ichneumm jenerosus Smith

黑点瘤姬蜂

فارا سۆگەللىك توقال ھەرە

Xanthopimpla stemmator Thunb.

二点饴姬蜂

ئىككى داغلىق توقال ھەرە

Cremastus biguttulus Mun.

伞群追寄蝇

فالقانسىمان پارازىت چىۋىن

Exorista civilis Rond

- 毛虫追寄蝇 تۈكلۈك فۇرۇتنىك پارازىت چىۋىنى
Exorista amueua Mesnil
- 粘虫寄蝇 بېيىشغاي فۇرۇتنىك پارازىت چىۋىنى
Cuphocera varia Fabr.
- 家蚕追寄蝇 ئۆي تەكىنىنىك پارازىت چىۋىنى
Exorista sorbillans Wied
- 松毛虫狭额寄蝇 تۈكلۈك فارىغاي قۇرۇتنىك تار پىشانە
Carcelia bombylans rasella Bar. پارازىت چىۋىسى
- 长脚寄蝇 ئۇزۇن يۇتلۇق پارازىت چىۋىنى
Prosenia sybarita Fabr.
- 棕尾小麻蝇 قوڭۇر فۇيرۇقلۇق كىچىك كەندىر چىۋىنى
Sarcophaga peregrina R-D
- 长吻虻 ئاچماق تۇمشۇق كۆكۈيۈن
Bombylius inajor L.
- 长喙虻 ئۇزۇن تۇمشۇق كۆكۈيۈن
Anastoechus nitidulus Fabr
- 花绒坚甲 تاغلىق تىۋىتلىق فالقانلىق قوڭغۇز
Dastarcus longulus Sharp

本书根据河南人民出版社1978年9月第1版第1次印刷版本翻译出版。

بۇ كىتاب خېنەن خەلق نەشرىياتى نەرىيىدىس 1978-يىلى 9-ئايدا نەشر قىلىنغان 1-نەشرى 1-باسمىسىغا ئاساسەن نەرجىمە ۋە نەشر قىلىندى.

تەرجىمە قىلغۇچى. مۇھەممەد مامۇت
تەرجىمە مۇھەررىرى. زاپىت رەھىم
مەسئۇل كوررېكتور: خۇدا بەردى خېلىل

كۆشەندە ھاشاراتلار

تۈزگۈچى: باف بۇچبەن

مىللەتلەر نەشرىياتى نەرىيىدىن نەشر قىلىندى

شىنخۇا كىتابخانىسى نەرىيىدىن ئارفىنىلىدۇ

مىللەتلەر باسما زاۋۇتىدا بېسىلدى

1985-يىلى 3-ئايدا 1-قىسىم نەشر قىلىندى

1998-يىلى 3-ئايدا 2-قىسىم بېسىلدى

باھاسى 6.00 نۇەن

图书在版编目(CIP)数据

天敌昆虫:维吾尔文/杨有乾著;木哈买提译. —2版.
—北京:民族出版社,1998.4

ISBN 7-105-03075-5

I. 天… II. ①杨… ②木… III. 天敌资源—昆虫—普及
读物—维吾尔语(中国少数民族语言) IV. S476

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98)第 03784 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街14号)

邮编:100013 电话:010-64228007)

民族印刷厂印刷 各地新华书店经销

1985年3月第1版 1998年3月北京第2次印刷

开本:787×1092毫米 1/32 印张:6

印数:4,301—9,300册 定价:6.00元

ئۇيغۇر كىتاب تور بېكەتى
ئۇيغۇر كىتابلىرىنىڭ يېڭى نازارىسى
www.uyghurkitap.com



ISBN 7-105-03075-5



ISBN 7-105-03075-5/G · 320

民文（维 32） 定价：6.00 元

9 787105 030750 >